



Quercus robur
Haritza
Roble de Arriaga



Quercus pyrenaica
Ametza
Roble negro



Fagus sylvatica
Pagoa
Haya

VM (GM 111)
Domaikia
30TWN1552
(30.12.1987)

Hericium erinaceus

(Bull.:Fr.) Pers.
= *Dryodon erinaceus* (Bull.:Fr.) P. Karst.

Ahuntz-bizar Barba de cabra

Grupo Micológico 111 Mikologi Taldea
José Luis García Alija · Isabel Salcedo Larralde

Características

Cuerpo fructífero de globoso a más o menos acorazonado, en general grande, carnoso, de 10-25 cm de ancho por unos 20 de alto, afieltrado en la parte superior, en el resto recubierto por agujones unidos entre ellos, largos, de hasta 4 cm, en un principio blancos, crema después y al avejentarse, con las puntas pardas. Carne firme, blanca, dulce.

Esporas de ovoideas a elipsoidales, de 5-7 x 4,5-6 µm, de pared gruesa, ligeramente ornamentadas, amiloides. Gloecistidios subcapitados.

Hábitat

Sobre viejos troncos de caducifolios heridos o debilitados. En el territorio, generalmente, en diferentes especies de *Quercus* y en haya (*Fagus sylvatica*).

Fenología

Avanzado el otoño.

Observaciones

Forma parte de un pequeño grupo de especies arborícolas, caracterizadas por

la presencia de un himenóforo hidnoide, es decir con agujones, en un carpóforo carnoso. *H. erinaceus* los presenta como largos flecos cónicos; su aspecto es masivo, más o menos redondeado que le dan la apariencia de un erizo. En *H. coralloides* (Scop.: Fr.) Pers., los agujones más cortos, se bifurcan y penden de ramificaciones muy numerosas; especialmente en coníferas. *H. clathroides* (Pall.: Fr.) Pers. (1797), posee agujones mucho más cortos y no ramificados, asemejando al aspecto de los dientes de un peine, como gráficamente describe Marchand. *Creolophus cirratus* (Pers.: Fr.) P. Karst. tiene pequeños sombreros imbricados y los agujones mucho más rudimentarios que pueden adoptar la forma de pequeñas paletas. Muy raro.

Hericium erinaceus, especie llamativa por sus largos dientes, es cada día menos frecuente en nuestro territorio, ya que su hábitat, viejos árboles, todavía erectos, de robles y hayas escasean cada vez más. Por ello, ha sido incluida en la Lista Roja, tanto peninsular como europea, de hongos amenazados.

Comestibilidad

En algunas obras se caracteriza a esta especie como comestible, sin embargo, por el hecho de que rápidamente la carne se vuelve tenaz y nada agradable, se podría calificar de especie sin interés culinario. Además, si tenemos en cuenta que esta especie está en regresión, por falta de hábitat apropiado para su desarrollo, y por ello en la lista roja de especies amenazadas, su recolección debería estar prohibida, a pesar de no existir, por el momento, una regulación a este respecto.

Bibliografía

- BOURDOT, H & GALZIN, A. 1969. Hymenomycetes de France. Reprint. J. Cramer
- MARCHAND, A. 1976. Champignons du nord et du midi. Hachette. Vol 4
- MORENO, G, GARCÍA MANJÓN, J.L. & ZUGAZA, A. 1986. La guía Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Madrid. Tomo 1
- TELLERÍA, M.T. 1980. Contribución al estudio de los Aphyllophorales españoles. J. Cramer