

POR QUÉ VACUNAR FRENTE A LA LENGUA AZUL?

Porque la **Lengua Azul** es una enfermedad grave

Provoca grandes pérdidas económicas en las ganaderías afectadas, particularmente importantes en producción y reproducción con altas tasas de abortos y mortalidad.

Sólo la vacunación en masa permite reducir significativamente el número de focos clínicos y disminuir las pérdidas.

Porque la **enfermedad** no debe reaparecer

Porque en 2010, gracias a la vacunación masiva, se consiguió que en la C.A.V. no tuviéramos ningún foco frente a los más de 600 rebaños afectados en 2008. No obstante, en otras zonas de la península se siguen declarando focos en la actualidad, por lo que sigue siendo importante proteger a nuestros rebaños.

Porque los **compradores** preferirán animales vacunados

Porque a pesar de que la nueva Orden Ministerial ARM/3373/2010 de 27 de Diciembre permitirá los movimientos de animales que no estén vacunados, la aplicación de la vacuna supondrá un plus de garantía sanitaria de los mismos. Factor especialmente importante en animales jóvenes que nunca hayan sido vacunados.

Porque es **Rentable**

Porque los efectos adversos ligados a la vacunación son muy escasos, y por medio de la misma, se evitan las importantes pérdidas que la Lengua azul ha provocado en los ganaderos de los rebaños afectados.



TRES PRINCIPIOS para vacunar en el momento adecuado

Vacunar preferentemente durante el periodo de menor actividad de los mosquitos vectores

Es mejor vacunar - sobre todo los jóvenes animales - en invierno o en primavera, con el fin de que estén protegidos en verano y en otoño (periodos de mayor actividad de los mosquitos responsables de la transmisión del virus).



Evitar vacunar en el momento de la actividad de la reproducción

Como toda manipulación o manejo del ganado, la vacunación puede provocar alteraciones pasajeras, como accesos de fiebre, una disminución de la producción de espermatozoides o repetición de celos.

"Una gestión eficaz de los periodos de vacunación, permitirá elegir el momento óptimo para vacunar mis animales"

Por lo expuesto anteriormente:

- Evitar vacunar las hembras en el periodo comprendido entre un mes antes y un mes después de la cubrición o del parto.
- Evitar vacunar los machos en dos meses que preceden a la actividad de la reproducción.


Respetar los plazos de aplicación de las vacunas

En los animales jóvenes de reposición, respetar los plazos entre ambas inyecciones de primovacuna (variables según el serotipo y la especie).

Respetar el plazo máximo de un año para la vacunación de recuerdo:

Puedo adelantar la fecha de la vacunación de recuerdo de cara a conseguir una mejor gestión de la reproducción.

"Recuerda que la vacunación debe estar registrada en el libro de tratamientos de la explotación, como el resto de tratamientos y vacunaciones y ser comunicada para su registro al Servicio de Ganadería"



Reglas de oro a seguir para asegurar la eficacia en la vacunación

1. Condiciones de conservación de la vacuna:

- ☒ Conservarla entre 2º-8º C. Evitar la congelación.
- ☒ Una vez abierto el envase, utilizar todo el producto en las 24 horas siguientes, pasado este periodo, no utilizar el producto sobrante. Mantener las condiciones de refrigeración entre diferentes usos a lo largo del día.

2. Vacunación:

- ☒ Vacunar sólo animales sanos, en el periodo de edad estipulado para ser vacunados y que estén previamente desparasitados. No hacer coincidir la vacunación frente a la Lengua Azul con otras vacunaciones (IBR, Basquilla, Pasterella...).
- ☒ Prestar especial atención en no sobrepasar los plazos establecidos por el laboratorio para la vacunación de recuerdo.
- ☒ Asegurar una correcta higiene en el proceso de aplicación de la vacuna.
- ☒ Agitar periódicamente, entre diferentes aplicaciones, el recipiente de la vacuna.
- ☒ Evitar perforar repetidas veces los viales con las agujas utilizadas en la vacunación de los animales.
- ☒ Respetar las dosis y vías de administración recomendadas por el laboratorio.
- ☒ Utilizar agujas estériles y desechables.

No mezclar en el mismo vial vacunas de diferentes serotipos, salvo indicación expresa del laboratorio fabricante.

Guía Práctica de vacunación Lengua Azul

Vacunar nuestros rebaños protegerá a nuestros animales y mejorará el rendimiento de nuestras explotaciones.



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Fotografías: ©M. Arrazola. EJ-GV

Zergatik? Mihi Urdina gaixotasun larria delako

Eragindako ganadutegietan galera ekonomiko handiak sortzen ditu. Galera ekonomiko hauek nabariagoak dira ekoizpen eta ugalketa eremuetan, abortu eta hilkortasun tasa handiak sortzen baitituzte.

Abereen txertaketa masiboa da foku klinikoak eta galerak hein handi batean gutxitzeko modu bakarra.

Zergatik? Gaixotasuna ez delako berriro agertu behar

Izan ere, 2010ean egindako txertaketa masiboari esker, EAEn fokurik ez izatea lortu zen; 2008an, ordea, 600 abere-talde baino gehiago kaltetu ziren. Hala ere, penintsulako zenbait tokitan oraindik ere fokuak topatzen dira, beraz, garrantzitsua da gure abere-taldeak babesten jarraitzea.

Zergatik? Erosleek txertatutako abereak nahiago izango dituztelako

Izan ere, nahiz eta Ministerioaren abenduaren 27ko ARM/3373/2010 Agindu berriak txertatu gabeko abereen mugimendua baimenduko duen, txertoa jartzeak abere horien osasun bermearen plusa ekarriko du. Bereziki, alderdi hori oso garrantzitsua da inoiz txertatu ez diren abere gazteentzat.

Zergatik? Errentagarria delako

Izan ere, 2010ean egindako txertaketa masiboari esker, EAEn fokurik ez izatea lortu zen; 2008an, ordea, 600 abere-talde baino gehiago kaltetu ziren. Hala ere, penintsulako zenbait tokitan oraindik ere fokuak topatzen dira, beraz, garrantzitsua da gure abere-taldeak babesten jarraitzea.



1 Ahal izanez gero, txertatu eltxo bektoreek jarduera gutxiago duten garaian

Hobe da - batez ere aberea gaztea izanez gero - neguan edo udaberrian txertatzea, udan eta udazkenean babestuta egon daitezen (birusa kutsatzen duten eltxoek orduan izaten baitute jarduerarik handiena).



HIRU PRINTZPIO une egokian txertatzeko



2 Ez txertatu ugalketarako jarduera-garaian

Abereen edozein maneiuk bezala, txertaketak ere aldi baterako ondorioak sortu ahal ditu, besteak beste, sukarra, espermatozoiden ekoizpenaren beharakada edo araldiaren itzulera.

"Txertaketarako aldien kudeaketa eraginkorrak ahalbidetuko du nire abereak txertatzeko une egokia aukeratzea"

Gorago azaldutakoarengatik:

- Emeak ez dira txertatu behar estali edo erditu aurreko hilabeteetan, eta ondoko hilabeteetan ere ez.
- Arrak ez dira txertatu behar ugalketarako jardueraren aurreko bi hilabeteetan.


3 Txertoak jartzeko epeak errespetatzea

Aurrerako abere gazteak izanez gero, primo txertaketaren injekzioen arteko epeak errespetatu behar dira (serotipo eta espezieen arabera).

Hurrengo txertaketarako (oroitarazteko txertoa), gehienez urtebeteko epea egongo da.

Urtea bete baino lehen txertatu ahal izango da ugalketaren kudeaketa hobea lortze aldera.

"Gogoratu txertaketa ustiatetikiko tratamenduen liburuan jaso behar dela, gainontzeko tratamendu eta txertaketak bezalaxe; eta Abeltzaintza Zerbitzuari jakinarazi behar zaiola erregistra dezan."



Txertaketan eraginkortasuna ziurtatzeko jarraitu beharreko urrezko arauak

1. Txertoa kontserbatzeko baldintzak:

- ✓ 2º eta 8º C artean gorde, betiere izoztu gabe.
- ✓ Behin potoa irekiz gero, erabili produktu guztia hurrengo 24 orduetan; epe hau igarota, ez erabili soberakinik. Egunean zehar behin baino gehiagotan erabiltzekotan, mantendu hozteko baldintzak.

2. Txertaketa:

- ✓ Abere osasuntsuak baino ez dira txertatuko: txertatzeko adinean daudenak (4 hilabetetik gora) eta alde zurretik parasitoak kentzeko tratamendua hartuta dutenak. Mihi urdinaren kontrako txertoarekin batera ezin da bestelakorik jarri (IBR; Basquilla, Pasterella eta abar). Oso adi egon behar da laborategiak oroitarazteko txertoa jartze aldera ezarritako epeak ez luzatzeko.
- ✓ Txertoa jartzeko prozesuan higiegi egokia ziurtatu.
- ✓ Erabilaren artean, noizbehinka, astindu txertoaren ontzia
- ✓ Saihestu potoak behin eta berriro zulatzea abereekin aurretiaz erabilitako orratzez.
- ✓ Errespetatu laborategiak gomendatutako dosiak eta hartzeko modua.
- ✓ Orratz esteril eta erabilera bakarrekoein aritu.

Ez nahastu poto berean serotipo ezberdinetako txertoak, laborategi ekoizleak berariaz bestelakorik adierazten ez badu behintzat.

Argazkiak: ©M. Arrazola. EJ-GV

Mihi urdinaren aurkako txertaketarako Gida Praktikoa

2011

Gure abere-taldeak txertatzeak gure azienda babestuko du eta gure ustiategiaren etekina hobetuko du.



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA