

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Semana 05 (30/01/2023-05/02/2023)

Temporada 2022-2023


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 437,67 casos por 100.000 habitantes (388,70/100.000 la semana anterior).
- Se han confirmado el 71,8% de las 85 muestras vigía enviadas al laboratorio, detectándose 25 virus de la gripe (positividad 29,4%), 4 VRS (positividad 4,7%) y 4 SARS-CoV-2 (positividad 4,7%). También se han registrado 17 rinovirus y 8 coronavirus estacionales.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 13,36 casos por 100.000 habitantes (12,58/100.000 la semana anterior).
- Esta semana vuelve a subir el número de detecciones de virus influenza registradas en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE y sigue bajando el de VRS.

Vigilancia de IRA en Atención Primaria


Vigilancia sindrómica

La tasa de IRA registrada por la Red de AP ha sido de 437,67 casos por 100.000 habitantes (388,70/100.000 la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 356,16/100.000 en Araba, 431,60/100.000 en Bizkaia y 484,78/100.000 en Gipuzkoa.

**Tasa de IRA por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de 0 a 4 años con 2047,35 casos por 100.000, seguido por el grupo de 5 a 14 años con 711,90 casos por 100.000. Las tasas ascienden respecto a la semana previa en los todos los grupos de edad.



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas suben en la mayoría de las OSI. La tasa más alta se ha registrado en la OSI Goierri-Urola y la más baja en la OSI Uribe.


**Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE**

OSI	Tasa Semana 05	Tasa Semana 04	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	394,29	382,32	1,03 (0,95-1,12)
OSI Rioja Alavesa	478,76	487,30	0,98 (0,68-1,42)
OSI Barakaldo-Sestao	377,31	308,06	1,22 (1,07-1,40)
OSI Barrualde-Galdakao	460,16	407,74	1,13 (1,05-1,22)
OSI Bilbao-Basurto	436,62	367,76	1,19 (1,10-1,28)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	463,71	422,91	1,10 (0,99-1,22)
OSI Uribe	359,03	332,44	1,08 (0,98-1,19)
OSI Bidasoa	385,63	306,95	1,26 (1,06-1,49)
OSI Debabarrena	508,62	479,52	1,06 (0,92-1,23)
OSI Debagoiena	371,08	400,70	0,93 (0,78-1,10)
OSI Donostialdea	443,71	383,35	1,16 (1,08-1,24)
OSI Goierri-Urola Garaia	615,64	540,77	1,14 (1,01-1,28)
OSI Tolosaldea	587,35	471,12	1,25 (1,07-1,45)

La tasa de síndrome gripal ha sido de 16,96 casos por 100.000 habitantes (13,36/100.000 la semana anterior). La tasa asciende en los tres territorios históricos, pero de manera más pronunciada en Gipuzkoa.

La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 302,55 casos por 100.000 habitantes (256,00/100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis asciende en Bizkaia y Gipuzkoa, sobre todo en este último, y se mantiene en Araba.


Tasa por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE



Vigilancia centinela

Esta semana se han analizado en el laboratorio de referencia de IRA 85 muestras centinela y se han confirmado el 71,8%, detectándose 25 virus de la gripe (2 AH3, 10 AH1pdm09 y 13 tipo B), 4 VRS y 4 SARS-CoV-2. También se han detectado 17 rinovirus, 8 coronavirus estacionales y 9 coinfecciones con dos virus identificados en la misma muestra.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2022-2023, CAE



La positividad para gripe asciende esta semana y se sitúa en el 29,4% (16,4% la semana anterior). Si al inicio de la temporada el subtipo de virus de la gripe predominante era el AH3, en las últimas semanas la mayoría de detecciones son del subtipo AH1 y del tipo B. Las positivities para VRS y SARS-CoV-2 se mantienen por debajo del 10% (4,7% en ambos casos). La positividad para rinovirus se ha situado en el 20,0% (26,9% la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio por virus respiratorio. Red centinela. 2022-2023, CAE


	Semana 05		Semana 04		Total 2022-2023	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	25	29,4	11	16,4	248	19,1
SARS-CoV-2	4	4,7	4	6,0	138	10,6
VRS	4	4,7	6	9,0	144	11,1
Metaneumovirus	6	7,1	8	11,9	87	6,7
Parainfluenza	1	1,2	3	4,5	45	3,5
Adenovirus	5	5,9	5	7,5	106	8,2
Rinovirus	17	20,0	18	26,9	198	15,2
CoV estacionales	8	9,4	2	3,0	58	4,5

Vigilancia de IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Los casos de IRAG (infección respiratoria aguda grave) son casos con diagnóstico de IRA que requieren ingreso hospitalario. La tasa de IRAG en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 13,36 casos por 100.000 habitantes (12,58/100.000 la semana anterior), 11,87/100.000 en mujeres y 14,94/100.000 en hombres.

**Tasa de IRAG por sexo y semana epidemiológica
Red hospitalaria de Osakidetza. 2022-2023, CAE**




Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 36,31 casos por 100.000, seguido por el grupo de 0 a 4 años con 31,52 casos por 100.000. Las tasas ascienden esta semana en todos los grupos de edad, excepto en los mayores de 64 años.



Vigilancia virológica no centinela

Esta semana vuelve a subir el número de detecciones de virus influenza registradas en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE y sigue bajando el de VRS.

De los 176 virus gripales detectados esta semana, 85 han sido tipo A no subtipado, 23 A(H3), 20 A(H1)pdm09 y 48 tipo B. Desde la semana 40/2022 se han registrado 3241 detecciones, 3116 (95,8%) de tipo A y 135 (4,2%) tipo B. De los 928 virus tipo A subtipados, 840 (90,5%) han sido A(H3) y 88 (9,5%) A(H1)pdm09.




Vigilancia específica de COVID-19

La tasa de incidencia acumulada en 7 días de COVID-19 en población de 60 o más años, en la semana 5, ha sido de 21,87 casos por 100.000 habitantes (21,41/100.000 en la semana anterior), 21,39 en hombres y 22,24 en mujeres (Fuente: EDO).

Según los datos de los Servicios de Microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza a la fecha de este informe, se realizaron pruebas de PCR específica para variantes de SARS-CoV-2 al 18% de las muestras positivas por PCR. Todas fueron variante Ómicron, subvariante BQ.1.

De acuerdo con los datos obtenidos de los indicadores de la situación hospitalaria de Osakidetza (OBIEE), en la semana 5 se produjeron 71 ingresos de pacientes con PDIA positiva en la CAE (69 la semana anterior), 36 hombres y 35 mujeres. El 70% de las personas ingresadas tenía 60 o más años.

Tasas y número de ingresos con PDIA positiva para SARS-CoV-2, por semana epidemiológica y edad. 2022-2023, CAE



Según datos extraídos de OBIEE, en la semana 5 del año se han declarado 7 nuevos casos confirmados de COVID-19 en personas usuarias de residencias y los centros afectados han sido 5, valores muy similares a los de la semana anterior.

Información detallada sobre la actividad de IRA en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU)

8 de febrero de 2023

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones