

11.4. TXERTOEN TERMO-EGONKORTASUNA

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TENPERATURA				
	2-8°C	22-25°C	35-37°C	>37°C	OHARRAK
BCG Tuberculosisia	Iraungipen-data	% 20-30eko galera progresiboa 3 hilabetean	% 20ko galera progresiboa 3-14 egunean	*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
Poliomielitisa					
Polioa, aho bidezkoa VPO	Iraungipen-data	Ezegonkorra.% 50eko jarduera-galera 20 egunean	Oso ezegonkorra. Titulu onargarrien galera 1-3 egun igaro ondotik	% 50eko jarduera-galera egun 1 igaro	Egonkor izoztu ondoren Argiaren eraginpetik babestu
Polio inaktibatua VPI		1 motako antigeno-maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	1 motako antigeno-maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
Txerto biriko indargetuak					
Barizela Varilrix®	Iraungipen-data	24 ordu	*		Egonkor izoztu ondoren
Barizela Varivax®		30 minutu	*		
Txerto hirukoitz birikoa Priorix		72 ordu	*		
Txerto hirukoitz birikoa MMRVaxPro		Ez dago eskuragarri	*		
RotaTeq®		36 ordu	26-30°C: 12 o	*	
Rotarix®		72 ordu	24 ordu	*	Egonkor izoztu ondoren
Papilomabirusa					
VPH Gardasil 9®	Iraungipen-data	96 ordu	96 ordu	*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
VPH Cervarix®		astebete		*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TENPERATURA				
	2-8°C	22-25°C	35-37°C	>37°C	OHARRAK
Toxoide tetanikoa duten txertoak					
Hexabalentea Infanrix-Hexa®	Iraungipen-data	72 ordu	*		Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
Hexabalentea Hexyon®		72 ordu	*		Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
DTPa-VPI Tetrarix®		72 ordu	*		
DTPa-VPI Infanrix-IPV®		72 ordu	*		
dTpa Boostrix®		astebete	7 egun	*	
dTpa Triaxis®		72 ordu		*	
Td Diftavax®		6 hilabete	2 hilabete	*	
Hib					
<i>Haemophilus influenzae b</i> Hiberix®	Iraungipen-data	astebete	astebete	*	Egonkor izoztu ondoren
Hepatitisaren aurkako txertoak					
B Hepatitisa HBVaxpro®	Iraungipen-data	astebete	72 ordu	*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
B Hepatitisa Engerix®		astebete	72 ordu	*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
B Hepatitisa Fendrix®		72 ordu	72 ordu	*	
A Hepatitisa Havrix®		72 ordu		*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
A Hepatitisa Avaxim®		72 ordu		*	
A-B Hepatitisa Twinrix®		astebete		*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar
Zoster Herpesaren aurkako txertoak					
Shingrix®	Iraungipen-data	168 ordu 30°C arte		*	Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izoztu behar

* Informazioa ez dago eskuragarri

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TENPERATURA				OHARRAK
	2-8°C	22-25°C	2-8°C	>37°C	
Meningokokoaren aukako txertoak					
C Meningokoziko konjugatua Meningitec®	Iraungipen-data	Egonkorra 3 hilabete	Ez da 25°C baino gehiagoan egon behar 24 ordu baino gehiagoan		Ez da izotzu behar eta ez da 2°C azpitik egon behar. Ez eduki argitan
C Meningokoziko konjugatua Menjugate®		Egonkorra 6 hilabete	Liofilizadoreak egonkor eusten dio 3 hilabetez 30°C graduan, eta disolbatzaileak 18 hilabetez 30°C graduan		
C Meningokoziko konjugatua Neisvac C®		Egonkorra 9 hilabete	Egonkor 30 egunez tenperatura honetan: < 40°C		
ACWY Meningokoziko konjugatua Mencevax®		72 ordu	72 ordu	*	
ACWY Meningokoziko konjugatua Nimenrix®		astebete	astebete	*	
ACWY Meningokoziko konjugatua Menveo®		Egonkorra 24 hilabete	*		
B Meningokoziko konjugatua Bexsero®		Estable 48 h	*		
Gripea		Ez gainditu sekula tenperatura hau: 20°C	*		Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izotzu behar
Neumokokoaren aukako txertoak					
Neumokoko konjugatua Prevenar 13®	Iraungipen-data	4 egun	*		Ez da izotzu behar
Neumokoko konjugatua Synflorix®		astebete	*		
Neumokoko polisakaridoa Pneumovax 23®		Egonkor hainbat astez	*		Ez da izotzu behar
Beste produktu batzuk					
Tifoide inaktibatua Typherix®	Iraungipen-data	astebete	*		*
antigorputz monoklonal Beyfortus®		8 ordu	*		Ez astindu eta ez jarri bero zuzenean. Argiaren eraginpetik babestu.Ez da izotzu behar

Bibliografia:

1. Temperature sensitivity of vaccines. Department of Immunization, Vaccines and Biologicals. Family and Community Health. World Health Organization. 2006.
2. Kim Causer. South East London. Vaccine Incident Working Group. May 2005
3. Murcia Salud. Consejería de Sanidad y Consumo.
<http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/125571-TEV08062015.pdf>
4. Información sobre almacenamiento de vacunas. Laboratorio GSK.