

BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

<http://www.euskadi.net/sanidad>

50. Zkia. - 2000

TOLTERODINA

UROTROL®
Almirall Prodesfarma

DETRUSITOL®
Pharmacia Upjohn

2 mg.ko 56 konprimitu.
Prezioa: 7.659 pta.



▼ EZ DAKAR EZER BERRIRIK

TRATAMENDUAREN KOSTUA EGUNEKO

Tolterodina 4mg = 274 pta.
Oxibutinina 15 mg = 50 pta.

INDIKAZIOAK

Inkontinentzia larriaren tratamendurako.

KOMENTARIOAK

Tolterodina antikolinergiko berri bat da maskuri ezegonkorraren tratamendurako, honako sintomak azaltzen direnean: gernu-urgentzia, poliakiuria edo inkontinentzia larria. Oxibutinina bezala, tolterodina ere errezeptore muskarinikoen antagonista da; beraz, detrusor-kontrakzioen inhibizioa eragiten du.

Normalean, farmako horien efikazia aztertzeko, pazienteak zenbat aldiz txiza egiten duten egunean neurtzen da. Entsegu klinikoetan, tolterodina plazeboa baino zertxo bat efikazago dela erakutsi du: mikzio bat gutxiago egunean. Bestalde, oxibutinina bezain efikaza dela erakutsi du.

Tolterodinaren gomendatutako posologia hauxe da: 2 mg egunean bi aldiz. Efektu kaltegarri nagusia aho-lehortasuna da (%40), oxibutininarekin (%78) baino arinagoa. Bestalde, tolterodinak arratoietan teratogenikoa dela erakutsi du, hori dela eta tolterodina-tratamendua duten emakume ugalkorrei neurri antikonzeptiboak erabiltzea gomendatzen zaie. Tolterodinak interakzioak sortzen ditu, zitokromo P450 enzimen bidez metabolizatzen baita; horregatik metabolizatzen diren edo enzima horiekin interakzionatzen duten medikamentuekin interakziona dezake, hots, makrolidoekin (eritromizina eta klaritromizinarekin) eta farmako antifungikoekin (ketokonazol, itrakonazol eta mikonazolarekin).

Tolterodinaren efikazia klinikoa, oxibutininarekin antzera, oso motela da. Tolterodinak abantaila bat du: aho-lehortasun gutxiago sortzen duela; hala eta guztiz ere, interakzioak sortzeko arrisku handiagoa eta arrisku teratogeniko handiagoa du. Prezioa, gainera, 5 aldiz handiagoa da.



▼ OSO INTERESGARRIA



▼ INTERESGARRIA



▼ ERABILGARRIA NOIZEAN
BEHIN



▼ EZ DAKAR EZER BERRIRIK



▼ ESPERIENTZIA KLINIKO
GUTXIEGIA



Osakidetza
Servicio vasco de salud

Sendagai hauei buruz xehetasun
gehiago jakiteko edo zerbait argitzeko
harremanetan jarri MIEZ-ekin:
e-mail: cevime-san@ej-gv.es
Tel. 945 01 92 66

Emandako informazioa orain duguna
da eta etorkizunean gerta daitezkeen
aurrerapen zientifikoekin araberak
aldagarria da.



Osasun Saila
Departamento de Sanidad

FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS

<http://www.euskadi.net/sanidad>

N.º 50 - 2000

TOLTERODINA

UROTROL®

Almirall Prodesfarma

DETRUSITOL®

Pharmacia Upjohn

2 mg 56 comprimidos
Precio: 7.659 ptas



COSTE TRATAMIENTO/DÍA

Tolterodina 4mg= 274 ptas.
Oxibutinina 15 mg= 50 ptas.

INDICACIONES

Tratamiento de la incontinencia de urgencia.

COMENTARIOS

La tolterodina es un nuevo anticolinérgico comercializado para el tratamiento de la vejiga inestable con síntomas de urgencia urinaria, poliaquiuria o incontinencia urgente. Al igual que la oxibutinina, la tolterodina es un antagonista de los receptores muscarínicos lo que provoca una inhibición de las contracciones del detrusor.

Habitualmente, para valorar la eficacia de estos fármacos se mide el número de micciones que los pacientes realizan en 24 horas. En los ensayos clínicos tolterodina ha mostrado ser algo más eficaz que placebo disminuyendo en 1 el número de micciones a lo largo de 24 horas. Por otra parte, ha mostrado una eficacia similar a oxibutinina.

La posología recomendada es de 2mg de tolterodina administrada dos veces al día. La sequedad de boca es el principal efecto adverso producido por la tolterodina (40%), pero es menor que con oxibutinina (78%). Por otra parte, la tolterodina es teratogénica en ratones por lo que se recomienda la utilización de medidas anticonceptivas en mujeres fértiles en tratamiento con tolterodina. Debido a que se metaboliza por las enzimas del citocromo P450 puede interactuar con medicamentos que se metabolizan o inhiban dichas enzimas como macrólidos (eritromicina, claritromicina) y agentes antifúngicos (ketoconazol, itraconazol y miconazol).

La eficacia clínica de la tolterodina al igual que la de la oxibutinina es muy modesta. Tolterodina presenta la ventaja de producir menor sequedad de boca; sin embargo presenta un mayor riesgo de producir interacciones, mayor riesgo teratogénico y su precio es 5 veces mayor.



▼ MUY INTERESANTE



▼ INTERESANTE



▼ EVENTUALMENTE ÚTIL



▼ NO APORTA NADA NUEVO



▼ EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE