

## CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

# TAPTIQOM® (Timolol/Tafluprost)


Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: TTQ 001- ABRIL 2016.

**TAPTIQOM®**  
(15µg/ml tafluprost + 5mg/ml maleato de timolol)

### LA HIPEREMIA CON TAPTIQOM® ES MENOS FRECUENTE Y MENOS SEVERA<sup>1</sup>

La hiperemia se asocia con baja adherencia al tratamiento<sup>2</sup>



Teniendo en cuenta la misma referencia que utilizan<sup>1</sup>, una comparación indirecta, financiada por el laboratorio, entre asociaciones de timolol con latanoprost, bimatoprost, travoprost y tafluprost, la frecuencia de hiperemia con latanoprost/timolol formulado con conservante fue...¡del 4%!

Y respecto a la severidad: en la publicación ino hay datos!

Y, en cuanto a la frecuencia de irritación ocular<sup>1</sup>:

- latanoprost/timolol: 2-9%
- tafluprost/timolol 7-13%.

#### BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL MATERIAL PROMOCIONAL

1. Holló G, Vuorinen J, Tuominen J, Huttunen T, Ropo A, Pfeiffer N. Fixed-Dose Combination of Tafluprost and Timolol in the Treatment of Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension: Comparison with Other Fixed-Combination Products. Advances in Therapy. 2014;31(9):932-44.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 243/2017](#).