

2024	ADINERAKO IZAN BEHAR DUEN DOSIA								
	6 hilabete	7-10 hilabete	11-15 hilabete	16-23 hilabete	2-3 urte	4-5 urte	6-7 urte	8-9 urte	10-14 urte
DTPa/dTpa/Td	Egutegia	2 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	4 dosi <sup>1</sup>	4 dosi <sup>2</sup>	4 dosi <sup>2</sup>
VPI		2 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	3 dosi <sup>1</sup>	4 dosi <sup>1</sup>	4 dosi <sup>2</sup>	4 dosi <sup>2</sup>
Hib		2 dosi	3 dosi	Dosi 1 <sup>3</sup>	Dosi 1 <sup>3</sup>	Dosi 1 <sup>3</sup>			
Men C		Dosi 1	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>5</sup>
Men B		2 dosi 2023tik aurrera jaiotakoak							
VNC13		2 dosi	2 dosi <sup>4</sup>	2 dosi <sup>4</sup>	Dosi 1 <sup>6</sup>	Dosi 1 <sup>6</sup>	Dosi 1 <sup>6</sup>	Dosi 1 <sup>6</sup> 2015etik aurrera jaiotakoak	Dosi 1 <sup>6</sup> 2015etik aurrera jaiotakoak
B Hepatitis		2 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi
TV			Dosi 1	Dosi 1	Dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi	2 dosi
Barizela			Dosi 1 15 hilabeteko haurrei	Dosi 1	Dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi 2015etik aurrera jaiotakoak	2 dosi 1995 eta 2014 bitartean jaiotakoak
Papiloma									2 dosi Mutiletan, 2012tik jaiotakoak bakarrik
Men ACWY			EGUTEGIAREN JARRAIPENA						

1 1 Erabili aurkezpen hexabalentea; 2 txerto tetrabalentea 13 urtera arte. 14 urtetik aurrera erabili Td/sartu dTpa dosi bat; 3 txerto hexabalentearekin 3 dosi dira; 4 12 hilabetetik Aurrera jarritakoa; 5 10 urtetik aurrera eman Men ACWY, 12 urteko dosiaren baliokidea dena.; 6 2 urtetik aurrera jarritakoa

	GUTXIENeko TARTEA		
	1. eta 2. dosien artean	2. eta 3. dosien artean	Oroitzapen-dosien artean
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 aste (3+1 pauta) 8 aste (2 +1 pauta)	4 aste (3+1 pauta) 6 hilabete (2 +1 pauta)	6 hilabete
Td	4 aste	6 meses	12 hilabete*
dTpa			Tetanosaren duen txertoaren aldeztasuneko dosi baten 6 hilabete
VPI	4 aste	4 aste	6 hilabete
Hib	4 aste	4 aste	6 hilabete
Men C	8 aste		6 hilabete
Men B (4cMenB)	4-8 aste (pautaren arabera)		2-12 hilabete (pautaren arabera)
VNC	4 aste (< 12 h) 8 aste (12-23 h)	8 aste (< 12 h)	5-7 hilabete (pautaren arabera)
VHB	4 aste	8 aste**	
VPH	6 hilabete (2 dosiko pauta)		
	hilabete 1 (3 dosiko pauta)	3 hilabete	

\* 5 dosiko pauta 65 urtera arte osatzeko, 4. eta 5. dosien arteko tartea 10 urtekoa izango da

\*\* Gutxienez 16 asteko 1. eta 3. dosien arteko gutxienezko tartearik