

TOXIKOMANIEI buruzko informazio sistema

Sistema de información sobre TOXICOMANÍAS

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

2020

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Egilea / Autor:

Nieves Rodríguez-Sierra Huguet

Gainbegiralea / Supervisión:

Luis Javier Echevarría González de Garibay

Edizioan eta maketazioan lankidetzta / Colaboración en la edición y maquetación:

Maria Victoria Perianes Vilariño

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

registros-epidemiologicos@euskadi.eus

2022ko maiatza / Mayo 2022

AURKIBIDEA / ÍNDICE

Sarrera

5

Introducción

Materiala eta metodoak

8

Materiales y métodos

TRATAMENDU ADIERAZLEA:

1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2020

10

2. grafikoa. Pertsonen tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, substantzia psikoaktibo nagusiaren arabera. EAE 2020

10

1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2020

11

2. taula. Tokikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera, tratamenduan hastea eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2000-2020

15

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroina, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 2000-2020

16

4. grafikoa. Heroina abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 2000-2020

17

4.1 grafikoa. Espainian 2000-2020n heroina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

17

5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 2000-2020

18

5.1 grafikoa. Espainian 2000-2020n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

18

6. grafikoa. Cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2020

19

INDICADOR DE TRATAMIENTO:

Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la sustancia psicoactiva que lo motiva. CAPV 2020

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según la sustancia psicoactiva principal. CAPV 2020

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la sustancia psicoactiva que causa dicha admisión. CAPV 2020

Tabla 2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según la sustancia psicoactiva que motiva la admisión. CAPV 2000-2020

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 2000-2020

Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020

Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 2000-2020

Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020

Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 2000-2020

Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020

6.1. grafikoa. Espainian 2000-2020n cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera	19	Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 2000-2020
7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2020	20	Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020
3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2020	21	Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV 2020
8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020	24	Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 2000-2020
9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2020	25	Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAPV 2020
10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	25	Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	26	Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	26	Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	27	Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	27	Gráfico 12.1. Estado serológico frente a la Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
13. grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020	28	Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020
LARRIALDI ADIERAZLEA:		INDICADOR DE URGENCIAS:
4. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren ezaugarriak, sexuaren arabera. 2020 urtea	29	Tabla 4. Características de los episodios de urgencia relacionados con consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Año 2020
5. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdietako aurretiko patologia psikiatrikoa, sexuaren arabera. 2020 urtea.	30	Tabla 5. Patología psiquiátrica previa referida en las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2020
6. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren diagnostikoak sexuaren arabera. 2020 urtea.	31	Tabla 6. Diagnósticos de los episodios de urgencia relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2020

7. taula. <i>Larrialdi-gertakariarekin lotutako sintomak, sexuaren arabera. 2020 urtea.</i>	32	Tabla 7. Síntomas relacionados con el episodio de urgencia según sexo. Año 2020
8. taula. <i>Larrialdi-gertakariekin lotutako substantzien kopurua eta ehunekoa, sexuaren arabera. 2020 urtea</i>	33	Tabla 8. Número y porcentaje de las sustancias relacionadas con los episodios de urgencias según sexo. Año 2020
HILKORTASUN ADIERAZLEA:		
9. taula. <i>Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2020</i>	34	Tabla 9. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2020
14. grafikoa <i>Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuen ondoriozko hilkortasun tasaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020</i>	35	Gráfico 14. Evolución de la tasa de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 2000-2020
10. taula. <i>Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2020</i>	36	Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2020
11. taula. <i>Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2020</i>	37	Tabla 11. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2020
15. grafikoa <i>Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuen ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020</i>	38	Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 2000-2020

ERANSKINAK

1. ERANSKINA. <i>Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta tratamendu-adierazlerako datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2020</i>	39	ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al indicador tratamiento. CAPV 2020
2. ERANSKINA. <i>Adin-taldeen arabera biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2020</i>	40	ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2020

ANEXOS

Sarrera

Euskadiko toxikomaniei buruzko informazio-sistema (TIS) osatzen duten adierazleen multzoak hauei buruzko informazioa biltzen du: EAEko tratamendu ambulatorioko zentroetan substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko tratamenduan onartutako pertsonen datuak; substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako ospitale-larrialdien datuak; eta substantzia horiekiko erreakzio akutuari loturiko hilkortasunari buruzko datuak.

Ez da, beraz, kontsumoari buruzko inkesta bat, kontsumo horiek eragindako osasun-ondorioei buruzko populazio-erregistroa baizik (tratamenduaren hasiera, larrialdietan artatzea eta heriotza-tasa). Erregistroak 1991z geroztiko informazioa biltzen du.

2020an, COVID-19aren pandemiaren ondorioz, adierazleen datuek eragina izan dute; beraz, azterketa tentuz egingo da, eta hurrengo urteetako joerak behatzen jarraituko da.

Tratamenduaren hasiera

2020an, tratamenduan onartutakoen kopuruak behera egin du substantzia guztietan, hipnosedatzaileetan izan ezik.

Onarpen guztiak, alkohola barne, 2.004 izan ziren. Horietatik, %44an alkohola zen substantzia nagusia (mendekotasuna eragiten duen substantzia, edo, terapeutaren iritzian, arazo kliniko, psikologiko edo sozial nagusiak eragiten dituena); %21ean, kokaina; %17an, cannabis; %6an anfetaminak; eta %5an anfetaminak.

2000 eta 2020 artean, alkoholaz bestelako toxikomaniengatik tratamenduan onartutakoen kopurua 2000ko 1408tik 2020ko 1.121ra igaro da, eta 2004an onarpen gehien izan (1.894).

Aurreko urteetan bezala, tratamendua hasteko adinari dagokionez, mendekotasunen tratamendua hasi zuten pertsonetan cannabis-kontsumitzaileak ziren gazteenak, (kokaina-, anfetamina- eta heroína-mendekotasuna zutenen aurretik). Azkenik, alkohol-mendekotasunaren tratamendua hasten duten pertsonak dira adintsuenak baita gainerako

Introducción

El Sistema de Información sobre Toxicomanías (SIT) del País Vasco es un conjunto de indicadores que aporta información sobre las personas admitidas a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en centros de tratamiento ambulatorio de la CAPV, así como de urgencias hospitalarias relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas y de la mortalidad por reacción aguda a dichas sustancias.

No se trata, por tanto, de una encuesta de consumos, sino de un registro poblacional de las consecuencias en la salud derivadas de estos consumos: inicio de tratamiento, asistencia a urgencias y mortalidad. Este Registro incluye información desde 1991.

En 2020, a causa de la pandemia de COVID-19 los datos de los indicadores se han visto afectados por lo tanto el análisis se realizará con cautela y se seguirán observando las tendencias en años posteriores.

Inicio de tratamiento

En 2020, ha descendido el número de admisiones a tratamiento en todas las sustancias excepto en los hipnosedantes.

El total de admisiones incluyendo el alcohol, fueron 2.004 De ellas, el 44% consumía alcohol como sustancia principal (sustancia que causa dependencia o la que el terapeuta considera causante de los problemas clínicos, psicológicos o sociales más importantes), un 21% cocaína, un 17% cannabis, un 6% anfetaminas y un 5% heroína.

Entre 2000 y 2020 el nº de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas ha pasado de 1.408 en 2000 a 1.121 en 2020 alcanzándose en 2004 el mayor número de admisiones (1.894).

Al igual que en años anteriores, las personas que inician tratamiento por consumo de cannabis son las más jóvenes y en todos los casos (heroína, anfetaminas, cocaína, cannabis y alcohol) la proporción de hombres es muy superior a la de las mujeres. Las personas que inician tratamiento por consumo de alcohol son las que tienen mayor edad y también las que presentan mayor proporción de

substantzietan alderatuta emakumeen proportzio handiena dutenak ere.

Ikasketa-mailari dagokionez, substantzia guztietan gailentzen dira derrigorrezko lehen hezkuntza bakarrik gainditu dutenak Hala ere, anfetaminak edo alkohola kontsumitzeagatik onartutako pertsonak dira ikasketa-maila handiena dutenak.

Lan-egoerari dagokionez, langabezia geratutako pertsona da talde nagusia (% 31,7), eta lan-harreman mugagabea dutenena edo norbere konturako langileena datoz gero (% 26,7). Tratamenduan onartutako pertsonen artean, langabezia-egoeraren eta substantziaren arteko lotura hau da: heroína (% 54,8), anfetaminak (% 36,9), kokaina (% 34), cannabisa (% 28,7) eta alkohola (% 28,1). Cannabisaren kasuan, gainera, % 17,5 ikasten dago. Alkoholaren kasuan, emakumeen % 7k etxeko lanak bakarrik egiten dituzte, eta gizonen kasuan, berriz, % 0,2k.

Aurreko urteetan bezala heroína eta alkohola dira kontsumo-aldi luzeeneko substantziak: % 41 eta % 50 hurrenez hurren 25 urteko edo gehiagoko historiala dutenak. Kokainaren kasuan, kasuen % 50 inguru kontsumo-historia 15 urte baino gehiagokoa zen.

Heroína-mendekotasuna tratatzeari ekin ziotenetatik, % 8,7ak positibo eman zuen GIBa detektatzeko proban; % 70,4ek, negatibo. Gainerako substantzietan, oro har, ez da datu hori ezagutzen.

Toxikomania ez-alkoholikoengatik tratamendu-onarpen multzoan, % 52ean, % 57an eta % 48an ez da ezagutzen GIBaren, C hepatitisaren eta B hepatitisaren egoera serologikoa.

Substantzia psikoaktiboaren erabilerarekin lotutako larrialdiak

2020an, larrialdien azterketa Gurutzetako ospitalean bakarrik egin zen, eta adierazlerako hautatu ziren substantzia psikoaktiboaren kontsumoarekin zuzenean lotutako gertakariak

mujeres respecto a hombres en comparación con el resto de sustancias.

Con respecto al nivel de estudios, en todas las sustancias predominan las personas que solo han terminado la educación primaria obligatoria aunque son las personas admitidas por consumo de anfetaminas o alcohol las que tienen mayor nivel de estudios.

En cuanto a la situación laboral, el mayor número de casos se concentraba en las personas paradas que habían trabajado antes (31,7%), seguido de las que tenían una relación laboral indefinida o eran autónomas (26,7%). Entre las personas admitidas a tratamiento la proporción de quienes estaban en desempleo (habiendo trabajado antes) presentaba el siguiente gradiente en función de la sustancia: heroína (54,8%), anfetaminas (36,9%), cocaína (34%), cannabis (28,7%) y alcohol (28,1%) aunque en el caso del cannabis, además un 17,5% se encuentra estudiando. En el caso del alcohol, un 7% de las mujeres realizan exclusivamente labores del hogar, frente al 0,2% de esta categoría en hombres.

Como en años anteriores la heroína y el alcohol fueron las sustancias de mayor duración temporal de consumo, con un 41% y 50%, respectivamente, de población admitida a tratamiento con un historial de 25 o más años. En el caso de la cocaína, cerca del 50% de los casos tenía una historia de consumo de más de 15 años.

El 8,7% de las personas que iniciaron tratamiento por heroína presentaron resultado positivo en la prueba de detección del VIH y en el 70,4% fue negativo. En el resto de sustancias este dato era desconocido en la mayoría de los casos.

En el conjunto de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas, no se conoce el estado serológico frente al VIH, Hepatitis C y Hepatitis B en el 52%, 57% y 48% respectivamente.

Urgencias relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas

En 2020 el estudio de las urgencias se realizó exclusivamente en el hospital de Cruces y se seleccionaron para el Indicador los episodios directamente relacionados con el consumo de

15 eta 59 urte bitarteko pertsonengan, Drogen eta Adikzioen Espainiako Behatokiaren protokolo berriari jarraituz. Gainera, protokolo horren irizpideak jarraituz lehen aldiz erregistratzen dira alkohola larrialdiaren arrazoi gisa soilik agertzen den gertakariak.

Azterketarako, 2020ari dagokion laginetik 14.610 gertakari berrikusi ziren, eta horietatik 208 hautatu ziren.

Kasuen % 61,5 gizonak izan ziren eta % 38,5 emakumeak. Batez besteko adina 41 urtekoa izan zen gizonen artean, eta 39,7 urtekoa emakumeen artean

Emakumeen % 68,8an eta gizonen % 53,1ean aurretiko patologia psikiatrikoa zegoen, eta bietan nortasun- eta portaera-nahasmenduak izan ziren maizen aipatu zirenak.

Larrialdietako zerbitzuan ospitaleratzean agertzen ziren sintomei dagokienez, antsietatea eta asaldura, oldarkortasuna eta suminkortasuna izan ziren gehien agertu zirenak.

Ospitale-larrialdiaren substantzia-eragile nagusia, gizonetan alkohola (% 57,8) eta kokaina (% 26,6) izan ziren. Ondoren, kanabis (% 17,2), eta benzodiazepinak (% 13,3).

Hala ere, emakumeen kasuan, benzodiazepinak larrialdiko gertaerarekin erlazionatu ziren hamar kasutik seitan, eta, ondoren, alkoholarekin, hamarretik ia lautan.

Substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akutuak eragindako heriotzak

2020an, 68 pertsona hil ziren substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akutuaren ondorioz (horietako 64 EAEn bizi ziren). Guztizkoaren % 75 gizonetakoak izan ziren, batez beste 45,6 urterekin, eta gainerako % 25a emakumeetakoak, batez besteko 51 urterekin. Bai gizonetan, bai emakumeetan, igoera txiki bat izan da 2020an, adinaren arabera estandarizatutako tasa 5,92 eta 1,78 kasu izan baita 100.000 biztanleko, hurrenez hurren.

sustancias psicoactivas en personas entre 15 y 59 años siguiendo los criterios del nuevo protocolo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Además y según dicho protocolo, se registran por primera vez los episodios en los que aparece exclusivamente el alcohol como causa de la urgencia.

Para el estudio, de la muestra correspondiente a 2020 se revisaron 14.610 episodios de los cuales se seleccionaron 208.

El 61,5% de los casos fueron hombres y el 38,5% mujeres. La edad media, fue de 41 años en los hombres y de 39,7 años en las mujeres.

En el 68,8% de las mujeres y en el 53,1% de los hombres existía una patología psiquiátrica previa siendo en ambos los trastornos de personalidad y del comportamiento los que se referirieron con mayor frecuencia.

En cuanto a los síntomas presentes en el ingreso en el servicio de urgencias, fueron la ansiedad y la agitación, agresividad e irritabilidad los que se presentaban en mayor medida.

Entre las sustancias relacionadas directamente con las urgencias hospitalarias atendidas en hombres, el alcohol (57,8%) y la cocaína (26,6%) fueron las sustancias más frecuentes. A continuación, se hallaba el cannabis (17,2%) y las benzodiazepinas (13,3%).

Sin embargo, en las mujeres las benzodiazepinas se relacionaron con la urgencia en en seis de cada diez casos seguidas del alcohol, el cual estaba presente también en casi cuatro de cada diez episodios.

Fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas

En 2020, un total de 68 personas fallecieron por reacción aguda a sustancias psicoactivas (64 de ellas residentes en la CAPV). Un 75% del total fueron hombres, con 45,6 años de edad media, y el 25% restante mujeres, con 51 años de edad media. Tanto en hombres como en mujeres se ha observado un ligero ascenso en el año 2020, con una tasa estandarizada por edad de 5,92 y 1,78 casos por 100.000 respectivamente.

Erreakzio akutuz hildako pertsonetan gehien hautemandako substantzia kokaina izan zen (heriotzen % 50an), eta ondoren, bestelako antidepressiboak (%45,6ean), metadona (% 5,36ean), kokaina (% 32,4an) eta heroína (% 29,4).

Hildakoen substantzien kontsumoaren profila aldatuz joan da azken urteotan: 2000. urtean hildakoen % 92an heroína zegoen, eta 2020an, berriz, % 29,4an.

Halaber, ikusten da, aurreko urteetan bezala, batez besteko adina igo egin dela, baina kontuan izan behar da 2017tik aurrera adin guztietan erregistratzen direla heriotzak, eta ordura arte 64 urtera arte baino ez zirela erregistratzen.

Materiala eta Metodoak

Txosten honetan agertzen diren datuak Euskal Autonomia Erkidegoko Toxikomaniei buruzko Informazio Sistematik (TIS) atera dira.

Hona hemen erabilitako adierazleak dira:

TRATAMENDU ADIERAZLEAK helburu hau du: urte jakin batean, toxikomaniak tratatzeko zentroetan (bai Osakidetza eta bai zentro itundu edo pribatuak) substantzia psikoaktibo gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik tratamenduari ekiten dioten pertsonen kopurua zein den jakitea, adin guztietakoak, bai egoiliarak eta ez egoiliarak EAEn.

Datuak jasotzeko protokoloa 2013an aldatu zen azken aldiz, eta, horrenbestez, 2020ko datuak azken protokolo horren arabera jaso dira⁽¹⁾. Beste aldagai batzuk sartu dira ordezkotzat tratamenduak egiteari, injekzio-bidea erabiltzeari eta gaixotasun infekziosoei buruz.

[https://pnsd.sanidad.gob.es/gl/profesionales/sistemasinformacion/sistemainformacion/pdf/2016Protocolo_\(tratamiento\).pdf](https://pnsd.sanidad.gob.es/gl/profesionales/sistemasinformacion/sistemainformacion/pdf/2016Protocolo_(tratamiento).pdf)

Las sustancias más frecuentemente detectadas en personas fallecidas por reacción adversa fueron nordiazepam, (identificado en el 50% de las defunciones), medicamentos antidepressivos (45,6%), metadona (35,3%), cocaína (32,4%) y heroína (29,4%).

El perfil del consumo de sustancias de los fallecidos ha ido evolucionando en los últimos años pasando de encontrarse heroína en el 92% de los fallecidos en el año 2000 a encontrarse en el 29,4% en 2020.

También sigue observándose, como en años anteriores un aumento de la de la edad media aunque hay que tener en cuenta que a partir de 2017 se registran los fallecimientos en todas las edades y hasta entonces sólo se registraban hasta los 64 años.

Material y métodos

Los datos que se presentan en este informe son los que pertenecen al Sistema de Información sobre Toxicomanías de la Comunidad Autónoma del País Vasco (SIT).

Los indicadores utilizados son:

EI INDICADOR DE TRATAMIENTO tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados, de todas las edades, incluyendo residentes y no residentes en la CAPV.

El protocolo de recogida de datos sufre su última modificación en 2013 y por tanto los datos de 2020 se recogen según este último protocolo⁽¹⁾. Se han introducido nuevas variables sobre la realización de tratamientos sustitutivos, el uso de la vía inyectada y enfermedades infecciosas.

[https://pnsd.sanidad.gob.es/gl/profesionales/sistemasinformacion/sistemainformacion/pdf/2016Protocolo_\(tratamiento\).pdf](https://pnsd.sanidad.gob.es/gl/profesionales/sistemasinformacion/sistemainformacion/pdf/2016Protocolo_(tratamiento).pdf)

LARRIALDI ADIERAZLEaren Larrialdiaren diagnostikoaren eta substantzia edo droga psikoaktiboaren erabilera arteko erlazioa ezartzen duten 15-59 urteko pertsonen ospitale-larrialdiko gertakarien kopurua ezagutu nahi du. 2020an, erregistro horretarako EAEn erreferentziatzen hartu den ospitalea Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea izan da. Urgentziazko gertakari horiek Drogen Espainiako Behatokiak adostutako 12 asteetan erregistratu ziren, eta autonomia-erkidego guztietarako berdinak izan ziren.

HILKORTASUN ADIERAZLEaren bidez jakin nahi da urtean zenbat pertsona hiltzen diren, gure erkidegoan, substantzia psikoaktiboak kontsumitzean (medikuak agindu gabe eta nahita) aurkako erreakzio akutuak izan dituztelako. 2017. urteaz gero, adin guztietako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte soilik jasotzen ziren 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak).

2020ko heriotza-tasak 10-64 urte bitarteko pertsonen gainekoak ziren aurreko urteekin alderatu ahal izateko.


INDICADOR DE URGENCIAS pretende conocer el número de episodios de urgencia hospitalaria en personas de 15 a 59 años en los que se establece una relación entre diagnóstico de la urgencia y el uso de sustancias o drogas psicoactivas. En 2020 el hospital que se ha considerado de referencia en la CAPV para este registro, ha sido el Hospital Universitario de Cruces. Se registraron dichos episodios de urgencia en las 12 semanas acordadas desde el Observatorio Español de Drogas, siendo las mismas para todas las CCAA.

EI INDICADOR DE MORTALIDAD tiene como objetivo conocer el número anual de muertes por reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en nuestra Comunidad. A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años).

Las tasas de mortalidad de 2020 se han presentado para el rango de edad de 10 a 64 para poder compararlas con años anteriores.

1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoen kopurua, beraz eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2020


Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la sustancia psicoactiva que lo motiva. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

2. grafikoa. Pertsonen tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, substantzia psikoaktibo nagusiaren arabera. EAE 2020

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según sustancia psicoactiva principal. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2020

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la sustancia psicoactiva que causa dicha admisión. CAPV 2020

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Kopuru osoa Nº total	115	122	427	348	883	109	2.004	
Batez besteko adina Edad media	43,64	39,25	37,04	29,6	47,9	38,68	41,14	
Sexua Sexo								
Gizonak Hombres	85,2	71,3	89	85,6	71,9	76,1	1.581	78,9
Emakumeak Mujeres	14,8	28,7	11	14,4	28,1	23,9	423	21,1
Adin-taldea Grupo de edad								
10-14	0	0	0	0,3	0	0	1	0
15-19	0,9	0,8	2,6	19,3	0,8	8,3	96	4,8
20-24	3,5	4,1	9,4	19,5	4,1	11,9	166	8,3
25-29	5,2	4,1	11,2	17,5	5,1	10,1	176	8,8
30-34	5,2	21,3	15,2	13,5	6,6	11	214	10,7
35-39	14,8	19,7	20,1	11,2	8,9	13,8	260	13
40-44	15,7	23,8	18	9,2	12,9	7,3	278	13,9
45-49	28,7	18	15	4,9	14,4	11,9	276	13,8
50-54	18,3	6,6	6,1	3,2	15,7	7,3	213	10,6
55-59	5,2	0,8	1,6	1,1	13,4	11,9	149	7,4
60-64	2,6	0	0,7	0,3	8,7	3,7	88	4,4
65 edo gehiago / 65 ó más	0	0,8	0	0	9,4	2,8	87	4,2
Ikasketak Estudios								
Ez daki ez irakurtzen ez idazten No sabe ni leer ni escribir	0	0,8	0,9	0	0,5	0,9	10	0,5
Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	33	10,7	9,8	11,2	7	12,8	208	10,4
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	28,7	29,5	29,5	31,6	28,1	22,9	578	28,8
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	13	18	19,2	20,7	14,4	18,3	338	16,9
Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	9,6	26,2	25,8	25,6	25,5	18,3	487	24,3
Goi-mailako ikasketak amaitu ditu Ha finalizado estudios superiores	2,6	9,8	8,4	6,3	11,8	15,6	194	9,7
Ezezaguna Desconocido	13	4,9	6,3	4,6	12,8	11	189	9,4

	Heroína	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Lan egoera								
Situación laboral								
Lan-harreman mugagabea edo autonomoa Relación laboral indefinida o autónomo	6,1	27,9	32,1	20,4	30,7	14,7	536	26,7
Aldi baterako lan-harremana Relación laboral temporal	12,2	12,3	8,9	12,4	9,3	12,8	206	10,3
Soldatarik gabe, familiarentzako lanean Trabajando sin sueldo para la familia	0	0,8	0,2	1,1	0,2	1,8	10	0,5
Langabea, aurretik lanik egin gabea Parado no habiendo trabajado antes	8,7	6,6	7,7	10,9	3,4	8,3	128	6,4
Langabea, aurretik lana eginda Parado, habiendo trabajado antes	54,8	36,9	34	28,7	28,1	31,2	635	31,7
Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna Incapacitado permanente, pensionista	10,4	7,4	5,2	1,7	16,2	11	204	10,2
Ikasten edo oposizioak egiten Estudiando u opositando	0	1,6	2,1	17,5	2,3	10,1	103	5,1
Soilik etxeko lanak egiten Realizando exclusivamente labores del hogar	0,9	0	0,2	0	2	0	20	1
Beste egoera batean En otra situación	4,3	4,1	6,6	6,6	5,9	8,3	122	6,1
Ezezaguna Desconocida	2,6	2,5	3	0,6	1,9	1,8	40	2
Bizilekua								
Lugar de residencia								
Etxeak, etxebizitzak, apartamentuak Casas, pisos, apartamento	69,6	85,2	85,9	85,6	89,7	87,2	1736	86,6
Espetxea, adingabeentzako barneratze- zentroa edo erreforma-zentroa Prisión centro de reforma o internamiento menores	13	2,5	4,9	4,6	0,8	1,8	64	3,2
Beste erakunde batzuk Otras instituciones	2,6	3,3	3	3,2	2,3	0	51	2,5
Pentsioak, hotelak eta ostatuak Pensiones, hoteles, hostales	1,7	0,8	0	1,1	0,6	0	12	0,6
Ostatu hartze ezegonkorra/behin-behinekoa Alojamiento inestable/precario	5,2	4,1	2,8	2,3	3,1	3,7	62	3,1
Beste lekuren bat Otro lugar	5,2	3,3	0,9	2,3	2,6	6,4	52	2,6
Ezezaguna Desconocido	2,6	0,8	2,3	0,9	1	0,9	27	1,3
Bizikidetzak								
Convivencia								
Bakarrik Solo/a	33	23	17,8	16,1	27,6	25,7	470	23,5
Bikotekidearekin baino ez Únicamente con pareja	12,2	8,2	11,7	9,2	15,7	10,1	256	12,8
Seme-alabekin baino ez Únicamente con hijos	1,7	2,5	3,5	3,7	5,8	4,6	89	4,4
Bikotekidearekin eta seme-alabekin Con pareja e hijos	9,6	9	16,2	9,2	19,4	9,2	304	15,2
Gurasoekin edo jatorrizko familiarekin Con padres o familia de origen	23,5	41,8	32,1	45,1	19,1	33,9	578	28,8
Lagunekin Con amigos	9,6	7,4	7,7	6	4,8	6,4	123	6,1
Atxilotua Detenido	6,1	2,5	4,2	4,6	1,1	1,8	56	2,8
Erakunde batean, atxilotua egon gabe En instituciones no detenido	1,7	2,5	3,7	3,4	3,1	1,8	62	3,1
Beste batzuk Otros	0,9	1,6	2,1	1,7	3,1	3,7	49	2,4
Ezezaguna Desconocida	1,7	1,6	0,9	0,9	0,3	2,8	17	0,8

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Jaioterria								
País de nacimiento								
<i>Espainia</i> España	83,5	91	82,2	80,5	77,9	77,1	1.610	80,3
Europar Batasuna Unión Europea (26)	2,6	1,6	1,6	0,3	4,2	0,9	51	2,5
<i>Europako gainerako herrialdeak</i> Resto de europa	6,1	0	0	0,6	1,7	0,9	25	1,2
Iparaldeko Afrika África del norte	3,5	1,6	9,1	10,6	4	16,5	135	6,7
Saharaz hegoaldeko Afrika África Subsahariana	2,6	0,8	0	0,3	1,2	0,9	17	0,8
Ipar Amerika América del Norte	0	0,8	0,2	0	0,1	0,9	4	0,2
Erdialdeko Amerika eta Karibea América Central y Caribe	0	0,8	1,4	1,7	2,2	0	32	1,6
Hego Amerika América del Sur	0,9	3,3	5,4	5,7	8,5	2,8	126	6,3
Asia Asia	0,9	0	0	0,3	0,1	0	3	0,1
Ezezaguna Desconocido	0	0	0	0	0,1	0	1	0
Erreferentzia								
Fuente de referencia								
<i>Droga-mendekotasunen beste zerbitzu bat</i> Otro servicio drogodependencias	15,7	6,6	7,7	4	3,9	6,4	114	5,7
<i>Mediku orokorra, lehen mailako atentzioa</i> Médico General, atención primaria de salud	12,2	23	25,5	30,2	41,7	32,1	659	32,9
<i>Ospitalea edo bestelako osasun-zerbitzuak</i> Hospital u otros servicios de salud	7	23	7,3	16,7	21,5	15,6	332	16,6
<i>Gizarte-zerbitzuak</i> Servicios sociales	2,6	1,6	2,8	4	3,5	3,7	66	3,3
<i>Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa</i> Prisión, centro de reforma o internamiento menores	12,2	2,5	6,8	5,5	1,6	1,8	81	4
<i>Lege-zerbitzuak edo polizia-zerbitzuak</i> Servicios legales o policiales	2,6	4,9	3,3	7,5	2,2	2,8	71	3,5
<i>Enpresa edo enplegu-emailea</i> Empresa o empleador	0	0	0,5	0,3	0,3	0	6	0,3
<i>Senideak edo lagunak</i> Familiares o amigos	2,6	10,7	11,2	8,6	6,5	7,3	159	7,9
<i>Norberaren ekimenez</i> Iniciativa propia	41,7	25,4	34	21,6	16,4	27,5	474	23,7
<i>Hezkuntza-zerbitzuak</i> Servicios de educación	2,6	0,8	0,5	1,4	1,7	0,9	27	1,3
<i>Besteren bat</i> Otra	0,9	1,6	0,5	0,3	0,8	1,8	15	0,7
Ezezaguna Desconocida								
Aurretik beste tratamendurik								
Tratamiento previo								
<i>Bai, droga berarengatik</i> Sí, por la misma droga	76,5	46,7	46,6	39,4	43	32,1	896	44,7
<i>Bai, Bestelako droga batengatik</i> Sí, por una droga diferente	2,6	7,4	4	1,7	2,4	9,2	66	3,3
<i>Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik</i> Sí, por la misma droga y por una droga diferente	5,2	6,6	4,9	4	2,3	4,6	74	3,7
<i>Ez, inoiz ez</i> No, nunca	14,8	36,1	42,4	54,6	50,7	48,6	933	46,6
Ezezaguna Desconocido								

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Kontsumo denbora								
Tiempo de consumo (en años)								
0-2	3,5	6,6	6,6	6,9	1,9	12,8	95	4,7
3-5	5,2	3,3	9,4	12,4	2,8	13,8	133	6,6
6-10	9,6	14,8	14,1	23,6	6,5	19,3	249	12,4
11-15	11,3	11,5	14,3	14,7	7,6	7,3	214	10,7
16-20	10,4	18,9	20,1	14,4	7,8	11	252	12,6
21-25	8,7	13,1	14,5	10,9	9,6	4,6	216	10,8
25 edo gehiago / 25 y más	40,9	17,2	14,8	9,8	50,3	11,9	622	31
Ezezaguna / desconocido	10,4	14,8	6,3	7,5	13,5	19,3	223	11,1
Kontsumoaren maiztasuna								
Frecuencia de consumo								
<i>Egunero</i>								
Todos los días	46,1	23,8	21,5	72,4	58,3	57,8	1004	50,1
<i>4-6 egun/aste</i>								
4-6 días/semana	1,7	21,3	14,1	5,5	6,5	5,5	170	8,5
<i>2-3 egun/aste</i>								
2-3 días/semana	8,7	14,8	21,3	6	13,6	9,2	270	13,5
<i>1 egun/aste</i>								
1 día/semana	3,5	8,2	8,7	0,9	2,3	5,5	80	4
<i>1 egun/aste baino gutxiago</i>								
Menos de 1 día/semana	6,1	10,7	9,6	1,7	3,4	6,4	104	5,2
<i>Ez zuen kontsumitu</i>								
No consumió	33	18	23,9	13,5	15,3	15,6	361	18
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocida	0,9	3,3	0,9	0	0,7	0	15	0,7
Kontsumitzeko bidea								
Vía de consumo								
<i>Ahotik</i>								
Oral	0	7,4	0	1,7	100	58,7	962	48
<i>Biriketarik edo errez</i>								
Pulmonar o fumada	69,6	1,6	15,9	98,3	0	3,7	496	24,8
<i>Sudurretik edo esnifatuz</i>								
Intranasal o esnifada	7,8	87,7	82,2	0	0	33,9	504	25,1
<i>Parenterala edo xiringen bidez</i>								
Parenteral o inyectada	20,9	1,6	1,6	0	0	1,8	35	1,7
<i>Besteren bat</i>								
Otra	0,9	0	0	0	0	1,8	3	0,1
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocida	0,9	1,6	0,2	0	0	0	4	0,2
GIB								
VIH								
<i>Positiboa</i>								
Positivo	8,7	4,9	2,8	0,6	0,3	4,6	38	1,9
<i>Negatiboa</i>								
Negativo	70,4	41,8	46,6	35,1	33,7	42,2	797	39,8
<i>Emaitzaren zain</i>								
Pendiente de resultado	0,9	0	0	0,9	1,2	0	15	0,7
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocido	20	53,3	50,6	63,5	64,7	53,2	1154	57,6
GUZTIRA	100	100	100	100	100	100	2.004	100
TOTAL								

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

* Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak", "Beste substantzia psikoaktibo batzuk", "Beste estimulatzaile batzuk" eta "Substantzia lurrunkorrak", "Extasia" eta "Hipnolasaigarriak eta Haluzinogenoak".

* Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes", "Sustancias volátiles", "Éxtasis" y "Hipnosedantes y Alucinógenos".

Drogen Espainiako Behatokiaren analisietan bezala, substantzia nagusia "Heroina + Kokaina" bada, heroinaren taldean aztertzen da.

Al igual que en los análisis del Observatorio Español de Drogas, en el caso de que la sustancia principal sea heroína + cocaína, se incluye en el grupo de la heroína.

2. taula. TRATAMENDU ADIERAZLEA. *Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera, tratamenduan hastea eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2000-2020*

Tabla 2. INDICADOR DE TRATAMIENTO. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según sustancia psicoactiva que motiva la admisión. CAPV 2000-2020

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
HASITAKOEN KOP. GUZTIRA Nº DE INICIOS TOTAL	1.408	1.432	1.443	1.728	1.894	1.818	1.701	1.671	1.804	1.671	1.666	1.552	1.576	1.484	1.466	1.405	1.392	1.449	1.546	1.456	1.121	
SUBSTANTZIA NAGUSIA SUSTANCIA PRINCIPAL																						
<i>Heroina</i> Heroína	897	849	728	636	611	515	504	435	467	442	423	330	301	253	224	237	198	174	192	169	97	
<i>Kokaina</i> Cocaína	322	377	438	735	902	941	833	826	904	768	710	655	600	529	463	404	456	540	550	524	427	
<i>Anfetaminak</i> Anfetaminas	40	41	85	68	73	65	55	75	68	72	69	84	70	95	132	140	155	134	178	125	101	
<i>Speeda</i> Speed	32	19	44	55	62	52	61	65	75	66	58	63	76	61	41	38	31	24	19	23	21	
<i>Extasia</i> Éxtasis	13	21	14	5	2	2	0	4	1	2	1	1	0	0	5	1	2	3	1	1	1	
<i>Hipnotikoa eta lasaigarria</i> Hipnóticos y sedantes	15	8	10	15	16	17	3	11	12	11	15	21	24	20	20	14	23	17	16	27	35	
<i>Haluzinogenoak</i> Alucinógenos	1	1	2	3	4	4	1	4	4	7	8	18	17	22	13	13	12	11	9	28	16	
<i>Cannabisa</i> Cannabis	73	106	115	150	177	183	189	208	235	269	346	352	455	472	472	472	439	430	464	462	348	
<i>Heroina+kokaina</i> Heroína+cocaína	0	0	0	0	25	23	17	15	6	9	6	6	7	4	19	19	17	29	28	22	18	
<i>Beste batzuk*</i> Otros*	15	10	7	61	22	16	38	28	32	25	30	22	26	28	77	67	59	87	89	75	57	

* Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak"; "Beste substantzia psikoaktibo batzuk"; "Beste estimulatzaile batzuk" eta "Substantzia lurrunkorrak".


* Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes" y "Sustancias volátiles".

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 2000-2020


Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 2000-2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4. grafikoa. Heroina abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 2000-2020


Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4.1 grafikoa. Espainian 2000-2020n heroína abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 2000-2020



Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun Ministerioa.
 Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad,

5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratatamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 2000-2020


Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

5.1 grafikoa. Espainian 2000-2020n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 2000-2020



Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun Ministerioa
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad.

6. grafikoa. *Cannabis* abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2020


Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *cannabis* según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020



Iturria: *Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza, Osasun Saila.*
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

6.1. grafikoa. *Espainian 2000-2020n cannabis* abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *cannabis* en España 2000-2020



Iturria: *Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe.* Osasun Ministerioa.
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad.

7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2020

Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 2000-2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2020

Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV 2020

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Kopurua, guztira Número total	635 (71,9%)	248 (28,1%)	883	
<i>Batez besteko adina tratamendua hastean (urtetan)</i> Edad media al inicio de tratamiento (en años)	47,41	49,16	47,9	
<i>Batez besteko adina kontsumoa hastean (urtetan)</i> Edad media al inicio del consumo (en años)	18,57	21,53	19,38	
Lurralde historikoa Territorio Histórico				
Araba/Alava	25,2	15,3	198	22,4
Gipuzkoa	21,1	31,9	213	24,1
Bizkaia	53,7	52,8	472	53,5
Ikasketak Estudios				
<i>Ez daki ez irakurtzen ez idazten</i> No sabe ni leer ni escribir	0,2	1,2	4	0,5
<i>Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu</i> No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	7,2	6,5	62	7
<i>Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du</i> Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	29,8	23,8	248	28,1
<i>Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du</i> Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	14,5	14,1	127	14,4
<i>Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du</i> Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	25,8	24,6	225	25,5
<i>Goi-mailako ikasketak amaitu ditu</i> Ha finalizado estudios superiores	10,1	16,1	104	11,8
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	12,4	13,7	113	12,8
Lan egoera Situación laboral				
<i>Lan harreman mugagabea edo aldi baterakoa</i> Relación laboral indefinida o autónomo	31,7	28,2	271	30,7
<i>Aldi baterako lan harremana</i> Relación laboral temporal	9	10,1	82	9,3
<i>Lanean, familiarentzako soldatarik gabe</i> Trabajando sin sueldo para la familia	0	0,8	2	0,2
<i>Langabetua, aurretik lan egin gabekoa</i> Parado no habiendo trabajado antes	2,8	4,8	30	3,4
<i>Langabetua, aurretik lan egindakoa</i> Parado, habiendo trabajado antes	28,3	27,4	248	28,1
<i>Ezindu iraunkorra, pentsioduna</i> Incapacitado permanente, pensionista	17,5	12,9	143	16,2
<i>Ikasten edo oposizioak egiten</i> Estudiando u opositando	2,2	2,4	20	2,3
<i>Etxeke lanak bakarrik egiten ditu</i> Realizando exclusivamente labores del hogar	0,2	6,9	18	2
<i>Beste egoera batean</i> En otra situación	6,8	3,6	52	5,9
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	1,6	2,8	17	1,9


	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Jaioterria				
País de nacimiento				
Espainia España	78,7	75,8	688	77,9
Europar Batasuna Unión Europea (26)	4,3	4	37	4,2
Europako gainerako herrialdeak Resto de europa	1,4	2,4	15	1,7
Iparaldeko Afrika África del norte	5,4	0,4	35	4
Saharaz hegoaldeko Afrika África Subsahariana	1,3	1,2	11	1,2
Ipar Amerika América del Norte	0,2	0	1	0,1
Erdialdeko Amerika eta Karibea América Central y Caribe	1,6	3,6	19	2,2
Hego Amerika América del Sur	6,9	12,5	75	8,5
Asia Asia	0,2	0	1	0,1
Ezezaguna Desconocida	0,2	0	1	0,1
Bizikidetza				
Convivencia				
Bakarrik Solo/a	28,2	26,2	244	27,6
Bikotekidearekin bakarrik Únicamente con pareja	15,7	15,7	139	15,7
Seme-alabekin bakarrik Únicamente con hijos	2,4	14,5	51	5,8
Bikotekidearekin eta seme-alabekin Con la pareja e hijos	19,4	19,4	171	19,4
Gurasoekin edo berezko familiarekin Con padres o familia de origen	20,8	14,9	169	19,1
Lagunekin Con amigos	6	1,6	42	4,8
Atxilotua Detenido	0,9	1,6	10	1,1
Erakunde batean, atxilotua egon gabe En instituciones no detenido	3,3	2,4	27	3,1
Beste batzuk Otros	3,1	2,8	27	3,1
Ezezaguna Desconocida	0,2	0,8	3	0,3
Erreferentzia				
Referencia				
Beste drogomendekotasun zerbitzu bat Otro servicio Drogodependencias	3,3	5,2	34	3,9
Mediku orokorra, lehen mailako arretoa Médico General, atención primaria de salud	41,6	41,9	368	41,7
Ospitalea edo beste osasun zerbitzu batzuk Hospital u otros servicios de salud	21,4	21,8	190	21,5
Gizarte zerbitzuak Servicios sociales	2,8	5,2	31	3,5
Espetxea, gazteentzako zentratze-zentroa edo zentro itxia Prisión, centro de reforma o internamiento menores	2,2	0	14	1,6

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
<i>Lege edo polizia zerbitzuak</i> Servicios legales o policiales	2,8	0,4	19	2,2
<i>Enpresa edo enplegu emailea</i> Empresa o empleador	0,3	0,4	3	0,3
<i>Senideak edo lagunak</i> Familiares o amigos	6,9	5,2	57	6,5
<i>Bere kabuz</i> Iniciativa propia	15,9	17,7	145	16,4
<i>Besteren bat</i> Otra	1,7	1,6	15	1,7
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,9	0,4	7	0,8
Aurretik beste tratamendurik Tratamiento previo				
<i>Bai, droga berarengatik</i> Sí, por la misma droga	41,3	47,6	380	43
<i>Bai, Bestelako droga batengatik</i> Sí, por una droga diferente	2,7	1,6	21	2,4
<i>Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik</i> Sí, por la misma droga y por una droga diferente	2,7	1,2	20	2,3
<i>Ez, inoiz ez</i> No, nunca	52,1	47,2	448	50,7
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	1,3	2,4	14	1,6
Kontsumoaren maiztasuna Frecuencia de consumo				
<i>Egunero</i> Todos los días	59,5	55,2	515	58,3
<i>4-6 egun/aste</i> 4-6 días/semana	5,7	8,5	57	6,5
<i>2-3 egun/aste</i> 2-3 días/semana	12,8	15,7	120	13,6
<i>1 egun/aste</i> 1 día/semana	2,4	2	20	2,3
<i>1 egun/aste baino gutxiago</i> Menos de 1 día/semana	2,8	4,8	30	3,4
<i>Ez zuen kontsumitu</i> No consumió	16,1	13,3	135	15,3
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,8	0,4	6	0,7
Kontsumo denbora Tiempo de consumo				
0-2	1,6	2,8	17	1,9
3-5	2,5	3,6	25	2,8
6-10	6,6	6	57	6,5
11-15	7,9	6,9	67	7,6
16-20	8,2	6,9	69	7,8
21-25	8,7	12,1	85	9,6
25 y +	52,3	45,2	444	50,3
<i>Ezezaguna/Desconocido</i>	12,3	16,5	119	13,5
GUZTIRA TOTAL	100	100	883	100

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020


Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 2000-2020



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezeko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2020


Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. Toxicomanías no Alcohólicas. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020


Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud


11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2020

Gráfico 11. Situación del test VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAPV 2020




11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2020

Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAPV 2020




12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2020

Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAPV 2020




12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2020

Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

13.grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2020
Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAPV 2020



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

4. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren ezaugarriak, sexuaren arabera. 2020 urtea

Tabla 4. Características de los episodios de urgencia relacionados con consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Año 2020

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	
Gertakari kopurua Nº de episodios	128 (61,5%)	80 (38,5%)	208	
Batez besteko adina Edad media (en años)	41,0	39,7	40,5	
	%	%	Kop./Nº	%
Adin taldea Grupo de edad				
15-19	3,9	10	13	6,3
20-24	8,6	7,5	17	8,2
25-29	8,6	5	15	7,2
30-34	6,3	11,3	17	8,2
35-39	11,7	7,5	21	10,1
40-44	15,6	23,8	39	18,8
45-49	17,2	7,5	28	13,5
50-54	11,7	18,8	30	14,4
55-59	16,4	8,8	28	13,5
Zirkulazio-istripua Accidente de Tráfico				
<i>Ez</i> No	97,7	100	205	98,6
<i>Bai</i> Sí	2,3	0	3	1,4
Aurretiko patologia psikiatrikoa Patología Psiquiátrica previa				
<i>Ez</i> No	46,9	31,3	85	40,9
<i>Bai</i> Sí	53,1	68,8	123	59,1
Urgentzia ebaztea Resolución de la urgencia				
<i>Medikuaren alta</i> Alta médica	77,3	81,3	164	78,8
<i>Borondatezko alta</i> Alta voluntaria	3,1	2,5	6	2,9
<i>Ospitaleratzea</i> Ingreso hospitalario	7,8	6,3	15	7,2
<i>Heriotza</i> Muerte	0	0	0	0
<i>Beste osasun zentro batera eramatea</i> Traslado a otro centro sanitario	10,9	10	22	10,6
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,8	0	1	0,5
Guztira/Total	100	100	208	100

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

5. taula Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdietako aurretiko patologia psikiatrikoa*, sexuaren arabera. 2020 urtea.

Tabla 5. Patología psiquiátrica* previa referida en las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2020

Hurrenkera	GNS-10 (3 digitu)	Diagnostiko multzoa	%			KOP./N°
			Gizonak	Emakumeak	Guztira	Guztira
Orden	CIE-10 (3 dígitos)	Categoría diagnóstica	Hombres	Mujeres	Total	Total
1	F60-F69	<i>Helduen nortasun eta portaeraren trastornoak</i> Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	32,9%	35,30%	34,0%	51
2	F40-F48	<i>Antsieta trastornoak, disoziatiboak, estresarekin lotutakoak, somatomorfoak eta psikotikoak ez diren beste trastorno mental batzuk</i> Trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados con estrés, somatomorfos y otros trastornos mentales no psicóticos	17,1%	33,8%	24,7%	37
3	F20-F29	<i>Eskizofrenia, trastrono eskizotipikoa, eldarnioa eta gogo-aldartearekin zerikusirik ez duten beste trastorno psikotiko batzuk</i> Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, delirante y otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo	20,7%	4,4%	13,3%	20
4	F30-F39	<i>Gogo-aldartearen trastornoak (afektiboak)</i> Trastornos del estado de ánimo (efectivos)	12,2%	13,2%	12,7%	19
5	F10-F19	<i>Substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko trastorno mentalak eta portaera-trastornoak</i> Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas	13,4%	5,9%	10,0%	15
6	F50-F59	<i>Trastorno fisiologikoekin eta faktore fisikoekin lotutako portaera-sindromeak</i> Síndromes de comportamiento asociados a trastornos fisiológicos y factores físicos	0,0%	4,4%	2,0%	3
7	T40-T43 T51	<i>Substantzia psikoaktiboekin autoinflingitutako pozoidurak, OH barne</i> Envenenamientos autoinflingidos con sustancias psicoactivas incluido el OH	0,0%	2,9%	1,3%	2
8	F90-F98	<i>Portaeraren eta hunkipenen trastornoak, normalean haurtzaroan eta nerabezaroan hasten direnak</i> Trastornos del comportamiento y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia	2,4%	0,0%	1,3%	2
10	F70-F79	<i>Desgaitasun intelektual</i> Discapacidad intelectual	1,2%	0,0%	0,7%	1
Guztira/Total			100,0%	100,0%	100,0%	150

*CIE10-Esen 5. kapituluko (F01-F99) dianostikoak eta substantzia psikoaktiboekin autoinflingitutako pozoitzeak hartzen dira kontuan.

*Se consideran los diagnósticos del capítulo 5 (F01-F99) y envenenamientos autoinflingidos con sustancias psicoactivas de la CIE10-ES

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

6. taula Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren diagnostikoak* sexuaren arabera. 2020 urtea.

Tabla 6. Diagnósticos* de los episodios de urgencia relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2020

Hurrenkera	GNS-10 (3 dígitu)	Diagnostiko multzoa	%			Kop./Nº
			Gizonak	Emakumeak	Guztira	Guztira
Orden	CIE-10 (3 dígitos)	Categoría diagnóstica	Hombres	Mujeres	Total	Total
1	F10-F19	Substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko trastorno mentalak eta portaera-trastornoak Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas	66,0%	39,2%	56,1%	183
2	S00-T88	Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	9,7%	38,3%	20,2%	66
3	R00-R99	Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	5,8%	5,8%	5,8%	19
4	F60-F69	Helduen nortasun eta portaeraren trastornoak Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	5,3%	5,8%	5,5%	18
5	F40-F48	Antsietate trastornoak, disoziatiboak, estresarekin lotutakoak, somatoformeak eta psikotikoak ez diren beste trastorno mental batzuk Trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados con estrés, somatomorfos y otros trastornos mentales no psicóticos	3,4%	5,0%	4,0%	13
6	F20-F29	Eskizofrenia, trastrono eskizotipikoa, eldarnioa eta gogo-aldartearekin zerikusirik ez duten beste trastorno psikotiko batzuk Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, delirante y otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo	1,9%	1,7%	1,8%	6
7	Z00-Z99	Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin edukitako kontaktua Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	1,9%	0,8%	1,5%	5
8	E00-E89	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,9%	0,0%	1,2%	4
9	G00-G99	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	1,9%	0,0%	1,2%	4
10	F30-F39	Gogo-aldartearen trastornoak (afektiboak) Trastornos del estado de ánimo (afectivos)	1,0%	1,7%	1,2%	4
11	N00-N99	Sistema genito-urinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	0,5%	0,8%	0,6%	2
12	F90-F98	Portaeraren eta hunkipenen trastornoak, normalean haurtzaroan eta nerabezaroan hasten direnak Trastornos del comportamiento y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia	0,0%	0,8%	0,3%	1
13	F50-F59	Trastorno fisiologikoekin eta faktore fisikoekin lotutako portaera-sindromeak Síndromes de comportamiento asociados a trastornos fisiológicos y factores físicos	0,0%	0,8%	0,3%	1
Guztira/Total			100,0%	100,0%	100,0%	326

*CIE10-ES kategorien arabera, 5. kapitulua zehatzago banakatuz

*Por categorías CIE10-ES desglosándose el capítulo 5 más detalladamente

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

7. taula. Larrialdi-gertakariarekin lotutako sintomak, sexuaren arabera. 2020 urtea.

Tabla 7. Síntomas relacionados con el episodio de urgencia según sexo. Año 2020

Hurrenkera Orden	GIZONAK HOMBRES		EMAKUMEAK MUJERES	
	Larrialdiarekin lotutako sintomak Síntomas relacionados con la urgencia	%	Larrialdiarekin lotutako sintomak Síntomas relacionados con la urgencia	%
1	Asaldura/Erasoa/Iritagarritasuna Agitación/Agresividad/Irritabilidad	26,7%	Ansiedad Antsietatea	29,2%
2	Ansiedad Antsietatea	16,4%	Asaldura/Erasoa/Iritagarritasuna Agitación/Agresividad/Irritabilidad	26,2%
3	Alucinaciones/Delirios/Episodios psicóticos Haluzinazioak / Delirioak / Episodio psikotikoak	11,2%	Koma/kontzientzia-galera/Síncope Coma/Pérdida de conciencia/Síncope	9,2%
4	Desorientazio Desorientación	8,6%	Zehaztutako beste sintoma batzuk Otros síntomas especificados	7,7%
5	Zehaztutako beste sintoma batzuk Otros síntomas especificados	7,8%	Gorakoak/Goragaleak Vómitos/Náuseas	6,2%
6	Koma/kontzientzia-galera/Síncope Coma/Pérdida de conciencia/Síncope	6,0%	Zorabioak/Bertigoa Mareos/Vértigo	6,2%
7	Gorakoak/Goragaleak Vómitos/Náuseas	4,3%	Abdomeneko min Dolor abdominal	4,6%
8	Bularreko edo toraxeko mina Dolor de pecho/torácico	3,5%	Desorientazio Desorientación	3,1%
9	Zorabioak/Bertigoa Mareos/Vértigo	3,5%	Palpitazioak/Arritmiak/Takikardiak Palpitaciones/Arritmias/Taquicardias	1,5%
10	Palpitazioak/Arritmiak/Takikardiak Palpitaciones/Arritmias/Taquicardias	2,6%	Dardarak Temblores	1,5%
11	Abdomeneko min Dolor abdominal	1,7%	Beherakoa Diarrea	1,5%
12	Buruko mina/zefalea Dolor de cabeza/cefalea	1,7%	Ezgonkortasuna martxan/ataxia/zerebelosen sintomak Inestabilidad en la marcha/ataxia/síntomas cerebelosos	1,5%
13	Dardarak Temblores	1,7%	Miosia/begi-ninien kontrakzioa Miosis/Contracción pupilar	1,5%
14	Konbultsioak/Krisi epileptikoak edo toniko klonikoak Convulsiones/Crisis epilépticas o tonico clónicas	0,9%	Alucinaciones/Delirios/Episodios psicóticos Haluzinazioak / Delirioak / Episodio psikotikoak	0,0%
15	Arnas depresioa Depresión respiratoria	0,9%	Bularreko edo toraxeko mina Dolor de pecho/torácico	0,0%
16	Beherakoa Diarrea	0,9%	Buruko mina/zefalea Dolor de cabeza/cefalea	0,0%
17	Nekea/Kansantzioa Fatiga/Cansancio	0,9%	Nekea/Kansantzioa Fatiga/Cansancio	0,0%
18	Ezgonkortasuna martxan/ataxia/zerebelosen sintomak Inestabilidad en la marcha/ataxia/síntomas cerebelosos	0,9%	Konbultsioak/Krisi epileptikoak edo toniko klonikoak Convulsiones/Crisis epilépticas o tonico clónicas	0,0%
19	Miosia/begi-ninien kontrakzioa Miosis/Contracción pupilar	0,0%	Arnas depresioa Depresión respiratoria	0,0%
	Guztira/Total	100,0%	Guztira/Total	100,0%

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

8. taula. Larrialdi-gertakariekin lotutako substantzien kopurua eta ehunekoa*, sexuaren arabera. 2020 urtea

Tabla 8. Número y porcentaje* de las sustancias relacionadas con los episodios de urgencias según sexo. Año 2020

LOTUTAKO SUBSTANTZIA SUSTANCIA RELACIONADA	GIZONAK HOMBRES		LOTUTAKO SUBSTANTZIA SUSTANCIA RELACIONADA	EMAKUMEAK MUJERES	
	Kop. Nº	%		Kop. Nº	%
Alkohola Alcohol	74	57,8%	Benzodiazepinak Benzodiacepinas	50	62,5%
Kokaina hautsa Cocaína polvo	34	26,6%	Alkohola Alcohol	30	37,5%
Cannabisa, belarra edo erretxina Cannabis hierba o resina	22	17,2%	Beste farmako batzuk Otros farmacos	13	16,3%
Benzodiazepinak Benzodiacepinas	17	13,3%	Kokaina hautsa Cocaína polvo	8	10,0%
Anfetaminak Anfetaminas	12	9,4%	Cannabisa, belarra edo erretxina Cannabis hierba o resina	7	8,8%
Beste farmako batzuk Otros farmacos	6	4,7%	Anfetaminak Anfetaminas	4	5,0%
Ketamina Ketamina	4	3,1%	Beste opioide batzuk Otros opioides	2	2,5%
Beste estimulante batzuk Otros estimulantes	3	2,3%	Heroína Heroína	1	1,3%
Beste opioide batzuk Otros opioides	2	1,6%	MDMA (estasia) eta deribatuenak MDMA (éxtasis) y derivados	1	1,3%
Heroína Heroína	2	1,6%	Zehaztu gabeko beste substantzia psikoaktibo batzuk Otras sustancias psicoactivas sin especificar	1	1,3%
MDMA (estasia) eta deribatuenak MDMA (éxtasis) y derivados	1	0,8%	Kokaina base Cocaína base	1	1,3%
Zehaztu gabeko beste substantzia psikoaktibo batzuk Otras sustancias psicoactivas sin especificar	1	0,8%	Katinonak Catinonas	1	1,3%
Substantzia Bolatileak Sustancias Volátiles	1	0,8%	Beste hipnotiko-sedante batzuk Otros Hipnóticos-sedantes	1	1,3%
Metanfetaminak Metanfetaminas	1	0,8%	Ketamina Ketamina	0	0,0%
Kokaina base Cocaína base	0	0,0%	Beste estimulante batzuk Otros estimulantes	0	0,0%
Katinonak Catinonas	0	0,0%	Substantzia Bolatileak Sustancias Volátiles	0	0,0%
Beste hipnotiko-sedante batzuk Otros Hipnóticos-sedantes	0	0,0%	Metanfetaminak Metanfetaminas	0	0,0%
GUZTIRA TOTAL	180		GUZTIRA TOTAL	120	

*Larrialdiko gertaeren kopuruaren gainean egindako ehunekoa

*Porcentaje realizado sobre el nº de episodios de urgencia


Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

9. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2020
Tabla 9. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2020

	Kop. - N°	%
KOPURUA, GUZTIRA NÚMERO TOTAL	68	
AMEE Zuzendariordeztzak		
Subdirecciones IVML		
AMEE Araba - IVML Álava	12	17,65
AMEE Gipuzkoa - IVML Gipuzkoa	16	23,53
AMEE BIZKAIA - IVML Bizkaia	40	58,82
Sexua		
Sexo		
Gizonak - Hombre	51	75
Emakumeak - Mujer	17	25
Batez besteko adina		
Edad media		
Gizonak - Hombre	45,57	
Emakumeak - Mujer	51,12	
Adin taldea		
Grupo de edad		
20-24	2	2,94
25-29	2	2,94
30-34	4	5,88
35-39	3	4,41
40-44	14	20,59
45-49	15	22,06
50-54	18	26,47
55-59	6	8,82
60-64	1	1,47
70-74	1	1,47
75-79	2	2,94
Hilotzaren jatorria		
Procedencia del cadáver		
Etxea - Domicilio	46	67,65
Hotela edo ostatua - Hotel o pensión	2	2,94
kalea - Calle	5	7,35
Establecimiento público	4	5,88
Ospitalea - Hospital	1	1,47
Espetxea-Cárcel	1	1,47
Beste - Otros	1	1,47
Ezezaguna - Desconocido	8	11,76
GIB		
VIH		
Positiboa - Positivo	14	20,59
Negatiboa - Negativo	42	61,76
Ezezaguna - Desconocido	12	17,65
Suizidioa		
Suicidio		
Ebidentziak daude - Sí hay evidencias	17	25
Ez dago ebidentziarik - No hay evidencias	51	75

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

14. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020
Gráfico 14. Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 2000-2020



* Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarrera egokituta, 100.000 biztanlerako tasak.

* Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza, Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

10. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2020

Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2020

DROGA DROGA	Kop. Nº	%*
Nordiazepama** Nordiazepam**	34	50,00
Bestelako antidepresiboak Otros medicamentos antidepresivos especificados	31	45,59
Metadona Metadona	24	35,29
Kokaina Cocaína	22	32,35
Heroína Heroína	20	29,41
Cannabisa Cannabis	19	27,94
Eragin handiko lasaigarriak edo antipsikotiko zehatzak Tranquilizantes mayores o antipsicóticos especificados	19	27,94
Lorazepama Lorazepam	18	26,47
Anfetaminak (zehaztu gabe) Anfetaminas (sin especificar)	14	20,59
Alprazolama Alprazolam	14	20,59
Lormetazepama Lormetazepam	14	20,59
Alkohola Alcohol	12	17,65
Oxazepama** Oxazepam**	11	16,18
Diazepama Diazepam	10	14,71
Metanfetamina Metanfetamina	9	13,24
Klonazepama Clonazepam	8	11,76
Tramadol Tramadol	5	7,35
Buprenorfina y Naloxona (Suboxone) Buprenorfina y Naloxona (Suboxone)	3	4,41
Pregabalina Pregabalina	3	4,41
Gabapetina Gabapetina	3	4,41
Buprenorfina Buprenorfina	2	2,94
Bupropion Bupropion	2	2,94
Midazolama Midazolam	2	2,94
Flurazepama Flurazepam	2	2,94
Bestelako substantzia psikoaktiboak Otras sustancias psicoactivas especificadas	11	16,18
GUZTIRA TOTAL	312	

* Hildako kopuru osoaren gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de fallecidos.

**Nordiazepam eta Oxazepam hainbat benzodiazepinaren metabolito aktiboak dira, adibidez: diazepam, klorazepato eta klordiazepoxidoarena, baita temazepamarena ere. Oxazepamaren kasuan, botika gisa ere merkaturatzen da.

**Nordiazepam y Oxazepam son metabolitos activos de diferentes benzodiazepinas como diazepam, clorazepato, clordiazepóxido e incluso temazepam. En el caso del Oxazepam también se comercializa como fármaco.

***Soilik ulertuko da heroína kontsumitu dela analisi toxikologikoan 6-monoacetil morfina edo heroína agertzen bada.

***Sólo se ha considerado que se ha consumido heroína cuando en el análisis toxicológico aparece 6-monoacetil morfina o heroína

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

11. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2020

Tabla 11. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2020

Sexua Sexo	Urtea Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gizonak Hombres	Kop. Nº	31	31	29	30	23	46	40	36	31	35	31	37	45	42	40	36	41	41	34	45	49
	Tasa gordina Tasa bruta	5,34	5,61	5,29	3,92	3,03	6,11	5,12	4,58	3,94	4,44	3,93	4,69	5,85	5,51	5,29	4,75	5,44	5,45	4,5	5,96	6,45
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	5,13	5,22	4,82	3,38	2,54	5,15	4,46	3,86	3,45	3,78	3,44	4,11	5,11	4,61	4,65	4,17	4,9	4,87	4,02	5,76	5,92
	(KT % 95) (IC95%)	(3,32-6,94)	(3,34-6,99)	(3,06-6,57)	(2,16-4,59)	(1,50-3,58)	(3,63-6,68)	(3,07-5,85)	(2,60-5,13)	(2,22-4,67)	(2,52-5,03)	(2,21-4,68)	(2,77-5,46)	(3,60-6,63)	(3,21-6,01)	(3,21-6,09)	(2,81-5,54)	(3,39-6,41)	(3,37-6,37)	(2,66-5,38)	(4,06-7,46)	(4,24-7,60)
Emakumeak Mujeres	Kop. Nº	5	5	4	4	6	10	8	9	13	11	9	18	11	12	15	7	16	12	9	14	15
	Tasa gordina Tasa bruta	0,88	0,93	0,75	0,53	0,8	1,35	1,04	1,16	1,68	1,42	1,16	2,33	1,45	1,59	2,01	0,93	2,14	1,6	1,2	1,86	1,99
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	0,86	0,84	0,7	0,44	0,73	1,13	0,88	0,99	1,51	1,22	1,1	1,98	1,23	1,39	1,76	0,83	1,95	1,4	1,04	1,66	1,78
	(KT % 95) (IC95%)	(0,10-1,61)	(0,10-1,55)	(0,01-1,38)	(0,01-0,88)	(0,14-1,32)	(0,43-1,83)	(0,27-1,50)	(0,34-1,64)	(0,69-2,33)	(0,50-1,94)	(0,37-1,84)	(1,07-2,90)	(0,50-1,96)	(0,59-2,19)	(0,87-2,65)	(0,21-1,44)	(0,98-2,91)	(0,61-2,20)	(0,36-1,72)	(0,78-2,53)	(0,88-2,68)
Bi sexuak Ambos sexos	Kop. Nº	36	36	33	34	29	56	48	45	44	46	40	55	56	54	55	43	57	53	43	59	64
	Tasa gordina Tasa bruta	3,13	3,3	3,05	2,24	1,92	3,75	3,1	2,89	2,82	2,94	2,56	3,52	3,66	3,56	3,66	2,85	3,8	3,53	2,86	3,92	4,23
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	2,99	3,04	2,79	1,92	1,65	3,17	2,7	2,44	2,50	2,52	2,30	3,07	3,18	3,01	3,22	2,51	3,43	3,14	2,53	3,71	3,86
	(KT % 95) (IC95%)	(2,01-3,97)	(2,01-3,96)	(1,84-3,74)	(1,27-2,57)	(1,05-2,25)	(2,32-4,02)	(1,93-3,46)	(1,73-3,15)	(1,75-3,24)	(1,79-3,25)	(1,58-3,03)	(2,25-3,88)	(2,34-4,03)	(2,20-3,81)	(2,37-4,07)	(1,76-3,27)	(2,53-4,33)	(2,29-3,99)	(1,77-3,29)	(2,75-4,66)	(2,90-4,81)

* EAEko egoiliarren heriotzak / * Muertes de residentes en la CAPV


** Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarera egokituta, 100.000 biztanlerako tasak.

** Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicománias. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

15. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2020
Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 2000-2020



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

* 2017. urteaz gero, adin guzietako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte soilik jasotzen ziren 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak).
 * A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (Hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años)

1. **ERANSKINA.** Drogomenpeketasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta tratamendu-adierazlerako datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2020

ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al indicador tratamiento. CAPV 2020

OSAKIDETZA	BESTE BATZUK - OTROS
Araba / Álava	
Adikzioentzako orientazio eta tratamendu zentroa Centro de orientación y tratamiento de adicciones-COTA	Jeiki Fundazioa. Arabako Gizakia Helburu Fundación Jeiki. P. Hombre Araba
Gipuzkoa	
Amarako OMZ C.S.M. de Amara	A.G.I.P.A.D. A.G.I.P.A.D.
Andoain OMZ C.S.M. DE Andoain	Izan Fundazioa. Gipuzkoako Gizakia Helburu Fundación Izan. P. Hombre Gipuzkoa
Arrasateko OMZ C.S.M. de Mondragón	
Azpeitiko OMZ C.S.M. de Azpeitia	
Beasaingo OMZ C.S.M. de Beasain	
Donostia-Antiguoko OMZ C.S.M. de Donostia-Antiguo	
Errenteriako OMZ C.S.M. de Rentería	
Egla OMZ C.S.M. de Eguía	
Eibarko OMZ C.S.M. de Eibar	
Irungo OMZ C.S.M. de Irún	
Tolosako OMZ C.S.M. de Tolosa	
Zarauzko OMZ C.S.M. de Zarautz	
Zumarragako OMZ C.S.M. de Zumárraga	
Bitarte Bitarte	
Bizkaia	
Basauriko OMZ C.S.M. de Basauri	Etokintza Fundazioa Fundación Etokintza
Bermeoko OMZ C.S.M. de Bermeo	Gizakia Fundazioa. Bizkaiko Gizakia Helburu Fundación Gizakia. P. Hombre Bizkaia
Durangoko OMZ C.S.M. de Durango	Auzolan APM M.A.P.S. Auzolan
Gernikako OMZ C.S.M. de Gernika	Gurutzetako APM M.A.P.S. de Cruces
Ortuellako OMZ C.S.M. de Ortuella	Errekaldeko APM M.A.P.S. de Rekalde
Portugaleteko OMZ C.S.M. de Portugalete	Deustu-San Ignazioko APM M.A.P.S. Deusto-San Ignacio
Santurtziko OMZ C.S.M. de Santurce	Burmuin institutua Instituto Burmuin
Sestaoko OMZ C.S.M. de Sestao	
Uribeko OMZ C.S.M. de Uribe	
Zallako OMZ C.S.M. de Zalla	
Otxarkoagako OMZ C.S.M. de Otxarkoaga	
Galdakaoko OMZ C.S.M. de Galdakao	
Barakaldoko Adi. OMZ C.S.M. Adic. Barakaldo	
Julián Ajuriaguerrako Adi. OMZ C.S.M. Adic. Julian de Ajuriaguerra	
Novia Salcedo Adi. OMZ C.S.M. Adic. Novia Salcedo	

2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2020
ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2020

Adin-Taldea Grupo de edad	ARABA / ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres
0-4	7.514	7.186	22.016	20.799	14.737	14.208
5-9	8.935	8.273	26.329	25.476	18.051	17.143
10-14	8.516	8.003	27.592	26.008	19.341	18.059
15-19	7.999	7.341	27.342	25.091	18.380	17.190
20-24	7.260	7.086	25.357	24.466	17.700	16.633
25-29	7.584	7.477	26.537	26.134	17.055	16.577
30-34	8.952	9.071	30.038	30.252	18.567	18.265
35-39	11.441	11.569	37.704	37.271	22.590	22.552
40-44	14.458	13.723	46.828	46.593	29.311	28.421
45-49	13.900	13.294	46.922	46.713	29.927	28.608
50-54	12.984	12.752	44.754	45.862	27.752	27.383
55-59	11.646	12.381	42.836	45.830	25.808	26.781
60-64	10.231	11.113	38.643	42.425	23.441	24.360
65-69	8.776	9.596	31.412	35.775	19.763	21.784
70-74	8.099	9.034	28.004	34.010	18.680	21.346
75-79	6.058	7.021	20.897	27.677	13.385	16.703
80-84	3.983	5.354	14.334	22.752	8.980	13.256
85-89	2.785	4.598	10.785	20.266	6.123	11.628
90-94	957	2.297	3.860	9.790	2.091	5.645
>95	183	779	681	2.983	402	1.832

EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika (BUE) www.eustat.eus

EUSTAT: Estadística Municipal de Habitantes (EMH) www.eustat.eus

