



## INFORME ANUAL

### PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARQUE EÓLICO OIZ

Provincia de Bizkaia  
(Comunidad del País Vasco)

Año 2024



Sociedad promotora: EÓLICAS DE EUSKADI  
c/Urarte, 2,  
Vitoria-Gasteiz, 01010


Autor: C/ Cabranes nº1 (Montecerrao)  
33006 Oviedo - Asturias  
Tel.: 985 246 547

**TAXUS**  
MEDIO AMBIENTE


El presente *Informe del Seguimiento Ambiental del Parque Eólico Oiz (año 2024)* ha sido realizado por la empresa TAXUS MEDIO AMBIENTE S.L., para la sociedad **EÓLICAS DE EUSKADI**.

En su elaboración han participado:

Apellidos, Nombre	Función	Titulación
Granero Castro, Javier	Dirección	Lic. Cc. Ambientales
Montes Cabrero, Eloy	Coordinación y Aprobación del Informe	Lic. Biología
Mateo López, Matías	Trabajo de Campo y Elaboración de Cartografía y Planimetría	Técnico Sup. Gestión y Organiz. Rec. Nat.
Agustín Bes, David	Redacción del informe y Trabajo de Campo	Técnico Sup. Gest. Forestal y del Med. Nat.



**TAXUS MEDIO AMBIENTE S.L.**  
C/ Cabranes nº1 (Montecerrao)  
33006 Oviedo (ASTURIAS)  
Telf.: 985 246 547  
info@taxusmedioambiente.com  
www.taxusmedioambiente.com

Redactado: 28/01/2025	Revisado: 29/01/2025	Aprobado: 30/01/2025
		

**David Agustín Bes**  
Consultor – Área Medio Ambiente y Sostenibilidad

**Eloy Montes Cabrero**  
Colegiado nº 19997º - COBAS  
Jefe de Proyectos – Área Medio Ambiente y Sostenibilidad

**Javier Granero Castro**  
Colegiado nº 00995 - COAMB  
Director Área Medio Ambiente y Sostenibilidad

**ÍNDICE**

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ÁREA DE ESTUDIO .....</b>	<b>5</b>
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES .....	5
2.2. RELACIÓN DE VISITAS .....	6
<b>3. METODOLOGÍA.....</b>	<b>8</b>
• 3.1. ESTUDIO DE LA AVIFAUNA.....	8
3.1.1. Trabajo de campo .....	8
3.1.2. Cálculos .....	10
3.2. ANÁLISIS DE COLISIONES Y MORTALIDAD .....	12
3.2.1. Trabajo de campo .....	12
3.2.2. Cálculos a partir de las colisiones .....	14
3.3. SEGUIMIENTO DE LAS RED DE DRENAJE Y LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL .....	18
<b>4. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.....</b>	<b>22</b>
4.1. COMUNIDAD DE AVES PRESENTE .....	22
4.1.1. Especies detectadas .....	22
4.1.2. Índices poblacionales.....	25
4.2. COLISIONES Y MORTALIDAD .....	26
4.3. SEGUIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL .....	29
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>30</b>
<b>6. EQUIPO REDACTOR .....</b>	<b>32</b>
<b>7. ANEXOS.....</b>	<b>33</b>
7.1. ANEXO I – FICHAS COLISIONES .....	33
7.2. ANEXO II – DOSSIER FOTOGRÁFICO.....	33
7.3. ANEXO III – PLANOS .....	33

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, elaborado por TAXUS MEDIO AMBIENTE S.L., recoge los resultados obtenidos durante el seguimiento ambiental del Parque Eólico Oiz en el año 2024.

El informe detalla la metodología empleada, las observaciones de especies en el entorno de la instalación y sus categorías de amenaza y protección legal, así como las colisiones de aves y murciélagos detectadas, incluyendo la estimación de la mortalidad real.

## 2. ÁREA DE ESTUDIO

El P.E. Oiz se localiza en la provincia de Bizkaia, en los términos municipales de Berriz, Munitibar y Mallabia.

### 2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

El área objeto de caracterización ambiental se localiza en el Alto de Oiz, ubicado en los términos Municipales de Berriz, Munitibar y Mallabia, en el Territorio Histórico de Bizkaia. En general, el espacio analizado se encuentra antropizado, dedicándose fundamentalmente a cultivos de pino *Sylvestris* y brezales. La red de caminos existente en la zona puede considerarse como adecuada para alcanzar la mayoría de los sectores del parque eólico.




Imagen 2.1.1. Localización del P.E. Oiz.

Las instalaciones están constituidas por 40 aerogeneradores, modelo GAMESA de 850 kW de potencia unitaria (por tanto, un total de 34 MW para el conjunto del parque).

Por otra parte, el resto del parque eólico está formado por:

- Viales de acceso al parque.
- Viales de comunicación entre plataformas de aerogeneradores.
- Red subterránea de media tensión para la distribución de energía eléctrica que conecta los aerogeneradores con un Centro de Seccionamiento.

## 2.2. RELACIÓN DE VISITAS

La siguiente tabla recoge la relación de visitas al área de muestreo realizadas durante el seguimiento ambiental del Parque Eólico Oiz en el año 2024:

Fecha de Visita	Técnico Asistente
04/01/2024	Agustín Jáñez Freire
10/01/2024	David Agustín Bes
24/01/2024	David Agustín Bes
12/02/2024	Agustín Jáñez Freire
06/03/2024	David Agustín Bes
11/03/2024	Agustín Jáñez Freire
26/03/2024	David Agustín Bes
11/04/2024	David Agustín Bes
21/05/2024	David Agustín Bes
30/05/2024	Endika Amores Carracedo
19/06/2024	David Agustín Bes
25/06/2024	David Agustín Bes
10/07/2024	Agustín Jáñez Freire
18/07/2024	Iyana Alonso Álvarez
08/08/2024	Iyana Alonso Álvarez
19/08/2024	Alejandro Pérez Carriches
17/09/2024	Paula Rodrigo Calvo

Tabla 2.2.1. Calendario de visitas

Fecha de Visita	Técnico Asistente
25/09/2024	Iyana Alonso Álvarez
16/10/2024	Claudia Dorado Menéndez
30/10/2024	Claudia Dorado Menéndez
06/11/2024	Paula Rodrigo Calvo
21/11/2024	Claudia Dorado Menéndez
12/12/2024	Aideé Quesada Menéndez
27/12/2024	Agustín Jáñez Freire

Tabla 2.2.1. (Continuación) Calendario de visitas

### 3. METODOLOGÍA

Se define a continuación la metodología llevada a cabo para la realización de los seguimientos ambientales de los siguientes aspectos:

- ◎ Estudio de la Avifauna
- ◎ Análisis de Colisiones y Mortalidad

La metodología seguida está basada en las directrices establecidas por las especificaciones técnicas exigidas por EÓLICAS DE EUSKADI en el seguimiento ambiental de sus instalaciones eólicas, así como las indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de Vigilancia Ambiental.

#### 3.1. ESTUDIO DE LA AVIFAUNA

##### 3.1.1. Trabajo de campo

Existen dos métodos principales para el muestreo de avifauna (1,2,3):

- ◎ Itinerarios o transectos: El observador recorre un itinerario o ruta, registrando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una banda de anchura prefijada. Permite censar áreas mayores, pero pasan desapercibidas algunas especies.

<sup>1</sup> José Luis Tellería Jorge. **Manual para el censo de los vertebrados terrestres**. Raíces (1986).

<sup>2</sup> Colin Bibby, Martin Jones & Stuart Marsden. **Expedition Field Techniques: Bird Surveys**. Royal Geographical Society & The Institute of British Geographers (1998).

<sup>3</sup> Petr Voříšek, Alena Klvaňová, Simon Wotton & Richard Gregory (editores). **A best practice guide for wild bird monitoring schemes**. CSO/RSPB (2008).

- ◎ Estaciones de censo: El observador se sitúa en un punto dominante, anotando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una circunferencia de radio prefijado y durante un tiempo limitado. Permite detectar especies que son difícilmente registradas en los itinerarios, pero abarca un área pequeña respecto del total del área a estudiar.

De acuerdo a las características y objetivos del muestreo se optó por realizar un itinerario y cuatro estaciones de censo que abarcasen todas las alineaciones de aerogeneradores, anotándose cada una de las especies observadas en torno a una banda de 50 m.

Estación	Coordenadas UTM (ETRS89 – Huso 30T)	
	X	Y
AP01	532.060	4.786.433
AP02	533.267	4.785.972
AP03	534.082	4.785.218
AP04	535.045	4.784.715

Tabla 3.1.1.1. Estaciones de avifauna.

Transecto	Coordenadas UTM (ETRS89 – Huso 30T)		Coordenadas UTM (ETRS89 – Huso 30T)	
	INICIO		FIN	
	X	X	X	Y
AT01	534.082	4.785.218	533.267	4.785.972

Tabla 3.1.1.2. Transecto de avifauna.

Su localización puede consultarse en el Anexo II - Plano Nº1. "Localización de estaciones, transectos de avistamientos, y colisiones".

El muestreo se realizó por parte de técnicos cualificados, con conocimientos y experiencia en seguimiento de aves. Asimismo, se tuvieron en cuenta el comportamiento y biología de las especies en cada hábitat, de manera que se adecuaron los horarios de visita a los momentos de máxima actividad, así como las condiciones meteorológicas, con el objetivo de lograr una mayor detección de las mismas.

El material empleado consistió en:

- ◉ Prismáticos Vortex Viper 12x42, para una observación apropiada de las aves en el campo.
- ◉ Ejemplar de la “Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea”<sup>4</sup> para la identificación de observaciones.
- ◉ GPS Garmin eTrex.
- ◉ Una cámara fotográfica.
- ◉ Una grabadora de sonidos estándar para el registro de observaciones y detalles.

Los itinerarios consistieron en trayectos recorridos a pie a una velocidad lenta. Durante los transectos, los técnicos recogen las observaciones de todos los individuos que entrasen en una banda de 50 m alrededor de la línea de aerogeneradores, además de una serie de datos útiles para evaluar el riesgo de colisión que presentan las especies de avifauna en la zona: Distancia a Aerogeneradores, tipo y dirección de vuelo, cruce y cercanía de éste con aerogeneradores, reacción del ave ante los aerogeneradores, periodo fenológico, etc.

Los transectos realizados sólo computan las observaciones que se realicen en los trayectos de ida, pues realizar un recuento en el trayecto de vuelta supondría una probable duplicación de registros y no serviría como una réplica funcional del muestreo.

### 3.1.2. Cálculos

#### 3.1.2.1. Densidad

La **densidad** de aves se calcula según el método denominado “transecto finlandés” de Olli Järvinen y Risto A. Väisänen (<sup>5</sup>) de acuerdo a la siguiente fórmula:

---

<sup>4</sup> Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström. **Guía de Aves. España, Europa y Región Mediterránea.** Omega (2010).

<sup>5</sup> José Luis Tellería Jorge. **Manual para el censo de los vertebrados terrestres.** Raíces (1986).

$$D = \frac{n \cdot k}{L}$$

Donde:

$n$  = número total de observaciones (individuos)

$L$  = longitud de itinerario

$k$  = Según la ecuación:

$$k = \frac{1 - \sqrt{(1 - p)}}{W}$$

Donde:

$p$  = proporción de individuos observados dentro de la banda respecto del total.

$W$  = anchura de la banda de recuento a cada lado de la línea de progresión.

Adicionalmente, durante el trabajo de campo se anotaron todos los individuos vistos u oídos sin discriminar por distancia, para posteriormente calcular el **Índice Kilométrico de Abundancia (IKA)** según la siguiente fórmula:

$$IKA = \frac{n}{L}$$

Donde:

$n$  = número total de observaciones (individuos)

$L$  = longitud de itinerario (1,120 km para el P.E. Oiz)

### 3.1.2.2. Otros índices poblacionales

Sobre los datos recopilados de observaciones también se aplican los siguientes índices.

#### ◎ Riqueza

Se calcula como el número total de especies de aves registradas.

#### ◎ Diversidad

Calculado según la siguiente fórmula:

$$H = - \sum p_i \cdot \log_2 p_i$$

Donde:

$p_i$  = proporción (en tanto por uno) de cada una de las especies detectadas.

## 3.2. ANÁLISIS DE COLISIONES Y MORTALIDAD

### 3.2.1. Trabajo de campo

La búsqueda de animales muertos y colisionados en las inmediaciones de los aerogeneradores se ha efectuado mediante un barrido sistemático del entorno de cada aerogenerador, así como de las distancias que los separan entre sí.

La búsqueda de cadáveres en las inmediaciones de los aerogeneradores se ejecuta mediante trayectos recorridos a pie a una velocidad lenta. Esta revisión se realiza en recorridos de ida y vuelta, conformando una doble sinusoida hasta un perímetro máximo igual a la longitud de la pala más la suma de un margen de incertidumbre de 25 m, para abarcar los cadáveres que han caído al suelo en ángulo tras colisionar con la zona más extrema de una pala.

El esfuerzo de muestreo ha sido de 15-20 minutos por aerogenerador, en caso de superar éste los 74 m de diámetro, o bien de 10-15 minutos por aerogenerador en el caso de que el diámetro sea inferior, teniendo en cuenta los hábitats existentes en cada área, adecuando un mayor o menor esfuerzo en función de la eficiencia de búsqueda de cada zona.

Todo animal muerto o colisionado hallado durante los muestreos fue evaluado por el técnico para determinar la causa de su muerte. Tentativamente se han asumido todos los hallazgos como colisiones con aerogeneradores, salvo que existan indicios muy evidentes de que la muerte del individuo no esté relacionada o bien que el cadáver se localice demasiado alejado como para haber sufrido una colisión (y no muestre daños asociados a estas causas).

La localización de los transectos puede consultarse en el Anexo II - Plano N°1. "Localización de estaciones, transectos de avistamientos, y colisiones". El trayecto es similar al realizado durante el proceso de registro y observación de individuos de avifauna.

El muestreo se realizó por parte de técnicos cualificados, con conocimientos y experiencia en seguimiento de aves. Asimismo, se tuvieron en cuenta los hábitats existentes en cada área, adecuando un mayor o menor esfuerzo en función de la eficiencia de búsqueda de cada zona.

El material empleado consistió en:

- ◉ Ejemplar de la “Guía para la Identificación de los Passeriformes Europeos”<sup>6</sup> para la determinación de los individuos colisionados
- ◉ Ejemplar de la “Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea”<sup>7</sup> para identificación de observaciones.
- ◉ GPS Garmin eTrex.
- ◉ Una cámara fotográfica.
- ◉ Kit de disección para determinar la causa de la muerte del individuo.



Imagen 3.2.1.1. Investigador realizando las comprobaciones necesarias para evaluar la causa de la muerte de un individuo de urraca común.

<sup>6</sup> Lars Svensson. **Guía para la Identificación de los Paseriformes Europeos**. SEO/BirdLife (1996).

<sup>7</sup> Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström. **Guía de Aves. España, Europa y Región Mediterránea**. Omega (2010).

Durante estos muestreos se anotan todos los individuos colisionados hallados, así como la siguiente información sobre ellos: fecha, hora, coordenadas geográficas, aerogenerador más cercano (incluida distancia y orientación respecto del mismo), sexo, edad, estado del ejemplar, descripción de las lesiones y otras características relevantes.

### 3.2.2. Cálculos a partir de las colisiones

#### 3.2.2.1. Tasa semestral de mortalidad detectada

A partir de los datos obtenidos en la detección de colisiones se determina la **tasa de mortalidad detectada (TMD)** en el periodo:

$$TMD = \frac{C_i}{A}$$

Donde:

$C_i$  = Número total de colisiones en las instalaciones (individuos)

$A$  = Número de aerogeneradores totales.

#### 3.2.2.2. Tasa de persistencia y de desaparición de cadáveres

Este factor se refiere a la desaparición de individuos colisionados (por parte de carroñeros que se alimentan de los cadáveres o los desplazan, u otras razones) que no son cuantificados.

Para el cálculo de este factor se utilizaron animales muertos, principalmente aves de diferentes tamaños recogidas en carreteras, arcos y en las revisiones de las instalaciones. En caso de no obtener suficientes cadáveres por estos medios, se completarían los estudios mediante el uso de animales comprados para completar un número mínimo de cadáveres.

Los cadáveres se depositaron en distintas zonas del parque eólico o tendido eléctrico (alejados suficientemente de las alineaciones de aerogeneradores o de la línea eléctrica). Con posterioridad, se efectuaron visitas hasta la desaparición de los cuerpos o su aparición como esqueleto (momento en que se retiraron).

La **persistencia de cadáveres (P)** se calcula según:

$$P = \frac{n_p}{N}$$

Donde:

$n_p$  = Número de cadáveres colocados que permanecen tras un intervalo de tiempo igual al intervalo entre jornadas de búsqueda de cadáveres (en el presente estudio,  $p = 7$  días).

$N$  = Número de cadáveres totales utilizados para el experimento.

La **tasa de desaparición de cadáveres (TDC)** es el opuesto a la **tasa de persistencia de cadáveres (P)**, de forma que:

$$TDC = 1 - P$$

En 2024 no se realizaron experimentos de tasa de persistencia y de desaparición de cadáveres, de forma que se usó el promedio de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo que se lleva realizando el seguimiento ambiental de las instalaciones.

### 3.2.2.3. Eficacia de detección de cadáveres o eficiencia de búsqueda por los técnicos

Este factor se refiere a las diferentes eficacias de búsqueda de los diferentes técnicos en la detección de individuos colisionados en los diferentes hábitats en los que se encuentren las instalaciones a revisar.

Consiste en la realización de 4 muestreos (uno por periodo fenológico), en los que se distribuyen al azar una serie de señuelos artificiales en el itinerario de búsqueda. Despues, se revisan las estructuras según la misma metodología usada para la búsqueda de individuos colisionados.

El experimento ideal debería utilizar cadáveres de aves (de diversos tamaños). No obstante, dada la imposibilidad de realizar esta aproximación, se han empleado para estos estudios objetos de color y tamaño similar al de un ave de tamaño medio (zorzales, arrendajo, etc.). Se asume que la utilización de estos objetos, al presentar un tamaño y coloración similar a las esperadas en los animales objeto de muestreo, mostrará una representación fidedigna de la eficacia de búsqueda de los técnicos.

$$D = TEB = \frac{s_i}{s_T}$$

Donde:

$s_i$  = Número de señuelos encontrados.

$s_T$  = Número de señuelos totales empleados para el experimento.

En 2024 no se realizaron experimentos de tasa de eficiencia de búsqueda por los técnicos, de forma que se usó el promedio de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo que se lleva realizando el seguimiento ambiental de las instalaciones.

#### 3.2.2.4. *Estimación de mortalidad real*

El índice utilizado es el propuesto en la revisión realizada por Alexis Puente Montiel<sup>8</sup> y que ofrece resultados más fiables y realistas que los índices habitualmente usados.

$$R = \frac{C}{(1 - E) \cdot P \cdot D}$$

Donde:

$R$  = Mortalidad real estimada.

$C$  = Cadáveres localizados (número de colisiones detectadas).

$E$  = Valor de mortalidad *ex situ*.

$P$  = Proporción media de cadáveres que persiste en el tiempo  $i$ .

$D$  = Eficiencia de detección de cadáveres de los técnicos.

En el caso de la mortalidad *ex situ*, debido a la escasez de datos al respecto, se emplea tentativamente un valor de ( $E$ ) igual a 10% (0,1).

#### 3.2.2.5. *Evaluación cualitativa de la mortalidad*

Manteniendo el criterio que se venía usando en el seguimiento de las instalaciones, se ha evaluado la mortalidad que presentan de acuerdo a la siguiente clasificación que utiliza grado de protección que presentan los individuos colisionados según el "Catálogo Español de Especies Amenazadas" (Real Decreto 139/2011 y sus modificaciones).

<sup>8</sup> Alexis Puente Montiel. **Revisión crítica de los protocolos de seguimiento de fauna en parque eólicos: situación actual y propuestas de mejora.** Chiroptera.info: <http://www.chiroptera.info/es/metodologia/parques-eolicos/revision-critica-de-los-protocolos-de-seguimiento-de-fauna-en-parques-eolicos-situacion-actual-y-propuestas-de-mejora>

◎ **Mortalidad no destacable:**

- Halladas entre 0 y 9 especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” (no se ha localizado ninguna especie “Vulnerable” ni “En Peligro de Extinción”).

◎ **Mortalidad moderada:**

- Halladas entre 10 y 19 especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”, o
- Hallada una especie “Vulnerable” y entre 0 y 9 especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” (no se ha localizado ninguna especie “En Peligro de Extinción”).

◎ **Mortalidad destacable:**

- Halladas 20, o más, especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.
- Hallada una especie “Vulnerable” y 10, o más, especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.
- Halladas 2, o más, especies “Vulnerables” (especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” no computan)
- Hallada al menos una especie “En Peligro de Extinción” (especies “Vulnerables” o incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” no computan).

Tan sólo se tienen en cuenta las especies halladas muertas o heridas debido a la instalación objeto del estudio. No se tiene en cuenta el número de individuos de las especies halladas ya que lo que se trata de hacer es calificar la mortalidad cualitativamente.

### 3.3. SEGUIMIENTO DE LAS RED DE DRENAJE Y LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

Anualmente se realizan seguimientos de la red de drenaje a efectos de conocer el estado en el que se encuentra y evaluar posibles actuaciones. La metodología usada se basa en el Método del Bureau of Land Management (U.S.A. Department of Interior) y reseñado en varios materiales publicados por los diferentes ministerios españoles con competencias ambientales, analizándose:

- Movimiento de la capa superficial del suelo
- Acumulación de elementos finos
- Pedregosidad
- Pedestales de erosión y descalzamientos
- Regueros
- Red incipiente de drenaje
- Cárcavas y barrancos

A cada uno de los parámetros citados se les asigna un valor según la tabla siguiente.

Seguimiento de la red de drenaje	
<b>Movimiento de la capa superficial del suelo</b>	
Estable	No hay evidencia visual de movimiento. (0-3)
Ligeramente erosionada	Ligero movimiento de las partículas del suelo. (4-5)
Erosión moderada	Se observa un movimiento moderado del suelo. Ligero aterrazamiento con altura menor de 2,5 cm. (6-8)
Erosión crítica	Hay movimiento del suelo después de cada tormenta. Hay depósitos de sedimentos detrás de cada obstáculo. (9-11)
Erosión severa	El subsuelo está expuesto en gran parte del área. Hay indicios de formación de dunas o depósitos eólicos. (12-14)

Tabla 3.3.1. Valoración de la red de drenaje.

Seguimiento de la red de drenaje	
Acumulación de elementos finos	
Pedregosidad	
Estable	Se acumulan en el mismo sitio donde se disgrega. (0-3)
Ligeramente erosionada	Puede haber ligeros movimientos. (4-6)
Erosión moderada	Movimiento moderado. Existen depósitos cuando hay obstáculos. (7-8)
Erosión crítica	Hay grandes movimientos de suelo disgregados y acumulaciones. (9-11)
Erosión severa	No hay apenas acumulaciones. El suelo es arrastrado en su totalidad. (12-14)
Pedestales de erosión y descalzamientos	
Estable	No hay evidencia visual de "pedestales". (0-3)
Ligeramente erosionada	Pequeños pedestales en las líneas de flujo. (4-6)
Erosión moderada	Existen pedestales en rocas y plantas en las líneas de flujo. (7-9)
Erosión crítica	Los pedestales en rocas y plantas son evidentes. Las raíces están expuestas. (10-11)
Erosión severa	La mayoría de las raíces están expuestas. (12-14)

Tabla 3.3.1. (Continuación) Valoración de la red de drenaje.

## Seguimiento de la red de drenaje

**Regueros**

Estable	No se observan regueros. (0-3)
Ligeramente erosionada	Se observan algunos regueros con profundidad menor de 1,5 cm. (4-6)
Erosión moderada	Regueros de 1,5 a 15 cm de profundidad. Equidistantes 3 cm aproximadamente. (7-9)
Erosión crítica	Regueros de 1,5 a 15 cm de profundidad. Equidistantes de 1,5 a 3 cm. (10-12)
Erosión severa	Cárcavas de 7,5 a 15 cm de profundidad a intervalos de menos de 1,5 m. (13-14)

**Red incipiente de drenaje**

Estable	No se observan incisiones de la red de drenaje. (0-3)
Ligeramente erosionada	Se observan fenómenos de deposición de las líneas de flujo. (4-6)
Erosión moderada	Incisiones de drenaje bien definidas con depósitos intermitentes. (7-9)
Erosión crítica	Las líneas de drenaje contienen limos, arenas y depósitos en forma de abanicos aluviales. (10-12)
Erosión severa	Las líneas de drenaje son numerosas. Pueden tener depósitos en forma de barras. (13-15)

**Cárcavas y barrancos**

Estable	Pueden estar presentes de forma estable. Se observa vegetación en el techo y márgenes. (0-3)
Ligeramente erosionada	Se observan algunos barrancos con erosión ligera en cauce y márgenes. Existe vegetación en los márgenes. (4-6)
Erosión moderada	Los barrancos están bien definidos con una erosión activa en el 10% del curso. (7-9)
Erosión crítica	Los barrancos son activos y bien desarrollados con una erosión activa a lo largo del barranco de 10- 50% de su curso. Barrancos menos desarrollados con una erosión activa en más de 50% de su curso. (10-12)
Erosión severa	Los barrancos profundos cubren la mayoría del área. (13-15)

Tabla 3.3.1. (Continuación) Valoración de la red de drenaje.

Posteriormente se suman las puntuaciones para cada punto de control y se clasifica el grado de erosión según la siguiente tabla.

Clasificación de la erosión de la red de drenaje	
Estable	0 – 20
Ligeramente erosionada	21 – 40
Erosión moderada	41 – 60
Erosión crítica	61 – 80
Erosión severa	81 – 100

Tabla 3.3.2. Clasificación de la erosión de la red de drenaje.

Así mismo, también se realiza una valoración del porcentaje de cobertura existente en todas las plataformas, taludes en desmonte y en terraplén, así como del área ocupada por la zanja, cunetas y bordes de vial. Asimismo, se definen cuadrantes en el entorno de diversas plataformas, cunetas y zanjas.

## 4. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

### 4.1. COMUNIDAD DE AVES PRESENTE

#### 4.1.1. Especies detectadas

##### 4.1.1.1. Especies avistadas

A lo largo del seguimiento ambiental realizado en el periodo de estudio, se han avistado 743 individuos de 38 especies diferentes. La mayoría de las observaciones corresponden a especies típicas de paisajes agrícolas (bisbita común/pratense (*Anthus pratensis*), pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*), etc.) o bien especies bastante generalistas en cuanto a tipo de hábitat como la corneja negra (*Corvus corone*).

Entre estas especies destaca por su nivel de amenaza el milano real (*Milvus milvus*), catalogado como “En peligro de extinción” según el “Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011 y sus modificaciones).

Nombre científico	Nombre común	Inv.	Prim.	Ver.	Oto.	TOTAL 2024
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito común	0	0	2	0	2
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	7	0	4	21	32
<i>Anthus pratensis</i>	Bisbita común/pratense	8	13	0	16	37
<i>Anthus spinoletta</i>	Bisbita (ribereño) alpino	21	3	28	33	85
<i>Apus apus</i>	Vencejo común	0	0	1	0	1
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero / Ratonero común	0	4	1	0	5
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	0	6	41	14	61
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero europeo	4	0	2	15	21
<i>Corvus corax</i>	Cuervo común	2	0	0	15	17
<i>Corvus corone</i>	Corneja negra/común	21	19	38	19	97
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco común	0	2	0	0	2
<i>Dryocopus martius</i>	Pito negro	0	0	3	0	3
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	0	0	25	0	25
<i>Emberiza citrinella</i>	Escribano cerillo	0	5	1	0	6

Tabla 4.1.1.1.1. Aves avistadas durante los trabajos de campo.

Nombre científico	Nombre común	Inv.	Prim.	Ver.	Oto.	TOTAL 2024
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo europeo	2	2	6	2	12
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo vulgar/común	1	2	1	5	9
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	22	25	3	0	50
<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo	0	0	3	0	3
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado/común	26	54	16	43	139
<i>Loxia curvirostra</i>	Piquituerto común	10	0	0	0	10
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	3	2	0	3	8
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	0	0	0	1	1
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba gris	0	0	0	1	1
<i>Parus major</i>	Carbonero común	0	0	6	0	6
<i>Periparus ater</i>	Carbonero garrapinos	4	5	8	0	17
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo tizón	0	0	2	0	2
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Mosquitero ibérico	0	0	2	0	2
<i>Picus viridis</i>	Pito real	0	1	0	0	1
<i>Prunella modularis</i>	Acentor común	0	0	2	6	8
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chova piquigualda	0	0	1	0	1
<i>Saxicola torquatus</i>	Tarabilla común	0	5	31	6	42
<i>Sitta europaea</i>	Trepador azul	0	0	1	0	1
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	1	0	0	0	1
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	0	1	1	0	2
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín común	0	0	0	1	1
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	2	2	0	0	4
<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal real	0	0	0	2	2
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	0	2	24	0	26
<b>TOTAL</b>		<b>134</b>	<b>153</b>	<b>253</b>	<b>203</b>	<b>743</b>

Tabla 4.1.1.1.1. (Continuación) Aves avistadas durante los trabajos de campo.




Gráfico 4.1.1.1.1. Evolución temporal de las observaciones totales.

El mayor número de observaciones se registró en el mes de septiembre. Así mismo, entre los meses de marzo a junio se concentra la mayor cantidad de avistamientos, debiéndose a los primeros vuelos de los pollos con sus padres.

**SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA**



Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*).

Se localiza en todo tipo de paisajes más o menos arbolados. Tamaño pequeño, plumaje de colores variados muy característicos que facilitan su identificación. Nidifica en árboles o arbustos frondosos entre los meses de marzo y junio.

## SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA



Corneja negra (*Corvus corone*).

Se localiza en multitud de hábitats por su gran versatilidad. A menudo se pueden ver en busca de alimento en los pastos o cultivos. Tamaño mediano y plumaje negro oscuro. Nidifica en árboles o estructuras similares, inicia la puesta marzo.

### 4.1.2. Índices poblacionales

Según se expone en el apartado de metodología, se han aplicado sobre toda la muestra de observaciones los siguientes índices:

#### 4.1.2.1. Densidad de aves e IKA

Los datos del seguimiento ambiental recogen los siguientes valores de densidad para la comunidad de aves en el área de las instalaciones:

Nombre Científico	Nombre Común	Densidad	IKA
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	31,25000	0,78125
<i>Anthus pratensis</i>	Bisbita común/pratense	17,85714	0,44643
<i>Anthus spinoletta</i>	Bisbita (ribereño) alpino	28,27381	0,70685
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	11,90476	0,29762
<i>Corvus corax</i>	Cuervo común	1,48810	0,03720
<i>Corvus corone</i>	Corneja negra/común	19,49442	1,22768
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	2,97619	0,07440
<i>Emberiza citrinella</i>	Escribano cerillo	1,48810	0,03720
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo vulgar/común	1,48810	0,03720
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado/común	35,71429	0,89286
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	2,97619	0,07440

Tabla 4.1.2.1.1. Índices de Densidad (km) e IKA para las especies observadas.

Nombre Científico	Nombre Común	Densidad	IKA
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	1,48810	0,03720
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Colirrojo tizón	0,00000	0,03720
<i>Prunella modularis</i>	Acentor común	8,92857	0,22321
<i>Saxicola torquatus</i>	Tarabilla común	4,46429	0,11161
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	1,48810	0,03720
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	2,97619	0,07440
<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal real	2,97619	0,07440
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	25,29762	0,63244
<b>TOTAL</b>		<b>166,40264</b>	<b>5,84077</b>

Tabla 4.1.2.1.1. (continuación) Índices de Densidad (km) e IKA para las especies observadas.

El buitre leonado (*Gyps fulvus*) es la especie con mayor densidad y la corneja negra (*Corvus corone*) la especie de mayor índice kilométrico de abundancia, ambas, especies muy abundantes por la zona todo el año.

#### 4.1.2.2. Otros índices poblacionales

La muestra de aves observadas permite obtener los siguientes índices poblacionales:

Índice	Valor
Riqueza	38
Diversidad	3,38236

Tabla 4.1.2.2.1. Índices de Riqueza y Diversidad.

## 4.2. COLISIONES Y MORTALIDAD

A lo largo del seguimiento ambiental realizado en el periodo de estudio, se han localizado 2 aves muertas por los aerogeneradores o por sus instalaciones anexas:

Nombre Científico	Nombre Común	Inv.	Prim.	Ver.	Oto.	TOTAL 2024
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado/común	0	1	1	0	2
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Tabla 4.2.1. Registros de aves heridas o muertas.

En cuanto a la detección de mortalidad de quirópteros en el periodo de estudio no se ha registrado ningún ejemplar herido o muerto en las instalaciones.

La relación de las incidencias según la categoría de protección de las especies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas es recogida en la siguiente tabla:

Categoría	Inv.	Prim.	Ver.	Oto.	TOTAL 2024
En Peligro de Extinción	0	0	0	0	0
Vulnerables (VU)	0	0	0	0	0
Listado en Régimen de Protección Especial (L)	0	1	1	0	2
No Incluido (NI)	0	0	0	0	0
Sin identificar especie	0	0	0	0	0

(Q) = Quiróptero.

Tabla 4.2.2. Incidencias según catalogación de las especies.

Asimismo, se asociaron todos los animales heridos o muertos al aerogenerador más cercano, asumiéndose éste como el causante de la muerte, como se recoge en el siguiente gráfico:



Gráfico 4.2.1. Muertes localizadas por aerogenerador.

La **tasa de mortalidad detectada (TMD)** es de 0,05 tanto para aves (2 muertes, 40 aerogeneradores), como para el conjunto de aves y quirópteros, puesto que no se detectó ninguna colisión de quirópteros.

La siguiente tabla recoge la información acerca de los valores de persistencia de cadáveres (P), tasa de desaparición de cadáveres (TDC), tasa de eficiencia de búsqueda por el técnico (TEB) y eficacia de detección de cadáveres (D) promedios obtenidos a lo largo del tiempo que se lleva realizando el seguimiento ambiental de las instalaciones.

P 7 días	TDC 7 días	TEB	D
0,267	0,733	0,4625	0,4625

Tabla 4.2.3. Índices de desaparición y eficiencia de búsqueda de cadáveres.

A partir de estos índices, se realiza la estimación de la mortalidad real:

	Aves	Murciélagos	Aves y murciélagos conjuntamente
TOTAL	18	0	18
Mortalidad / Aerog.	0,45	0	0,45

Tabla 4.2.4. Estimación de mortalidad real.

De acuerdo a los datos de campo recopilados y los resultados de los experimentos realizados, **la mortalidad real estimada del Parque Eólico Oiz en el periodo de estudio es 18 animales** muertos por los aerogeneradores.

De acuerdo a los criterios señalados en el apartado 3.2.2.5, **la mortalidad se considera no destacable** al haberse localizado entre 0 y 9 especies incluidas en el "Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial" (Real Decreto 139/2011 y sus modificaciones).

### 4.3. SEGUIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

De acuerdo a la metodología, se realizó el seguimiento de la evolución de la restauración ambiental realizada sobre las plataformas, taludes, zanjas y otros elementos que fueron transformados durante el periodo de obra.

Puede observarse que las plataformas de los aerogeneradores y las zanjas cuentan con cobertura herbácea de bajo porte en la mayor parte de su superficie y en algunos casos aparecen pequeños matorrales dispersos de escaso porte propios del breza-tojal bajo típico de la zona, la cobertura vegetal solo es reducida en las plataformas donde existe frecuente tránsito de vehículos relacionados con el mantenimiento de los aerogeneradores. Por su parte, las zanjas cuentan con mayor cobertura herbácea y mayor grado de implantación de matorrales característicos del breza-tojal bajo correspondiente a la sucesión vegetal propia de la zona. Por último, el grado de cobertura vegetal de los taludes y bordes de vial varía en función de la pendiente de las superficies y la profundidad de suelo.

En cuanto a la red de drenaje, los valores de todos los parámetros (movimiento de la capa superficial del suelo, acumulación de elementos finos, pedregosidad, pedestales de erosión y descalzamientos, regueros, red incipiente de drenaje, cárcavas y barrancos) entraron en la categoría “estable” y en consecuencia la valoración global de la red de drenaje es “estable”.

Asimismo, se revisaron los pasos canadienses de los viales de la instalación con el fin de evaluar su funcionalidad y sus vías de escape para fauna. No se observaron problemas en ninguno de ellos.

## 5. CONCLUSIONES

Tras los muestreos realizados durante el seguimiento ambiental de las instalaciones del P.E. Oiz en el año 2024, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

### Comunidad Avícola

- ◎ A lo largo del seguimiento ambiental realizado, se han avistado 743 individuos de 38 especies diferentes.
  - Entre estas especies destaca por su nivel de amenaza el milano real (*Milvus milvus*), catalogado como "En peligro de extinción" según el "Catálogo Español de Especies Amenazadas" (Real Decreto 139/2011 y sus modificaciones).
  - La densidad total es 166,402 aves / km<sup>2</sup> y el índice kilométrico de abundancia 5.840 aves / km.
  - El buitre leonado es la especie con mayor densidad y la corneja negra la especie de mayor índice kilométrico de abundancia.
  - Los valores de riqueza y diversidad son:

Índice	Valor
Riqueza	38
Diversidad	3,38236

### Colisiones y Mortalidad

- ◎ A lo largo del seguimiento ambiental realizado en el periodo de estudio, se ha localizado un total de 2 aves muertas en las inmediaciones del aerogenerador A03 y A33.
- ◎ La **tasa de mortalidad detectada (TMD)** es de 0,05 tanto para aves (2 muertes, 40 aerogeneradores), como para el conjunto de aves y quirópteros, puesto que no se detectó ninguna colisión de quirópteros.
- ◎ La **mortalidad real estimada** del Parque Eólico Oiz en el año 2024 es 18 animales muertos por los aerogeneradores.
- ◎ De acuerdo a los criterios señalados en el apartado 3.2.2.5, **la mortalidad se considera no destacable** al haberse localizado entre 0 y 9 especies incluidas en el "Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial" (Real Decreto 139/2011 y sus modificaciones).

### Seguimiento de la red de drenaje y cobertura vegetal

- ◎ Los valores de todos los parámetros (movimiento de la capa superficial del suelo, acumulación de elementos finos, pedregosidad, pedestales de erosión y descalzamientos, regueros, red incipiente de drenaje, cárcavas y barrancos) entraron en la categoría "estable" y en consecuencia la valoración global de la red drenaje es "estable".
- ◎ Puede observarse que las plataformas de los aerogeneradores y las zanjas cuentan con cobertura herbácea de bajo porte en la mayor parte de su superficie y en algunos casos aparecen pequeños matorrales dispersos de escaso porte propios del breza-tojal bajo típico de la zona, la cobertura vegetal solo es reducida en las plataformas donde existe frecuente tránsito de vehículos relacionados con el mantenimiento de los aerogeneradores. Por su parte, las zanjas cuentan con mayor cobertura herbácea y mayor grado de implantación de matorrales característicos del breza-tojal bajo correspondiente a la sucesión vegetal propia de la zona. Por último, el grado de cobertura vegetal de los taludes y bordes de vial varía en función de la pendiente de las superficies y la profundidad de suelo.

## 6. EQUIPO REDACTOR


A continuación, se incluye la relación de todo el equipo técnico que ha participado en la elaboración del presente *Informe Anual del Seguimiento Ambiental del Parque Eólico Oiz (Año 2024)*:



**Javier Granero Castro**  
DNI: 71654042-A  
Lic. Cc. Ambientales



**Eloy Montes Cabrero**  
DNI: 76953861-R  
Lic. Biología



**David Agustín Bes**  
DNI: 25359041-T  
Técnico Sup. Gestión Forestal y del Med.  
Nat.



**Matías Mateo López**  
DNI: 71895284-K  
Técnico Sup. Gestión y Organiz. Rec.  
Nat.

## 7. ANEXOS

### 7.1. ANEXO I – FICHAS COLISIONES

### 7.2. ANEXO II – DOSSIER FOTOGRÁFICO

### 7.3. ANEXO III – PLANOS

**ANEXO I – FICHAS COLISIONES**

## REGISTRO DE COLISIÓN

BUITRE LEONADO (*Gyps fulvus*)

Categoría CEEA: Incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Categoría CVEAFF: Interés Especial.

**Fecha** 11/04/2024

**Instalación** PE Oiz

**Hora Solar** 13:20

**Aerog. más próximo** A33

**Distancia a Aerog.** 25 m

**Coordenadas UTM** 30T 532104 E  
WGS84 4786402 N

**Sexo** Indeterminado

**Edad** Indeterminado



**Notas:** Se localizan la parte superior de la cabeza junto con la ala izquierda.

## REGISTRO DE COLISIÓN

BUITRE LEONADO (*Gyps fulvus*)

Categoría CEEA: Incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Categoría LAESRPE: No incluido en el listado.

Fecha 19/06/2024

Instalación PE Oiz

Hora Solar 11:02

Aerog. más próximo A3

Distancia a Aerog. 28 m

Coordenadas UTM 30T 535478 E  
WGS84 4784407 N

Sexo Indeterminado

Edad Indeterminado

**Notas:** Ala izquierda seccionada.

**ANEXO II – DOSSIER FOTOGRÁFICO**



**Fotografía 1.** Aerogeneradores del parque eólico de Oiz.



**Fotografía 2.** Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*) en el entorno del parque eólico.



**Fotografía 3.** Ejemplar de buitre leonado (*Gyps fulvus*) sobrevolando el parque eólico de Oiz.



**Fotografía 4.** Individuo de tarabilla común (*Saxicola rubicola*) en los alrededores del parque eólico.



**Fotografía 5.** Ejemplar de pardillo común (*Linaria cannabina*) en busca de alimento en los campos adyacentes al parque eólico.



**Fotografía 6.** Ejemplar de corneja negra (*Corvus corone*) en el entorno del parque eólico de Oiz.



**Fotografía 7.** Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*) en uno de los campos de las instalaciones del parque eólico.



**Fotografía 8.** Larvas y huevos de rana bermeja (*Rana temporaria*) en charca adyacente al aerogenerador A18



**Fotografía 9.** Ejemplar de corzo (*Capreolus capreolus*) alimentándose en los prados próximos al parque.



**Fotografía 10.** Vista general del parque eólico de Oiz.




**Fotografía 11.** Vista general del parque eólico de Oiz.



**Fotografía 12.** Detalle de la cobertura vegetal en la plataforma del aerogenerador A12 del parque eólico Oiz.



**Fotografía 13.** Ejemplares de buitre leonado (*Gyps fulvus*) sobrevolando el parque eólico de Oiz.



**Fotografía 14.** Individuo de cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) en las inmediaciones del parque eólico.




**Fotografía 15.** Ejemplar de milano real (*Milvus milvus*) sobrevolando el parque eólico de Oiz.



**Fotografía 16.** Puesta de rana bermeja (*Rana temporaria*) en charca adyacente al aerogenerador A28.



**ANEXO III – PLANOS**



Promotor



Consultora

**TAXUS**  
MEDIO AMBIENTE

Proyecto

INFORME ANUAL  
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO OIZ  
Año 2024  
(Bizkaia-País Vasco)

Designación  
Localización de estaciones,  
transectos de avistamientos,  
y colisiones

Autor

Matías Mateo López  
Técnico sup. Gestión y  
Organiz. Rec. Nat.

Elaborado M. Mateo 27/01/25

Revisado E. Montes 28/01/25

Aprobado J. Granero 29/01/25

Plano nº	1
Elaborado	M. Mateo 27/01/25
Revisado	E. Montes 28/01/25
Aprobado	J. Granero 29/01/25

UTM Datum ETRS89 Huso 30N (Impreso en A-3)

Escala 1:20.000

0 250 500 m