

Tabla 3. Seguridad de los fármacos para la cesación tabáquica^(13,23,24)

Fármacos	TSN	Bupropión comprimidos (Zyntabac®)	Vareniclina comprimidos (Champix®, Byteqi®, Cuitvar®, EFG)	Citisiniclina comprimidos (Todacitan®, Recigarum®, Zandraqet®)
Efectos adversos	<ul style="list-style-type: none"> - Náuseas y vómitos, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, mareos, insomnio. - Chicles, comprimidos y pulverizador: dolor mandibular, molestias dentarias, sequedad, mal sabor de boca, hipo... - Parches: trastornos de la piel (prurito, rash, urticaria) 	<ul style="list-style-type: none"> - Muy frecuentes: insomnio - Frecuentes: Reacciones de hiper-sensibilidad (urticaria), depresión, agitación, ansiedad, temblor, alteración de la concentración, cefalea, mareo, alteración del sentido del gusto, sequedad de boca, náuseas y vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, erupción cutánea, prurito, sudoración y fiebre 	<ul style="list-style-type: none"> - Muy frecuentes: náuseas, trastornos del sueño (insomnio y sueños extraños), nasofaringitis y cefalea - Frecuentes: Somnolencia, mareos, disgeusia, disnea, tos, trastornos gastrointestinales, aumento del peso, disminución/aumento del apetito, erupción cutánea, prurito, artralgia, mialgia, dolor de espalda, dolor de pecho, fatiga, bronquitis, sinusitis - Raramente: reacciones cutáneas graves (Síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme y angioedema). 	<ul style="list-style-type: none"> - Muy frecuentes: cambios en el apetito (principalmente aumento), aumento de peso, mareos, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, trastornos del sueño, cefaleas, taquicardia, hipertensión, trastornos gastrointestinales (boca seca, diarrea, náuseas, alteración del gusto, ardor de estómago, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal), erupción cutánea, mialgia y fatiga - Frecuentes: frecuencia cardiaca lenta, distensión abdominal, boca ardiente, malestar general, dificultad para concentrarse.
Contraindicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - No fumadores. - Menores de 18 años: algunas marcas comerciales están contraindicadas (ver apartado < 18 años) 	<ul style="list-style-type: none"> - Trastorno convulsivo actual o antecedente de convulsiones. - Tumor del sistema nervioso central. - Pacientes en proceso de deshabituación brusca de alcohol o benzodiacepinas. - Anorexia o bulimia nerviosa (actual o diagnóstico previo). - Cirrosis hepática grave. - Antecedentes de trastorno bipolar. - Tratamiento concomitante con IMAO. 		<ul style="list-style-type: none"> - Angina inestable. - Antecedente de infarto de miocardio reciente. - Arritmias con relevancia clínica. - Antecedente reciente de accidente cerebrovascular. - Embarazo y lactancia.

Fármacos	TSN	Bupropión comprimidos (Zyntabac®)	Vareniclina comprimidos (Champix®, Byteqi®, Cuitvar®, EFG)	Citisiniclina comprimidos (Todacitan®, Recigarum®, Zandraqet®)
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> - Diabetes mellitus, epilepsia y convulsiones, hipertiroidismo no controlado, feocromocitoma, esofagitis o úlcera de estómago, antecedentes de reacciones alérgicas con inflamación de labios, cara y garganta o irritación de la piel. - IAM reciente, angina inestable, arritmias cardíacas graves, HTA no controlada o ACV reciente o pacientes hemodinámicamente inestables 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe un riesgo aumentado de convulsiones con bupropion en pacientes con factores de riesgo que predispongan a un umbral de convulsiones más bajo. No debe usarse, a menos que exista una causa clínica justificada (dosis máxima 150 mg/día). - Debido a su indicación como antidepresivo, se ha asociado con aumento del riesgo de comportamiento e ideación suicida, por lo que se requiere seguimiento y advertir de ello al paciente. - Precaución en pacientes con síndrome de Brugada o antecedentes familiares de parada cardiaca o muerte súbita. - Determinar la presión arterial basal al comienzo del tratamiento y seguimiento posterior, especialmente en pacientes con hipertensión pre-existente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes de crisis epilépticas u otras afecciones que puedan dar lugar a una disminución del umbral convulsivo. - El uso de vareniclina en pacientes con o sin antecedentes de trastorno psiquiátrico no se asocia con mayor riesgo de acontecimientos neuropsiquiátricos graves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, feocromocitoma, atherosclerosis y otras vasculopatías periféricas, úlcera gástrica y duodenal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hipertiroidismo, diabetes y esquizofrenia, insuficiencia renal y hepática. - Antecedentes de trastornos psiquiátricos. - Las mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos altamente eficaces

Fármacos	TSN	Bupropión comprimidos (Zyntabac®)	Vareniclina comprimidos (Champix®, Byteqi®, Cuitvar®, EFG)	Citisiniclina comprimidos (Todacitan®, Recigarum®, Zandra- qet®)
Interacciones	<ul style="list-style-type: none"> - No se han descrito interacciones clínicamente significativas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contraindicados: IMAO (safinamida, selegilina, rasagilina, moclobemida), pimozida, linezolid, ozanimod, doxorubicina - Interacciones que requieren considerar una modificación de la terapia (Tipo D*): <ul style="list-style-type: none"> • Puede reducir la efectividad de tamoxifeno • Puede aumentar de las concentraciones plasmáticas de citalopram, vortioxetina, atomoxetina, aripiprazol, risperidona, metoclopramida - Interacciones que requieren monitorización (Tipo C*): <ul style="list-style-type: none"> • carbamacepina, fenobarbital, fenitoína, primidona disminuyen las concentraciones de bupropion • ticlopidina, clopidogrel, aumentan las concentraciones de bupropion • mayor incremento de reacciones adversas con levodopa, amantadina, bromocriptine, ropinirol, rotigotine • Puede aumentar de las concentraciones plasmáticas de haloperidol, clozapina • Puede reducir la efectividad/respuesta terapéutica de codeína, tramadol - Síndrome serotoninérgico por interacción con ISRS o IRSN 	<ul style="list-style-type: none"> - No se han descrito interacciones clínicamente significativas 	<ul style="list-style-type: none"> - Antituberculosos: evitar uso comitante. - Fumar o usar simultáneamente productos que contengan nicotina podría provocar reacciones adversas a la nicotina más graves. - Anticonceptivos hormonales sistémicos: puede reducirse su eficacia (añadir un segundo método de barrera).

Fármacos	TSN	Bupropión comprimidos (Zyntabac®)	Vareniclina comprimidos (Champix®, Byteqi®, Cuitvar®, EFG)	Citisiniclina comprimidos (Todacitan®, Recigarum®, Zandraqet®)
Insuficiencia Renal (IR)	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en pacientes con IR de moderada a grave (FG < 50 ml/min) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar a 150 mg/día 	<ul style="list-style-type: none"> - No es necesario un ajuste de dosis en IR leve o moderada. - IR grave (FG < 30 mg/ml): día 1-3: 0,5 mg/día, luego 1 mg 1 vez al día. - No recomendado en IR terminal 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado
Insuficiencia Hepática (IH)	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en pacientes con IH de moderada a grave 	<ul style="list-style-type: none"> - IH leve-moderada: ajustar a 150 mg/día - Contraindicado en cirrosis hepática grave 	<ul style="list-style-type: none"> - No es necesario un ajuste de dosis 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado
Embarazo y lactancia	<ul style="list-style-type: none"> - Uso bajo supervisión médica - Los productos de dosificación intermitente pueden ser preferibles ya que proporcionan una dosis diaria de nicotina más baja que los parches. Los parches pueden ser preferibles en mujeres que sufren náuseas en el embarazo. - En lactancia, usar el producto justo después de amamantar y dejar el mayor tiempo posible hasta la siguiente toma (se recomiendan dos horas). 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado en el embarazo - En lactancia considerar el beneficio de la lactancia materna para el lactante y el beneficio del tratamiento para la madre 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado en el embarazo - En lactancia considerar el beneficio de la lactancia materna para el lactante y el beneficio del tratamiento para la madre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contraindicado

Fármacos	TSN	Bupropión comprimidos (Zyntabac®)	Vareniclina comprimidos (Champix®, Byteqi®, Cuitvar®, EFG)	Citisiniclina comprimidos (Todacitan®, Recigarum®, Zandraqet®)
Menores de 18 años	<ul style="list-style-type: none"> - Pulverización bucal Contraindicado - Parches <ul style="list-style-type: none"> • Nicorette®: contraindicados • Nicotinell® y Niquitin®: no deben administrarse a < 18 años sin la recomendación de un profesional sanitario y con una duración de 12 semanas. - Chicles <ul style="list-style-type: none"> • Experiencia limitada. No deben administrarse a <18 años sin recomendación de un profesional sanitario. - Comprimidos <ul style="list-style-type: none"> • Nicorette®: No recomendado • Nicotinell® y Niquitin®: no deben administrarse a < 18 años sin la recomendación de un profesional sanitario y con una duración de 10 semanas. 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado
Mayores de 65 años	<ul style="list-style-type: none"> - No es necesario un ajuste de dosis 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar a 150 mg/día 	<ul style="list-style-type: none"> - No es necesario un ajuste de dosis 	<ul style="list-style-type: none"> - No recomendado (por escasa experiencia de uso)

ACV (accidente cerebrovascular); HTA (hipertensión arterial); IAM (infarto agudo de miocardio); IMAO (inhibidores de la monoaminoxidasa); IRSN (inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina); ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina)

* clasificación Drug Interactions de Uptodate⁽²³⁾

Para más información se pueden consultar también las [fichas técnicas](#) de estos medicamentos