

FACTORES PREDISPONENTES C.A.P.V.

SOCIO-ECONÓMICOS:

- Sistema de explotación agrícola no industrial. (Caserío)
- Cultivos: Alimentación del ganado natural. (Pastos, forrajes....)

MEDIO-AMBIENTALES:

- Clima y orografía. (Humedad/Temperatura)

¿Por qué se mantiene el ciclo del parásito en la C.A.P.V.?

SOCIO-CULTURALES:

- Gastronomía y hábitos de consumo. (Carne poco hecha)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ANIMALES

1.- Explotación ganadera

Control de vectores
(aves, ratas, insectos) en los establos.
Desparasitación del ganado afectado.

2.- Cultivos para alimento del ganado

No utilizar aguas fecales como riego.
Evitar filtraciones de fosas sépticas.

3.- Cuidado del ganado

Limpieza exhaustiva de manos y útiles
en manipulaciones de piensos, forrajes, agua de bebida.

4.- Sacrificio de los animales

Inspección post-mortem de las carnes en mataderos.

5.- Destrucción de los animales muertos

En industrias controladas.



DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



MECANISMOS DE TRANSMISIÓN



TENIASIS Taenia Saginata

CISTICERCOSIS Cysticercus Bovis




PREVENCIÓN EN LA CAPV

CISTICERCOSIS BOVINA

¿Qué es la cisticercosis? Enfermedad parasitaria del músculo del ganado vacuno. El animal se infecta al consumir piensos/agua contaminados con heces humanas que contienen los huevos de la tenia adulta.

DIFUSIÓN DE LOS HUEVOS DE TAENIA SAGINATA EN EL MEDIO AMBIENTE



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE


Evitar el acceso de los huevos de taenia saginata a los alimentos del ganado vacuno:

- 1.- Depuración de aguas residuales.
- 2.- Control de vectores.
- 3.- Eliminación de vertidos inconsolidados.

CICLO BIOLÓGICO

Taenia spp.
Cysticercus spp.

¿Cómo se transmite la enfermedad parasitaria?



TENIASIS HUMANA / TAENIA SAGINATA

¿Qué es la teniasis? Enfermedad parasitaria humana. El hombre la adquiere al consumir carne de vacuno, poco cocinada, que contiene **larvas quísticas** de *Cysticercus Bovis* presentes en la musculatura del animal.



Síntomas normalmente asintomática, pueden aparecer molestias intestinales.

Diagnóstico presencia en heces de anillos o segmentos de taenia que contienen los **huevos infectantes**.

Tratamiento médico con antihelmínticos orales.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN HUMANA

- 1.- Hábitos Higiénicos: No defecar al aire libre.
- 2.- Hábitos consumo: tratamiento térmico de la carne que alcance el interior de la pieza.