

# CRITERIOS MED PED PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR\*

Historia Familiar	Puntuación
I. Familiar de primer grado con enfermedad coronaria y/o vascular precoz	1
II. Familiar de primer grado con c-LDL $\geq$ 210 mg/dl	1
III. Familiar de primer grado con Xantomas y/o Arco Corneal	2
IV. Niño menor de 18 años con c-LDL $\geq$ 150 mg/dl	2

Historia Personal	Puntuación
I. Antecedentes enfermedad coronaria precoz	2
II. Antecedentes de enfermedad vascular periférica o cerebral precoz (precoz= < 55 años en varones y < 60 años en mujeres)	1

Examen físico	Puntuación
I. Xantomas tendinosos	6
II. Arco Corneal antes de los 45 años	4

Analítica en ayunas, con triglicéridos < 200 mg/dl	Puntuación
I. c-LDL $\geq$ 330 mg/dL	8
II. c-LDL 250-329 mg/dL	5
III. c-LDL 190-249 mg/dL	3
IV. c-LDL 155-189 mg/dL	1
Alteración funcional del gen r-LDL	8

TOTAL DE PUNTOS:
<p>Diagnóstico Clínico de Hipercolesterolemia Familiar:</p> <p><b>Cierto:</b> &gt; 8 puntos      <b>Probable:</b> 6-7 puntos</p>

\*Modificado por la Red Temática en investigación ISCIII de Hiperlipidemias Genéticas en España de *Dutch lipid clinic network diagnosis of FH*.