



VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)


Semana 51 (del 15 al 21 de diciembre de 2025)

Los datos sitúan probablemente el pico de la epidemia de gripe en la semana 50, con un descenso en la mayoría de los indicadores esta semana. La tasa de bronquiolitis continúa aumentando y la tasa de COVID-19 se mantiene baja.


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 528,8 casos por 100.000 habitantes (432,4/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de síndrome gripal y la tasa de bronquiolitis en AP aumentan esta semana. La tasa de COVID-19 se mantiene baja.
- Se han confirmado el 60,7% de las 61 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 23 virus de la gripe, 7 VRS y un SARS-CoV-2.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 23,6 casos por 100.000 habitantes (22,5/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA y las tasas de bronquiolitis (<2 años) en AP se mantienen en niveles de intensidad bajos, mientras que el síndrome gripal en urgencias desciende al nivel de intensidad media.
- Esta semana se han registrado 909 virus de la gripe, 280 VRS y 13 SARS-CoV-2 en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 528,8 casos por 100.000 habitantes (432,4/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 405,8/100.000 en Araba, 516,6/100.000 en Bizkaia y 605,1/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 4588,7 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 2321,6 y 580,3 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 281,4 casos por 100.000 habitantes (266,7 /100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas ascienden en todas las OSI excepto en OSI Tolosaldea.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

OSI	Tasa Semana 51	Tasa Semana 50	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	432,6	310,8	1,39 (1,27-1,51)
OSI Rioja Alavesa	934,0	764,2	1,22 (0,92-1,61)
OSI Barakaldo-Sestao	503,4	360,5	1,39 (1,23-1,57)
OSI Barrualde-Galdakao	550,1	444,5	1,23 (1,15-1,32)
OSI Bilbao-Basurto	526,4	443,2	1,18 (1,10-1,27)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	521,9	351,0	1,48 (1,33-1,65)
OSI Uribe	419,8	309,9	1,35 (1,22-1,49)
OSI Bidasoa	598,6	562,6	1,06 (0,93-1,21)
OSI Debabarrena	605,9	544,6	1,11 (0,97-1,27)
OSI Debagoiena	479,0	465,1	1,03 (0,87-1,20)
OSI Donostialdea	556,9	487,2	1,14 (1,07-1,21)
OSI Goierri-Urola Garaia	738,6	621,6	1,18 (1,06-1,32)
OSI Tolosaldea	640,9	659,4	0,97 (0,84-1,11)

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripe en AP aumenta hasta los 58,5 casos por 100.000 habitantes (54,5/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) asciende y es de 884,0 casos por 100.000 habitantes (591,8 /100.000 en la semana anterior), y la tasa COVID-19 se mantiene baja en los 0,8 casos por 100.000 habitantes (0,7/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 61 muestras centinela y se han confirmado el 60,7%. Se han detectado 23 virus de la gripe (12 A(H3) y 11 A(H1)), 7 VRS y un SARS-CoV-2.

Tasa de IRA en AP y n.º de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE



La positividad del virus de la gripe se mantiene alta en el 37,7% (42,0% en la semana anterior) y la del VRS se sitúa en el 11,5% (8,0% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 1,6% (0,0% en la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE


	Semana 51		Semana 50		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	23	37,7	21	42,0	288	38,2
SARS-CoV-2	1	1,6	0	0,0	10	1,3
VRS	7	11,5	4	8,0	29	3,9
Metaneumovirus	1	0,0	1	2,0	1	0,1
Parainfluenza	0	0,0	2	4,0	17	2,3
Adenovirus	0	0,0	1	2,0	5	0,7
Rinovirus	5	8,2	3	6,0	157	20,8
CoV estacionales	2	3,3	3	6,0	22	2,9
Enterovirus	0	0,0	0	0,0	5	0,7

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 23,6 casos por 100.000 habitantes (22,5 /100.000 en la semana anterior), 22,4/100.000 en hombres y 24,6/100.000 en mujeres.


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 123,4 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo 1 a 4 años con 70,3 y 33,4 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 7,4 por 100.000 habitantes (8,6/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) ha sido de 2,0 por 100.000 habitantes (1,3/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) de 0,2 por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 1,0% (0,7% en la semana anterior). La positividad del virus de la gripe baja al 38,3% (46,5% la semana anterior) y la del VRS aumenta hasta el 18,3% (13,9% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 51		Semana 50		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	397	1,0	402	0,7	3234	2,7
Influenza	444	38,3	409	46,5	3041	33,5
VRS	387	18,3	381	13,9	2745	8,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025 y actualmente presenta un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**




En el síndrome gripe, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se superó en la semana 42/2025. Esta semana el nivel de intensidad desciende a nivel medio.

**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se superó en la semana 48/2025 y esta semana se mantiene en un nivel de intensidad bajo.

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 909 virus de la gripe, 280 VRS y 13 SARS-CoV-2 en este sistema.

De los 909 virus gripales detectados esta semana, 481 han sido tipo A, 282 A(H3), 143 A(H1)pdm09 y 3 de tipo B. Desde la semana 40/2025 se han registrado 5823 detecciones de virus de la gripe, 5808 (99,7%) de tipo A y 15 (0,3%) de tipo B. De los 2824 virus tipo A subtipados, 1877 (62,9%) han sido A(H3) y 1107 (37,1%) A(H1)pdm09.

**Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS.
SIM. 2025-2026, CAE**



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

26 de diciembre de 2025

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones