

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)


Semana 3 (del 12 al 18 de enero de 2026)

Los diagnósticos de gripe y de bronquiolitis muestran una tendencia descendente, aunque la circulación del VRS se mantiene alta. La tasa de COVID-19 sigue siendo baja.


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 477,6 casos por 100.000 habitantes (483,1/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis en AP descienden respecto a la semana anterior. La tasa de COVID-19 se mantiene baja.
- Se han confirmado el 64,7% de las 68 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 18 virus de la gripe, 16 VRS y un SARS-CoV-2.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 26,3 casos por 100.000 habitantes (25,5/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de IRA y la tasa de bronquiolitis (<2 años) en AP se mantienen en niveles de intensidad bajos, al igual que el síndrome gripal en urgencias.
- Esta semana se han registrado 375 virus de la gripe, 363 VRS y 17 SARS-CoV-2 en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 477,6 casos por 100.000 habitantes (483,1/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 375,1/100.000 en Araba, 474,3/100.000 en Bizkaia y 530,4/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 2889,7 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 64 años con 1297,0 y 624,6 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 234,7 casos por 100.000 habitantes (269,0/100.000 en la semana anterior).




En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas ascienden en algunas OSI y descienden en otras respecto a la semana anterior.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE			
OSI	Tasa Semana 3	Tasa Semana 2	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	403,9	376,2	1,07 (0,99-1,17)
OSI Rioja Alavesa	764,2	789,7	0,97 (0,72-1,29)
OSI Barakaldo-Sestao	412,3	458,7	0,90 (0,80-1,01)
OSI Barrualde-Galdakao	523,6	545,9	0,96 (0,90-1,03)
OSI Bilbao-Basurto	511,4	499,6	1,02 (0,96-1,09)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	453,2	461,8	0,98 (0,89-1,09)
OSI Uribe	363,0	348,5	1,04 (0,94-1,15)
OSI Bidasoa	486,8	517,6	0,94 (0,82-1,08)
OSI Debarrena	541,8	534,8	1,01 (0,88-1,17)
OSI Debagoiena	479,0	472,8	1,01 (0,86-1,19)
OSI Donostialdea	484,2	522,2	0,93 (0,87-0,99)
OSI Goierri-Urola Garaia	608,1	617,4	0,98 (0,88-1,10)
OSI Tolosaldea	617,7	568,3	1,09 (0,94-1,25)

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP desciende hasta los 25,8 casos por 100.000 habitantes (37,1/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) también desciende y se sitúa en los 353,6 casos por 100.000 habitantes (386,1/100.000 en la semana anterior), y la tasa COVID-19 se mantiene baja en los 0,9 casos por 100.000 habitantes (1,0/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 68 muestras centinela y se han confirmado el 64,7%. Se han detectado 18 virus de la gripe (14 AH1 y 4 AH3), 16 VRS y un SARS-CoV-2.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE**



La positividad del virus de la gripe descende esta semana y se sitúa en el 26,5% (35,5% en la semana anterior) y la del VRS asciende hasta el 23,5% (9,7% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 1,5% (3,2% en la semana anterior).


Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE

	Semana 3		Semana 2		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	18	26,5	11	35,5	335	37,1
SARS-CoV-2	1	1,5	1	3,2	13	1,4
VRS	16	23,5	3	9,7	60	6,6
Metaneumovirus	1	1,5	1	3,2	4	0,4
Parainfluenza	2	2,9	0	0,0	21	2,3
Adenovirus	2	2,9	0	0,0	7	0,8
Rinovirus	3	4,4	3	9,7	168	18,6
CoV estacionales	6	8,8	2	6,5	35	3,9
Enterovirus	1	1,5	0	0,0	7	0,8


IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica


Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 26,3 casos por 100.000 habitantes (25,5/100.000 en la semana anterior), 25,2/100.000 en hombres y 27,4/100.000 en mujeres.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 89,4 casos por 100.000, seguido por el grupo de menores de 1 año y el grupo 45 a 64 años con 79,9 y 10,6 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 4,2 por 100.000 habitantes (4,6/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) ha sido de 4,3 por 100.000 habitantes (3,9/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) de 0,2 por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 0,5% (0,7% en la semana anterior). La positividad del virus de la gripe se mantiene en el 21,9% (22,6% la semana anterior) y la del VRS aumenta ligeramente hasta el 27,2% (25,6% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 3		Semana 2		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	434	0,5	425	0,7	4861	2,0
Influenza	494	21,9	492	22,6	4885	31,2
VRS	448	27,2	453	25,6	4415	14,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025 y actualmente presenta un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**




En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se superó en la semana 42/2025 y actualmente presenta tendencia descendente y un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se superó en la semana 48/2025 y esta semana se mantiene en un nivel de intensidad bajo, muy cerca del umbral epidémico.

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 375 virus de la gripe, 363 VRS y 17 SARS-CoV-2 en este sistema.

De los 375 virus gripales detectados esta semana, 258 han sido tipo A, 54 A(H3), 60 A(H1)pdm09 y 3 tipo B. Desde la semana 40/2025 se han registrado 7946 detecciones de virus de la gripe, 7925 (99,7%) de tipo A y 21 (0,3%) de tipo B. De los 4125 virus tipo A subtipados, 2542 (61,6%) han sido A(H3) y 1583 (38,4%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [*web del Departamento de Salud*](#) y en los siguientes enlaces: [*SiVIRA*](#) (estatal), [*Flu News*](#) (Europa, gripe), [*FluNet*](#), (Mundial, gripe), [*OPS*](#) (América, gripe), [*CDC*](#) (EEUU).

22 de enero de 2026

**Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones**