

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)

Semana 22 (del 25 al 31 de mayo de 2026)


Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico). La tasa de COVID-19 sigue siendo baja.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 199,5 casos por 100.000 habitantes (227,8/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal, COVID-19 y bronquiolitis se mantienen en niveles bajos en AP.
- Se han confirmado el 72,7% de las 22 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, no detectándose ningún SARS-CoV-2, virus de la gripe o VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 10,9 casos por 100.000 habitantes (10,7 /100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA y bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico).
- Esta semana se han registrado 6 SARS-CoV-2, 8 virus de la gripe y un VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 199,5 casos por 100.000 habitantes (227,8/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 150,4/100.000 en Araba, 207,7/100.000 en Bizkaia y 209,0/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 1713,5 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 1101,5 y 280,4 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre con algún síntoma de IRA*¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 60,5 casos por 100.000 habitantes (85,4 /100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas descienden en la mayoría de las OSI.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

| OSI | Tasa Semana 22 | Tasa Semana 21 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| OSI Araba | 162,0 | 151,6 |
| OSI Barakaldo-Sestao | 175,9 | 215,2 |
| OSI Barrualde-Galdakao | 216,4 | 264,2 |
| OSI Bidasoa | 173,4 | 205,5 |
| OSI Bilbao-Basurto | 238,0 | 273,4 |
| OSI Debabarrena | 218,7 | 236,8 |
| OSI Debagoiena | 204,6 | 207,7 |
| OSI Donostialdea | 180,8 | 223,7 |
| OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces | 178,3 | 221,6 |
| OSI Goierri-Urola Garaia | 279,7 | 255,9 |
| OSI Rioja Alavesa | 305,7 | 441,5 |
| OSI Tolosaldea | 240,9 | 321,2 |
| OSI Uribe | 172,4 | 182,4 |

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP se sitúa en los 0,5 casos por 100.000 habitantes (0,5/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 144,3 casos por 100.000 habitantes (126,3/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 de 0,4 casos por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 22 muestras centinela y se han confirmado el 72,7%. No se han detectado ningún SARS-CoV-2, virus de la gripe o VRS, pero se han detectado 9 rinovirus y 3 metapneumovirus.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE**



La positividad del SARS-CoV2, del virus de la gripe y del VRS ha sido del 0,0% (8,3%, 0,0% y 0,0% la semana anterior, respectivamente).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE


| | Semana 22 | | Semana 21 | | Total 2025-2026 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|
| | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv. (%) |
| Influenza | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 383 | 25,2 |
| SARS-CoV-2 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 1,6 |
| VRS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 99 | 6,5 |
| Metaneumovirus | 3 | 13,6 | 1 | 4,2 | 61 | 4,0 |
| Parainfluenza | 2 | 9,1 | 2 | 8,3 | 63 | 4,1 |
| Adenovirus | 2 | 9,1 | 0 | 0,0 | 24 | 1,6 |
| Rinovirus | 9 | 40,9 | 7 | 29,2 | 301 | 19,8 |
| CoV estacionales | 1 | 4,5 | 0 | 0,0 | 96 | 6,3 |
| Enterovirus | 2 | 9,1 | 1 | 4,2 | 20 | 1,3 |

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 10,9 casos por 100.000 habitantes (10,7 /100.000 en la semana anterior).


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 32,5 casos por 100.000, seguido por el grupo de menores de 1 año y el grupo de 1 a 4 años con 21,8 y 8,4 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11), con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) y con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,0 por 100.000 habitantes.




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 0,7% (1,3% en la semana anterior), la del virus de la gripe del 0,8% (0,7% la semana anterior) y del VRS se ha situado en el 0,0% (0,0% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

| | Semana 22 | | Semana 21 | | Total 2025-2026 | |
|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) |
| SARS-CoV-2 | 142 | 0,7 | 152 | 1,3 | 8643 | 1,4 |
| Influenza | 130 | 0,8 | 147 | 0,7 | 8809 | 19,0 |
| VRS | 104 | 0,0 | 129 | 0,0 | 7938 | 13,8 |

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025, volviendo al nivel basal en la semana 08/2026, donde se mantiene actualmente. El pico epidémico registró un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se ha superado en la semana 42/2025, volviendo al nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. En este caso, la epidemia ha llegado a alcanzar un nivel de intensidad alto.


**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se ha superado en la semana 48/2025, volviendo al

nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. Durante la epidemia, la intensidad no ha sobrepasado el nivel de intensidad bajo

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 6 SARS-CoV-2, 8 virus de la gripe y un VRS en este sistema.

De los 8 virus gripales detectados esta semana, 5 han sido tipo A, uno A(H3), 2 A(H1)pdm09. Desde la semana 40/2025 se han registrado 8766 detecciones de virus de la gripe, 8706 (99,4%) de tipo A y 52 (0,6%) de tipo B. De los 4641 virus tipo A subtipados, 2761 (59,5%) han sido A(H3) y 1880 (40,5%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

3 de junio de 2026

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones