

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)


Semana 25 (del 15 al 21 de junio de 2026)

Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico). La tasa de COVID-19 sigue siendo baja.


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 144,8 casos por 100.000 habitantes (173,6/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal, COVID-19 y bronquiolitis se mantienen en niveles bajos en AP.
- Se han confirmado el 18,2% de las 11 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, no detectándose ningún SARS-CoV-2, virus de la gripe o VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 8,2 casos por 100.000 habitantes (8,8/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA y bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico).
- Esta semana se han registrado 5 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y 3 VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 144,8 casos por 100.000 habitantes (173,6/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 91,0/100.000 en Araba, 151,6/100.000 en Bizkaia y 159,0/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 1517,5 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 981,1 y 214,0 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 38,4 casos por 100.000 habitantes (45,2/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas descienden en todas las OSIs excepto en OSI Bidasoa que se mantiene y OSI Debagoiena y OSI Tolosaldea que aumentan ligeramente.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

OSI	Tasa Semana 25	Tasa Semana 24
OSI Araba	96,9	137,7
OSI Barakaldo-Sestao	117,8	164,9
OSI Barrualde-Galdakao	158,6	179,6
OSI Bidasoa	155,4	155,4
OSI Bilbao-Basurto	164,9	206,9
OSI Debabarrena	164,3	186,6
OSI Debagoiena	148,8	144,2
OSI Donostialdea	147,2	161,7
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	149,2	190,7
OSI Goierri-Urola Garaia	166,8	222,7
OSI Rioja Alavesa	212,3	271,7
OSI Tolosaldea	177,6	166,8
OSI Uribe	130,7	157,9

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP se sitúa en los 0,2 casos por 100.000 habitantes (0,4 /100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 75,8 casos por 100.000 habitantes (75,8/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 de 0,2 casos por 100.000 habitantes (0,4 /100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 11 muestras centinela y se han confirmado el 18,2%. No se han detectado ningún SARS-CoV-2, virus de la gripe o VRS, pero se han detectado 1 rinovirus y 1 adenovirus.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE**



La positividad del SARS-CoV2 esta semana se sitúa en el 0,0% (4,0% la semana anterior), al igual que la del virus de la gripe y la del VRS (0,0% la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE


	Semana 25		Semana 24		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	0	0,0	0	0,0	383	24,2
SARS-CoV-2	0	0,0	0	0,0	25	1,6
VRS	0	0,0	0	0,0	99	6,3
Metaneumovirus	0	0,0	3	12,5	66	4,2
Parainfluenza	0	0,0	2	8,3	66	4,2
Adenovirus	1	9,1	3	12,5	28	2,0
Rinovirus	1	9,1	3	12,5	310	19,6
CoV estacionales	0	0,0	0	0,0	96	6,1
Enterovirus	0	0,0	2	8,3	24	1,5

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 8,2 casos por 100.000 habitantes (8,8 /100.000 en la semana anterior).


**Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores 1 año con 29,0 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo de 1 a 4 años con 24,2 y 8,4 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,1 casos por 100.000 habitantes (0,0 /100.000 en la semana anterior), y los ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) y gripe (J09-J11) se han mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes.




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 ha sido esta semana de 2,9 (0,0% en la semana anterior), la del virus de la gripe han sido del 0,0% (0,0% en la semana anterior) y del VRS se ha situado en el 1,2% (1,0% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 25		Semana 24		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	104	2,9	122	0,0	8982	1,4
Influenza	96	0,0	113	0,0	9130	18,3
VRS	83	1,2	97	1,0	8220	13,4

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025, volviendo al nivel basal en la semana 08/2026, donde se mantiene actualmente. El pico epidémico registró un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se ha superado en la semana 42/2025, volviendo al nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. En este caso, la epidemia ha llegado a alcanzar un nivel de intensidad alto.


**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se ha superado en la semana 48/2025, volviendo al

nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. Durante la epidemia, la intensidad no ha sobrepasado el nivel de intensidad bajo

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 5 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y 3 VRS en este sistema.

El virus gripal detectado esta semana han sido tipo B. Desde la semana 40/2025 se han registrado 8774 detecciones de virus de la gripe, 8721 (99,4%) de tipo A y 53 (0,6%) de tipo B. De los 4650 virus tipo A subtipados, 2762 (59,4%) han sido A(H3) y 1888 (40,6%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [*web del Departamento de Salud*](#) y en los siguientes enlaces: [*SiVIRA*](#) (estatal), [*Flu News*](#) (Europa, gripe), [*FluNet*](#), (Mundial, gripe), [*OPS*](#) (América, gripe), [*CDC*](#) (EEUU).

24 de junio de 2026

**Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones**