

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)


Semana 35 (del 24 al 30 de agosto de 2026)

Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico), pero con un aumento de la circulación de gripe en las últimas semanas. La tasa de COVID-19 sigue siendo baja, pero han aumentado las detecciones de SARS-CoV-2.


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 109,4 casos por 100.000 habitantes (93,9/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal, COVID-19 y bronquiolitis se mantienen en niveles bajos en AP, con un ligero aumento las últimas semanas para el síndrome gripal y la COVID-19.
- Se han confirmado el 50,0% de las 14 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 3 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y ningún VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 7,4 casos por 100.000 habitantes (7,4/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA y bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico).
- Esta semana se han registrado 68 SARS-CoV-2, 29 virus de la gripe y ningún VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 109,4 casos por 100.000 habitantes (93,9/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 92,8/100.000 en Araba, 103,8/100.000 en Bizkaia y 125,9/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 711,5 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 15 a 44 años con 282,5 y 121,1 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 40,9 casos por 100.000 habitantes (33,4/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), esta semana las tasas ascienden en casi todas las OSI.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

OSI	Tasa Semana 35	Tasa Semana 34
OSI Araba	97,9	98,6
OSI Barakaldo-Sestao	82,5	77
OSI Barrualde-Galdakao	116,3	103,7
OSI Bidasoa	136,2	98,9
OSI Bilbao-Basurto	105,9	92,7
OSI Debabarrena	118,4	85
OSI Debagoiena	91,5	57,4
OSI Donostialdea	129,4	113,8
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	107,7	77,4
OSI Goierri-Urola Garaia	111,9	88,1
OSI Rioja Alavesa	237,8	271,7
OSI Tolosaldea	122,0	83,4
OSI Uribe	84,9	72,6

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP se sitúa en los 1,0 casos por 100.000 habitantes (0,6/100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 28,9 casos por 100.000 habitantes (32,5/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 asciende a 1,4 caso por 100.000 habitantes (1,5/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 14 muestras centinela y se han confirmado el 50,0%. Se han detectado 3 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y ningún VRS.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE**



Esta semana, la positividad de SARS-CoV-2 ha sido del 21,4%, la del virus de la gripe del 7,1% y la del VRS se mantiene en el 0,0%.


Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE

	Semana 35		Semana 34		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	3	21,4	2	25,0	386	23,2
SARS-CoV-2	1	7,1	0	0,0	31	1,9
VRS	0	0,0	0	0,0	99	6,0
Metaneumovirus	1	7,1	0	0,0	72	4,3
Parainfluenza	0	0,0	2	25,0	73	4,4
Adenovirus	1	7,1	0	0,0	40	2,4
Rinovirus	0	0,0	4	50,0	325	19,6
CoV estacionales	1	7,1	0	0,0	99	6,0
Enterovirus	0	0,0	0	0,0	24	1,4


IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica


Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 7,4 casos por 100.000 habitantes (7,4/100.000 en la semana anterior).



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores mayores de 64 años con 22,7 casos por 100.000, seguido por el grupo de 1-4 años y el grupo de 45-64 años con 5,0 y 4,3 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) se ha mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes. Los ingresos con códigos de gripe (J09-J11) han sido de 0,2 casos por 100.000 habitantes (0,2/100.000 en la semana anterior), mientras que los ingresos por COVID-19 (U07.1) se sitúan en 0,3 casos por 100.000 habitantes (0,1/100.000 la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 aumenta hasta el 8,0% esta semana (3,2% en la semana anterior), la del virus de la gripe hasta el 9,4% (5,6% en la semana anterior) y la del VRS se ha mantenido en el 0,0%.

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 35		Semana 34		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	100	8,0	95	3,2	9871	1,5
Influenza	96	9,4	90	5,6	9977	17,0
VRS	88	0,0	83	0,0	8990	12,2

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025, volviendo al nivel basal en la semana 08/2026, donde se mantiene actualmente. El pico epidémico registró un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se ha superado en la semana 42/2025, volviendo al nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. En este caso, la epidemia ha llegado a alcanzar un nivel de intensidad alto.


**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se ha superado en la semana 48/2025, volviendo al

nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. Durante la epidemia, la intensidad no ha sobrepasado el nivel de intensidad bajo

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 68 SARS-CoV-2, 29 virus de la gripe y ningún VRS en este sistema.

De los 29 virus gripales detectados esta semana, 19 han sido tipo A, 9 A(H3) y uno A(H1)pdm09. Desde la semana 40/2025 se han registrado 8862 detecciones de virus de la gripe, 8806 (99,4%) de tipo A y 56 (0,6%) de tipo B. De los 4704 virus tipo A subtipados, 2812 (59,8%) han sido A(H3) y 1892 (40,2%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [*web del Departamento de Salud*](#) y en los siguientes enlaces: [*SiVIRA*](#) (estatal), [*Flu News*](#) (Europa, gripe), [*FluNet*](#), (Mundial, gripe), [*OPS*](#) (América, gripe), [*CDC*](#) (EEUU).

2 de septiembre de 2026

**Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones**