

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2025-2026

(del 29 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2026)

Semana 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2026)


Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico), pero con un aumento de la circulación de gripe en las últimas semanas. La tasa de COVID-19 y las detecciones de SARS-CoV-2 también muestran una tendencia ascendente.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 183,1 casos por 100.000 habitantes (171,2/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal y COVID-19 presentan una tendencia ascendente en AP, mientras la tasa de bronquiolitis se mantiene estable.
- Se han confirmado el 66,7% de las 21 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 3 virus de la gripe, 3 SARS-CoV-2 y ningún VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 9,6 casos por 100.000 habitantes (8,7/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de IRA y bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico), pero con tendencia ascendente en el caso de la IRA y del síndrome gripal.
- Esta semana se han registrado 161 SARS-CoV-2, 76 virus de la gripe y ningún VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 183,1 casos por 100.000 habitantes (171,2/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 114,9/100.000 en Araba, 212,5/100.000 en Bizkaia y 167,8/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 1524,7 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 64 años con 498,1 y 179,6 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 79,3 casos por 100.000 habitantes (78,0/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), esta semana las tasas ascienden en la mayoría de las OSI.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE

OSI	Tasa Semana 37	Tasa Semana 36
OSI Araba	122,5	121,8
OSI Barakaldo-Sestao	172,8	131,2
OSI Barrualde-Galdakao	228,7	206,1
OSI Bidasoa	156,7	155,4
OSI Bilbao-Basurto	236,9	242,1
OSI Debarrena	190,8	174,1
OSI Debagoiena	103,9	107,0
OSI Donostialdea	162,5	149,6
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	203,1	169,6
OSI Goierri-Urola Garaia	172,0	177,2
OSI Rioja Alavesa	263,2	254,7
OSI Tolosaldea	196,1	162,1
OSI Uribe	165,6	154,3

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP aumenta hasta los 3,8 casos por 100.000 habitantes (2,4/100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 64,9 casos por 100.000 habitantes (36,1/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 asciende a 7,1 casos por 100.000 habitantes (3,8/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 21 muestras centinela y se han confirmado el 66,7%. Se han registrado 3 virus de la gripe, 3 SARS-CoV-2 y ningún VRS. También se han detectado 5 virus parainfluenzae y 2 coronavirus estacionales.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2025-2026, CAE**



Esta semana, la positividad de SARS-CoV-2 ha sido del 14,3% (9,1% la semana anterior), la del virus de la gripe del 14,3% (13,6% la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 0,0%.


Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2025-2026, CAE

	Semana 37		Semana 36		Total 2025-2026	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
SARS-CoV-2	3	14,3	2	9,1	36	2,1
Influenza	3	14,3	3	13,6	392	23,0
VRS	0	0	0	0	99	5,8
Metaneumovirus	0	0	0	0	72	4,2
Parainfluenza	5	23,8	0	0	78	4,6
Adenovirus	0	0	1	4,5	41	2,4
Rinovirus	1	4,8	2	9,1	328	19,2
CoV estacionales	2	9,5	4	18,2	105	6,2
Enterovirus	1	4,8	2	9,1	27	1,6


IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica


Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 9,6 casos por 100.000 habitantes (8,7/100.000 en la semana anterior).



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de un año con 29,0 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo de 45-64 años con 28,5 y 5,9 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) se ha mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes. Los ingresos con códigos de gripe (J09-J11) han sido de 0,7 casos por 100.000 habitantes (0,4/100.000 en la semana anterior), mientras que los ingresos por COVID-19 (U07.1) se sitúan en 1,0 casos por 100.000 habitantes (0,7/100.000 la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 aumenta hasta el 15,0% esta semana (13,8% en la semana anterior), la del virus de la gripe sube al 11,7% (7,1% en la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 0,0%.

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE

	Semana 37		Semana 36		Total 2025-2026	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	160	15,0	130	13,8	10161	1,9
Influenza	145	11,7	112	7,1	10234	16,8
VRS	134	0,0	104	0,0	9228	11,9

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 40/2025, volviendo al nivel basal en la semana 08/2026, donde se mantiene actualmente. El pico epidémico registró un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE**



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que el umbral epidémico se ha superado en la semana 42/2025, volviendo al nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. En este caso, la epidemia ha llegado a alcanzar un nivel de intensidad alto.


**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2025-2026, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, el umbral epidémico se ha superado en la semana 48/2025, volviendo al

nivel basal en la semana 05/2026, donde se mantiene actualmente. Durante la epidemia, la intensidad no ha sobrepasado el nivel de intensidad bajo

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2025-2026, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 161 SARS-CoV-2, 76 virus de la gripe y ningún VRS en este sistema.

De los 76 virus gripales detectados esta semana, 41 han sido tipo A, 31 A(H3), 3 A(H1)pdm09 y uno tipo B. Desde la semana 40/2025 se han registrado 8992 detecciones de virus de la gripe, 8935 (99,4%) de tipo A y 57 (0,6%) de tipo B. De los 4792 virus tipo A subtipados, 2895 (60,4%) han sido A(H3) y 1897 (39,6%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2025-2026, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [*web del Departamento de Salud*](#) y en los siguientes enlaces: [*SiVIRA*](#) (estatal), [*Flu News*](#) (Europa, gripe), [*FluNet*](#), (Mundial, gripe), [*OPS*](#) (América, gripe), [*CDC*](#) (EEUU).

16 de septiembre de 2026

**Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones**