Osakidetza

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2026-2027
(del 28 de septiembre de 2026 al 3 de octubre de 2027)

Semana 42 (del 12 al 18 de octubre de 2026)

Las detecciones de SARS-CoV-2 descienden esta semana. Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico).

- ***Esta semana tiene un día festivo, lo que influye de manera significativa en la validez de los datos, sobre todo en los obtenidos de Atención Primaria***.
- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 238,2 casos por 100.000 habitantes (299,5/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de COVID-19 y de gripe en AP descienden esta semana, pero asciende la de la bronquiolitis.
- Se han confirmado el 66,7% de las 24 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 4 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y ningún VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 12,4 casos por 100.000 habitantes (11,9/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico). La tasa de IRA en AP, que cruzó el umbral epidémico la semana 39/2026, se sitúa otra vez por debajo del umbral.
- Esta semana se han registrado 203 SARS-CoV-2, 54 virus de la gripe y un VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica

Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 238,2 casos por 100.000 habitantes (299,5/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 181,5/100.000 en Araba, 241,1/100.000 en Bizkaia y 259,9/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3143,8 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 79 años con 1423,6 y 287,1 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA[1]) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 87,2 casos por 100.000 habitantes (117,6/100.000 en la semana anterior).

Tasa de PLA abiertos relacionados con IRA por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), esta semana las tasas descienden en todas las OSI.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE

OSI	Tasa Semana 42	Tasa Semana 41
OSI Araba	196,8	224,9
OSI Barakaldo-Sestao	217,6	278,4
OSI Barrualde-Galdakao	246,0	310,5
OSI Bidasoa	242,2	313,0
OSI Bilbao-Basurto	272,6	348,4
OSI Debabarrena	239,2	317,0
OSI Debagoiena	224,2	275,2
OSI Donostialdea	259,3	307,3
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	237,9	324,1
OSI Goierri-Urola Garaia	256,7	349,5
OSI Rioja Alavesa	335,1	494,3
OSI Tolosaldea	275,7	341,9
OSI Uribe	182,5	237,9

[1] Para más información consultar *Metodología en vigilancia de IRA*

La tasa de síndrome gripal en AP desciende a los 3,8 casos por 100.000 habitantes (4,7/100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 241,3 casos por 100.000 habitantes (218,7/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 desciende a 9,2 casos por 100.000 habitantes (16,4/100.000 en la semana anterior).

Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 24 muestras centinela y se han confirmado el 66,7%. Se han registrado 4 SARS-CoV-2, un virus de la gripe y ningún VRS. También se han detectado 5 rinovirus, 2 virus parainfluenza y 2 enterovirus.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2026-2027, CAE



Esta semana, la positividad de SARS-CoV-2 ha sido del 16,7% (21,3% la semana anterior), la del virus de la gripe del 4,2% (6,4% la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 0,0%.

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2026-2027, CAE

	Semana 42		Semana 41		Total 2026-2027	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
SARS-CoV-2	4	16,7	10	21,3	25	20,0
Influenza	1	4,2	3	6,4	4	3,2
VRS	0	0	0	0	0	0
Metaneumovirus	0	0	0	0	0	0
Parainfluenza	2	8,3	0	0	6	4,8
Adenovirus	1	4,2	0	0	1	0,8
Rinovirus	5	20,8	12	25,5	37	29,6
CoV estacionales	1	4,2	5	10,6	11	8,8
Enterovirus	2	8,3	4	8,5	9	7,2

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 12,4 casos por 100.000 habitantes (11,9/100.000 en la semana anterior).

Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 79 años con 71,5 casos por 100.000, seguido por el grupo menores de un año y el grupo de 70-79 años con 38,2 y 27,1 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) se ha mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes. Los ingresos con códigos de gripe (J09-J11) han sido de 0,4 casos por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior), mientras que los ingresos por COVID-19 (U07.1) se sitúan en 1,4 casos por 100.000 habitantes (1,2/100.000 la semana anterior).



Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 asciende hasta el 12,4% esta semana (10,2% en la semana anterior), la del virus de la gripe se sitúa en el 5,3% (5,1% en la semana anterior) y la del VRS en el 0,0% (1,3% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE

	Semana 42		Semana 41		Total 2026-2027	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	225	12,4	226	10,2	685	13,0
Influenza	190	5,3	176	5,1	572	5,1
VRS	174	0,0	157	1,3	507	0,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE



Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.

En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 39/2026, situándose la tasa actualmente ligeramente por debajo del umbral epidémico.

Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico).

Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico).

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 203 SARS-CoV-2, 54 virus de la gripe y un VRS en este sistema.

De los 54 virus gripales detectados esta semana, 36 han sido tipo A, 2 A(H3) y 16 A(H1)pdm09. Desde la semana 40/2026 se han registrado 147 detecciones de virus de la gripe, 139 (94,6%) de tipo A y 8 (5,4%) de tipo B. De los 64 virus tipo A subtipados, 23 (35,9%) han sido A(H3) y 41 (64,1%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2026-2027, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la *web del Departamento de Salud* y en los siguientes enlaces: *SiVIRA* (estatal), *Flu News* (Europa, gripe), *FluNet*, (Mundial, gripe), *OPS* (América, gripe), *CDC* (EEUU).

21 de octubre de 2026

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones