VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2026-2027
(del 28 de septiembre de 2026 al 3 de octubre de 2027)

Semana 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2026)


Las tasas de COVID-19 se sitúan en valores parecidos a los de la semana anterior. Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico).

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 340,4 casos por 100.000 habitantes (280,4/100.000 en la semana anterior).
- En AP, aumenta la tasa de gripe y descienden ligeramente las de COVID-19 y de bronquiolitis.
- Se han confirmado el 63,3% de las 49 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 4 SARS-CoV-2, 4 virus de la gripe y ningún VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 12,5 casos por 100.000 habitantes (11,8/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico). La tasa de IRA en AP, que cruzó el umbral epidémico la semana 39/2026, se sitúa en un nivel de intensidad bajo.
- Esta semana se han registrado 115 SARS-CoV-2, 106 virus de la gripe y 2 VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica

Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 340,4 casos por 100.000 habitantes (280,4/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 229,2/100.000 en Araba, 367,5/100.000 en Bizkaia y 349,1/100.000 en Gipuzkoa.




Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3823,0 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y 5 a 19 años con 1912,1 y 371,6 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA[1]) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 135,9 casos por 100.000 habitantes (102,7/100.000 en la semana anterior).

Tasa de PLA abiertos relacionados con IRA por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), esta semana las tasas ascienden en casi todas las OSI.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE

OSI	Tasa Semana 45	Tasa Semana 44
OSI Araba	249,3	212,9
OSI Barakaldo-Sestao	340,0	275,3
OSI Barrualde-Galdakao	395,4	310,8
OSI Bidasoa	324,6	215,1
OSI Bilbao-Basurto	391,8	328,7
OSI Debabarrena	368,5	287,8
OSI Debagoiena	315,4	230,4
OSI Donostialdea	324,2	283,9
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	371,6	289,6
OSI Goierri-Urola Garaia	401,0	347,4
OSI Rioja Alavesa	402,2	527,9
OSI Tolosaldea	355,8	292,6
OSI Uribe	275,7	229,3

[1] Para más información consultar *Metodología en vigilancia de IRA*

La tasa de síndrome gripal en AP aumenta hasta los 7,2 casos por 100.000 habitantes (5,0/100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) ha sido de 226,3 casos por 100.000 habitantes (241,3/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 desciende a los 6,4 casos por 100.000 habitantes (8,1/100.000 en la semana anterior).


Tasa por temporada y semana epidemiológica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 49 muestras centinela y se han confirmado el 63,3%. Se han registrado 4 SARS-CoV-2, 5 virus de la gripe y ningún VRS. También se han detectado 11 rinovirus, 7 virus parainfluenza, 5 coronavirus estacionales y 4 enterovirus.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2026-2027, CAE



Esta semana, la positividad de SARS-CoV-2 ha sido del 8,2% (12,5% la semana anterior), la del virus de la gripe del 8,2% (8,3% la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 0,0%.

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2026-2027, CAE


	Semana 45		Semana 44		Total 2026-2027	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
SARS-CoV-2	4	8,2	6	12,5	39	15,2
Influenza	4	8,2	4	8,3	14	5,5
VRS	0	0	0	0	0	0
Metaneumovirus	2	4,1	1	2,1	3	1,2
Parainfluenza	7	14,3	4	8,3	20	7,8
Adenovirus	2	4,1	0	0	6	2,3
Rinovirus	11	22,4	11	22,9	66	25,8
CoV estacionales	5	10,2	3	6,2	20	7,8
Enterovirus	4	8,2	3	6,2	17	6,6

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 12,5 casos por 100.000 habitantes (11,8/100.000 en la semana anterior).


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 79 años con 68,5 casos por 100.000, seguido por el grupo menores de un año y el grupo de 70-79 años con 53,4 y 30,6 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) se ha mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes. Los ingresos con códigos de gripe (J09-J11) han sido de 0,7 casos por 100.000 habitantes (0,9/100.000 en la semana anterior), mientras que los ingresos por COVID-19 (U07.1) se sitúan en 0,9 casos por 100.000 habitantes (0,5/100.000 la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 asciende hasta el 9,6% esta semana (4,7% en la semana anterior), la del virus de la gripe baja al 7,6% (12,7% en la semana anterior) y la del VRS ha sido del 1,1% (0,0% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE

	Semana 45		Semana 44		Total 2026-2027	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	230	9,6	215	4,7	1321	11,2
Influenza	197	7,6	189	12,7	1116	6,7
VRS	181	1,1	165	0,0	998	0,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 39/2026, situándose la tasa en un nivel de intensidad bajo.

Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE




En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico).

Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico).

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 115 SARS-CoV-2, 106 virus de la gripe y 2 VRS en este sistema.

De los 106 virus gripales detectados esta semana, 70 han sido tipo A, 2 A(H3), 31 A(H1)pdm09 y 3 de tipo B. Desde la semana 40/2026 se han registrado 382 detecciones de virus de la gripe, 369 (96,6%) de tipo A y 13 (3,4%) de tipo B. De los 191 virus tipo A subtipados, 43 (22,5%) han sido A(H3) y 148 (77,5%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2026-2027, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la *web del Departamento de Salud* y en los siguientes enlaces: *SiVIRA* (estatal), *Flu News* (Europa, gripe), *FluNet*, (Mundial, gripe), *OPS* (América, gripe), *CDC* (EEUU).

12 de noviembre de 2026

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones