

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

4. astea (2026ko urtarrilaren 19tik 25era)


Gripe eta bronkiolitis diagnostikoek beheranzko joera mantentzen dute, COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen duen bitartean.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 441,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (477,6/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen tasak behera egin du aurreko astearekin alderatuta eta bronkiolitisarena mantendu egin da. COVID-19aren tasa baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 56 lagin jagoleen % 69,6 baieztatu da, 11 gripe-birus eta 8 ABS detektatu direlarik, baina ez SARS-CoV-2rik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 19,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (26,3/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA eta bronkiolitis (< 2 urte)-tasak intentsitate maila baxuetan mantentzen dira, larrialdietako gripe-sindromea bezalaxe, baina azkeneko biak oinarritzko mailatik gertu.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 370 ABS, 253 gripe-birus eta 8 SARS-CoV-2 erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 441,1 kasukoa izan da (477,6/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 357,8/100.000 izan da Araban, 442,5/100.000 Bizkaian eta 477,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3717,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 64 urtetik gorenkoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1791,7 eta 516,3 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 184,1 kasukoa izan da (234,7/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek behera egin dute ESI gehienetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 4. astea	Tasa 3. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	386,9	403,9	0,96 (0,88-1,04)
Arabar Errioxako ESI	687,8	764,2	0,90 (0,67-1,21)
Barakaldo-Sestaoko ESI	435,1	412,3	1,06 (0,94-1,19)
Barrualde-Galdakaoko ESI	488,4	523,6	0,93 (0,87-1,00)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	448,7	511,4	0,88 (0,82-0,94)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	424,1	453,2	0,94 (0,84-1,04)
Uribeko ESI	353,5	363,0	0,97 (0,88-1,07)
Bidasoako ESI	429,0	486,8	0,88 (0,76-1,02)
Debararrenako ESI	455,4	541,8	0,84 (0,73-0,97)
Debagoienako ESI	511,6	479,0	1,07 (0,91-1,25)
Donostialdeako ESI	405,1	484,2	0,84 (0,78-0,90)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	618,5	608,1	1,02 (0,91-1,14)
Tolosaldeako ESI	591,4	617,7	0,96 (0,83-1,10)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 18,2 kasu 100.000 biztanleko balioraino jaitsi da (25,8/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 353,6 kasutan mantendu da (353,6/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena baxu mantentzen da 100.000 biztanleko 0,6 kasutan (0,9/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 56 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 69,6 baieztatu dira. 11 gripe-birus (5 AH1, 5 AH3 eta B motako bat) eta 8 ABS atzeman dira, baina ez SARS-CoV-2rik. 11 urtaroko koronabirus eta 8 errinobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAN eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Gripe-birusaren positibotasunak behera egin eta % 19,6an kokatu da aste honetan (% 26,5 aurreko astean). ABSren positibotasuna % 14,3raino jaitsi da (% 23,5 aurreko astean) eta SARS-CoV-2arena % 0,0koa izan da (% 1,5 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	4. astea		3. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	11	19,6	18	26,5	346	36,1
SARS-CoV-2	0	0,0	1	1,5	13	1,4
ABS	8	14,3	16	23,5	68	7,1
Metaneumobirus	2	3,6	1	1,5	5	0,6
Parainfluenza	0	0,0	2	2,9	21	2,2
Adenobirus	0	0,0	2	2,9	7	0,7
Errinobirus	8	14,3	3	4,4	176	18,4
Urtaroko CoV	11	19,6	6	8,8	46	4,8
Enterobirus	1	1,8	1	1,5	8	0,8

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 19,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (26,3/100.000 aurreko astean), 18,4/100.000 gizonetan eta 20,1/100.000 emakumeetan.

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 61,3 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 45-64 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 58,1 eta 9,6 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 1,9koa izan da 100.000 biztanleko (4,2/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 2,9koa 100.000 biztanleko (4,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,1 kasukoa 100.000 biztanleko (0,2/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 0,6koa izan da (% 0,5 aurreko astean). Gripe-birusaren positibotasuna % 12,4raino jaitsi da aste honetan (% 21,9 aurreko astean), eta ABSrena % 29,6raino igo da (% 27,2 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	4. astea		3. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	345	0,6	434	0,5	5206	1,9
Influenza	387	12,4	494	21,9	5272	29,8
ABS	355	29,6	448	27,2	4770	15,7

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoen arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIAREN zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gaingitu zen eta gaur egun tasa intentsitate maila baxuan kokatzen da.

**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**




Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuek adierazten dute atalase epidemikoa 2025/42 astean gainditu zela. Gaur egun tasak beheranzko joera du eta intentsitate maila baxuan kokatzen da.

**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gainditu zen eta aste honetan intentsitate baxuko mailan mantentzen da, oinarritzko egoeratik oso gertu.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSaren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 370 ABS, 253 gripe-birus eta 8 SARS-CoV-2 detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 253 gripe-birusetatik, 166 A motakoak izan dira, 36 A(H3), 45 A(H1)pdm09 eta 6 B motakoak. 2025/40 astetik 8235 detekzio erregistratu dira, 8208 (% 99,7) A motakoak eta 27 (% 0,3) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4275 birusetatik, 2601 (% 60,8) A(H3) eta 1674 (% 39,2) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



2026ko urtarrilak 28