

ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINTZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

19. astea (2026ko maiatzaren 4tik 10era)

Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarrizko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.


- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 227,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (165,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen, bronkiolitisaren eta COVID-19aren tasak baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 24 lagin jagoleen % 54,2 baieztatu da, SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik, baina ez gripe birusik ala ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 9,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (8,5/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarrizko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira.
- EAeko Informazio Mikrobiologikoko Sistemari, aste honetan, 7 SARS-CoV-2, 4 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira.

AIA Lehen mailako arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 227,7 kasukoa izan da (165,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 141,7/100.000 izan da Araban, 230,7/100.000 Bizkaian eta 262,7/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 2374,2 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 5-14 urtekoen adin-taldea kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1054,7 eta 305,8 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AIaekin lotutako Prozesu Arin Automugatu (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AIaren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 81,5 kasukoa izan da (60,2/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ia ESI guztietan.


AIaren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoa ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 19. astea	Tasa 18. astea
Arabako ESI	155,4	80,3
Barakaldo-Sestaoko ESI	184,6	146,9
Barrualde-Galdakaoko ESI	213,2	165,7
Bidasoako ESI	218,4	202,9
Bilbo-Basurtuko ESI	277,5	188,5
Debarrenako ESI	247,9	174,1
Debagoienako ESI	220,1	158,1
Donostialdeako ESI	251,9	205,7
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	232,8	143,0
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	285,9	198,9
Arabar Errioxako ESI	220,8	314,2
Tolosaldeako ESI	327,4	239,4
Uribeko ESI	189,7	141,1

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AIaren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 0,7 kasu 100.000 biztanleko balioan kokatu da (0,4/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 126,3 kasukoa izan da (108,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 0,2 kasutakoa (0,5/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAREN sintomak dituzten kupo jagoletako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIARako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 24 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 54,2 baieztatu dira. SARS-CoV-2 bat atzeman da, baina ez gripe-birusik ala ABSik. 7 errinobirus eta 3 urtaroko koronabirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Gripe-birusaren positibotasuna % 0,0an kokatu da aste honetan (% 0,0 aurreko astean), ABSarena (% 0,0 aurreko astean) bezalaxe. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 4,2koa izan da (% 10,5 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	19. astea		18. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	1	4,2	0	0,0	383	26,4
SARS-CoV-2	0	0	2	10,5	22	1,5
ABS	0	0	0	0	99	6,8
Metaneumobirus	1	4,2	2	10,5	56	3,9
Parainfluenza	2	8,3	0	0	54	3,7
Adenobirus	0	0	0	0	20	1,4
Errinobirus	7	29,2	5	26,3	276	19,0
Urtaroko CoV	3	12,5	0	0	94	6,5
Enterobirus	0	0	0	0	15	1,0

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratorzen direnak. AIAL tasa 9,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (8,5/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 31,0 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 14,5 eta 13,4 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 0,0koa izan da 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 0,0koa 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,1 kasukoa 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean).

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 1,4koa izan da aste honetan (% 0,0 aurreko astean), gripe-birusarena % 0,0koa (% 0,8 aurreko astean) eta ABSrena % 0,8an kokatu da (% 0,9 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	19. astea		18. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	145	1,4	133	0,0	8228	1,4
Influenza	131	0,0	127	0,8	8415	19,8
ABS	119	0,8	113	0,9	7607	14,4

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoen arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIAREN zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromean, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gainditu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gainditu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 7 SARS-CoV-2, 4 gripe-birus eta ABS bat detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 4 gripe-birusetatik, 3 A motakoak izan dira eta bat A(H1)pdm09. 2025/40 astetik 8744 detekzio erregistratu dira, 8694 (% 99,4) A motakoak eta 50 (% 0,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4630 birusetatik, 2757 (% 59,5) A(H3) eta 1873 (% 40,5) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko maiatzak 13

**Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza**