

ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINTZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

29. astea (2026ko uztailaren 13tik 19ra)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 80,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (91,8/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen, bronkiolitisaren eta COVID-19aren tasak baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 4 lagin jagoleen % 100 baieztatu da eta ez da SARS-CoV-2rik, gripe-birusik ala ABSik atzeman.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 6,8 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (7,9/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 7 SARS-CoV-2 eta ABS bat erregistratu dira, baina ez gripe-birusik.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 80,3 kasukoa izan da (91,8/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 58,5/100.000 izan da Araban, 84,6/100.000 Bizkaian eta 83,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 595,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 434,6 eta 107,5 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 21,4 kasukoa izan da (24,4/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek behera egin dute ESI gehienetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoiak ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 29. astea	Tasa 28. astea
Arabako ESI	61,9	56,4
Barakaldo-Sestaoko ESI	63,6	77,0
Barrualde-Galdakaoko ESI	95,0	96,3
Bidasoako ESI	80,9	96,3
Bilbo-Basurtuko ESI	86,6	105,3
Debararrenako ESI	76,6	104,5
Debagioenako ESI	65,1	89,9
Donostialdeako ESI	81,0	98,2
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	82,3	81,7
Goierri-Urola Garaia ESI	102,6	132,6
Arabar Errioxako ESI	144,3	178,3
Tolosaldeako ESI	74,1	120,5
Uribeko ESI	74,4	79,4

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 0,1 kasukoa da 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 28,9 kasura jaitsi da 100.000 biztanleko (46,9/100.000 aurreko astean), eta COVID-19aren tasa 100.000 biztanleko 0,1 kasutan mantentzen da.


**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIaren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIarako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 4 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 100 baieztatu dira. Ez da SARS-CoV-2rik, gripe-birusik ala ABSik atzeman, baina bai 2 adenobirus, metapneumobirus bat eta urtaroko koronabirus bat.

**AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE**



SARS-CoV-2aren positibotasuna, gripe-birusarena eta ABSarena % 0,0an mantentzen dira aste honetan.


Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE

	29. astea		28. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	0	0,0	0	0,0	383	23,8
SARS-CoV-2	0	0,0	0	0,0	25	1,6
ABS	0	0,0	0	0,0	99	6,1
Metaneumobirus	1	25,0	2	28,6	70	4,3
Parainfluenza	0	0,0	1	14,3	68	4,2
Adenobirus	2	50,0	1	14,3	39	2,4
Errinobirus	0	0,0	1	14,3	316	19,6
Urtaroko CoV	1	25,0	0	0,0	98	6,1
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	24	1,5

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean


Zaintza sindromikoa

AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 6,8 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (7,9/100.000 aurreko astean).




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen eman da 100.000 biztanleko 22,1 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen adin-taldean eta 45-64 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 7,3 eta 3,3 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetza ospitale-sarea. 2025-2026, EAE



COVID-19aren kodearekin (U07.1), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) eta gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratze-tasa 100.000 biztanleko 0,0koa izaten jarraitzen du.

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetza ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. Gripe-birusaren eta ABSren positibotasuna % 0,0an mantendu da aste honetan, eta SARS-CoV-2aren % 1,3koa izan da (% 0,0 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	29. astea		28. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	78	1,3	91	0,0	9333	1,4
Influenza	81	0,0	85	0,0	9475	17,7
ABS	77	0,0	78	0,0	8530	12,9

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbateteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 7 SARS-CoV-2 eta ABS bat erregistratu dira aste honetan, baina ez gripe-birusik.

2025/40 astetik 8780 detekzio erregistratu dira, 8724 (% 99,4) A motakoak eta 56 (% 0,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4653 birusetatik, 2764 (% 59,4) A(H3) eta 1889 (% 40,6) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko uztailak 22

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza