

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

30. astea (2026ko uztailaren 20tik 26ra)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 85,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (80,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen, bronkiolitisaren eta COVID-19aren tasak baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 12 lagin jagoleen % 33,3 baieztatu da eta ez da SARS-CoV-2rik, gripe-birusik ala ABSik atzeman.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 8,0 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (6,8/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 15 SARS-CoV-2, 7 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 85,2 kasukoa izan da (80,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 66,2/100.000 izan da Araban, 86,7/100.000 Bizkaian eta 91,7/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 675,2 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 337,6 eta 118,2 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 25,0 kasukoa izan da (21,4/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI gehienetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazioia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 30. astea	Tasa 29. astea
Arabako ESI	69,9	61,9
Barakaldo-Sestaoko ESI	79,3	63,6
Barrualde-Galdakaoko ESI	87,9	95,0
Bidasoako ESI	89,9	80,9
Bilbo-Basurtuko ESI	97,0	86,6
Debararrenako ESI	78,0	76,6
Debagioenako ESI	63,6	65,1
Donostialdeako ESI	89,2	81,0
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	85,4	82,3
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	118,1	102,6
Arabar Errioxako ESI	169,8	144,3
Tolosaldeako ESI	86,5	74,1
Uribeko ESI	67,6	74,4

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 0,3 kasukoa da 100.000 biztanleko (0,1/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 21,6 kasutan kokatu da (28,9/100.000 aurreko astean), eta COVID-19aren tasa 100.000 biztanleko 0,1 kasutan mantentzen da.


**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 12 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 33,3 baieztatu dira. Ez da SARS-CoV-2rik, gripe-birusik ala ABSik atzeman, baina bai 2 errinobirus, metapneumobirus bat eta parainfluenzae birus bat.

**AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE**



SARS-CoV-2aren positibotasuna, gripe-birusarena eta ABSarena % 0,0an mantentzen dira aste honetan.


Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE

	30. astea		29. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	0	0,0	0	0,0	383	23,6
SARS-CoV-2	0	0,0	0	0,0	25	1,5
ABS	0	0,0	0	0,0	99	6,1
Metaneumobirus	1	8,3	1	25,0	71	4,4
Parainfluenza	1	8,3	0	0,0	69	4,3
Adenobirus	0	0,0	2	50,0	39	2,4
Errinobirus	2	16,7	0	0,0	318	19,6
Urtaroko CoV	0	0,0	1	25,0	98	6,0
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	24	1,5

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean


Zaintza sindromikoa

AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 8,0 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (6,8/100.000 aurreko astean).




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen eman da 100.000 biztanleko 23,6 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen adin-taldean eta 45-64 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 14,5 eta 4,8 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



COVID-19aren kodearekin (U07.1) eta ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratze-tasa 100.000 biztanleko 0,0koa izaten jarraitzen du, eta gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) ospitaleratutakoena 100.000 biztanleko 0,1ekoa izan da (0,0/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 3,4koa izan da aste honetan (% 1,3 aurreko astean), gripe-birusarena % 2,4an kokatu da (% 0,0 aurreko astean) eta ABSren positibotasuna % 0,0an mantendu da.

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	30. astea		29. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	87	3,4	78	1,3	9420	1,4
Influenza	82	2,4	81	0,0	9557	17,5
ABS	77	0,0	77	0,0	8607	12,8

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuoak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 15 SARS-CoV-2, 7 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira aste honetan.

Aste honetan detektatutako gripe-birusetatik, 5 A motakoak izan dira eta 2 A(H3). 2025/40 astetik 8787 detekzio erregistratu dira, 8731 (% 99,4) A motakoak eta 56 (% 0,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4655 birusetatik, 2766 (% 59,4) A(H3) eta 1889 (% 40,6) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko uztailak 29

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza