

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINТZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

36. astea (2026ko abuztuaren 31tik irailaren 6ra)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira, baina azken asteetan gripearen zirkulazioaren gorakada bat eman da. COVID-19aren tasak eta SARS-CoV-2aren detekzioek ere goranzko joera dute.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 171,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (109,4/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen eta COVID-19aren tasek goranzko joera aurkezten dute; bronkiolitisaren tasa egonkor mantentzen da, ordea.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 22 lagin jagoleen % 59,1 baieztatu da. 3 gripe-birus eta 2 SARS-CoV-2 detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 8,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (7,4/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira, baina joera goranzkoa da AIAren eta gripe-sindromearen kasuan.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 98 SARS-CoV-2 eta 54 gripe-birus erregistratu dira, baina ez ABSik.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 171,2 kasukoa izan da (109,4/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 114,0/100.000 izan da Araban, 196,5/100.000 Bizkaian eta 157,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 1154,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 15-44 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 372,7 eta 196,8 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 78,0 kasukoa izan da (40,9/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI guztietan aste honetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoa ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 36. astea	Tasa 35. astea
Arabako ESI	121,8	97,9
Barakaldo-Sestaoko ESI	131,2	82,5
Barrualde-Galdakaoko ESI	206,1	116,3
Bidasoako ESI	155,4	136,2
Bilbo-Basurtuko ESI	242,1	105,9
Debararrenako ESI	174,1	118,4
Debagoienako ESI	107,0	91,5
Donostialdeako ESI	149,6	129,4
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	169,6	107,7
Goierri-Urola Garaia ESI	177,2	111,9
Arabar Errioxako ESI	254,7	237,8
Tolosaldeako ESI	162,1	122,0
Uribeko ESI	154,3	84,9

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 2,4 kasuetaraino igo da (1,0/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 36,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (28,9/100.000 aurreko astean), eta COVID-19aren tasak gora egin eta 100.000 biztanleko 3,8 kasutan kokatu da (1,4/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 22 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 59,1 baieztatu dira. 3 gripe-birus eta 2 SARS-CoV-2 atzeman dira, baina ez ABSik. 4 urtaroko koronabirus, 2 errinobirus eta 2 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMA eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 9,1ekoa izan da (%21,4 aurreko astean), gripe-birusarena % 13,6koa (% 7,1 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantendu da.


Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE

	36. astea		35. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	2	9,1	3	21,4	33	2,0
Influenza	3	13,6	1	7,1	389	23,1
ABS	0	0	0	0,0	99	5,9
Metaneumobirus	0	0	1	7,1	72	4,3
Parainfluenza	0	0	0	0,0	73	4,3
Adenobirus	1	4,5	1	7,1	41	2,4
Errinobirus	2	9,1	0	0,0	327	19,4
Urtaroko CoV	4	18,2	1	7,1	103	6,1
Enterobirus	2	9,1	0	0,0	26	1,5

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean


Zaintza sindromikoa

AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratoritzen direnak. AIAL tasa 8,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (7,4/100.000 aurreko astean).




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 36,3 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 45-64 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 23,8 eta 5,5 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearek kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 0,7 kasukoa (0,3/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 13,8raino igo da aste honetan (% 8,0 aurreko astean), gripe-birusarena % 7,1era jaitsi da (% 9,4 aurreko astean) eta ABSren positibotasuna % 0,0an mantendu da.

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	36. astea		35. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	130	13,8	100	8,0	10001	1,7
Influenza	112	7,1	96	9,4	10089	16,9
ABS	104	0,0	88	0,0	9094	12,1

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoen arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gairatu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 98 SARS-CoV-2 eta 54 gripe-birus erregistratu dira aste honetan, baina ez ABSik.

Aste honetan detektatutako 54 gripe-birusetatik, 31 A motakoak izan dira, 22 A(H3) eta bat A(H1)pdm09. 2025/40 astetik 8916 detekzio erregistratu dira, 8860 (% 99,4) A motakoak eta 56 (% 0,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4736 birusetatik, 2842 (% 60,0) A(H3) eta 1894 (% 40,0) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



2026ko irailak 9

Osakidetza

LURKO ABURUAKETA
GODIRNO BASCO

C. BILBAO, 60A