

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

39. astea (2026ko irailaren 21etik 27ra)


COVID-19aren tasak eta SARS-CoV-2aren detekzioek goran egiten jarraitzen dute. Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. Gripearen zirkulazioak gora egin du aste honetan Lehen Mailako Arretan, baina behera ospitaleetan.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 368,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (284,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen tasak, COVID-19arenak eta bronkiolitisarenak gora egin dute aste honetan.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 63 lagin jagoleen %76,2 baieztatu da. 20 SARS-CoV-2 eta 2 gripe-birus detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 11,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,1/100.000 aurreko astean).
- LMAko bronkiolitis-tasak (< 2 urte) eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira. AIAren LMAko tasak 2026-27 denboraldirako definituriko atalase-epidemikoa gurutzatu du, intentsitate maila baxuan kokatuz.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 274 SARS-CoV-2 eta 41 gripe-birus erregistratu dira, baina ez ABSik.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 368,2 kasukoa izan da (284,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 243,2/100.000 izan da Araban, 399,3/100.000 Bizkaian eta 376,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 4247,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1694,8 eta 505,6 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 156,0 kasukoa izan da (108,7 /100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI guztietan aste honetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazioa ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 39. astea	Tasa 38. astea
Arabako ESI	264,7	175,8
Barakaldo-Sestaoko ESI	373,8	281,2
Barrualde-Galdakaoko ESI	439,3	348,9
Bidasoako ESI	307,0	263,3
Bilbo-Basurtuko ESI	425,4	343,7
Debararrenako ESI	380,2	256,3
Debagioenako ESI	317,8	212,4
Donostialdeako ESI	360,8	259,0
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	402,4	347,3
Goierri-Urola Garaia ESI	448,6	317,0
Arabar Errioxako ESI	424,6	407,6
Tolosaldeako ESI	389,1	299,6
Uribeko ESI	285,0	251,9

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 4,5 kasuetara igo da (3,5/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 191,2 kasuetara igo da (155,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 17,6 kasuetara (12,4 /100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 63 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 76,2 baieztatu dira. 20 SARS-CoV-2 eta 2 gripe-birus atzeman dira, baina ez ABSik. 23 errinobirus eta 4 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMA eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 17,8koa izan da (% 14,3 aurreko astean), gripe-birusarena % 4,4koa (% 14,3 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantendu da.


Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE

	39. astea		38. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	20	31,7	8	17,8	64	3,5
Influenza	2	3,2	2	4,4	396	21,9
ABS	0	0,0	0	0,0	99	5,5
Metaneumobirus	0	0,0	0	0,0	72	4,0
Parainfluenza	0	0,0	4	8,9	82	4,5
Adenobirus	1	1,6	2	4,4	44	2,4
Errinobirus	23	36,5	13	28,9	364	20,1
Urtaroko CoV	1	1,6	6	13,3	112	6,2
Enterobirus	4	6,3	1	2,2	32	1,8

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean


Zaintza sindromikoa

AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratoritzen direnak. AIAL tasa 11,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,1/100.000 aurreko astean).




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 65,3 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 32,9 eta 18,4 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearek kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,5/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 1,8 kasukoa (0,9/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 21,7raino igo da aste honetan (% 12,4aurreko astean), gripe-birusarena % 1,3raino jaitsi da (% 8,1 aurreko astean) eta ABSren positibotasuna % 0,0an mantendu da.

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	39. astea		38. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	189	21,7	193	12,4	10543	2,4
Influenza	158	1,3	185	8,1	10577	16,4
ABS	145	0,0	170	0,0	9543	11,5

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gairitu da, 2026/08 astean oinarritzko mailara bueltatuz. Aste honetan (2026/39), 2026-27 denboraldirako ezarritako atalase-epidemikoa gairitu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn


Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 274 SARS-CoV-2 eta 41 gripe-birus erregistratu dira aste honetan, baina ez ABSik.

Aste honetan detektatutako 41 gripe-birusetatik, 25 A motakoak izan dira, 12 A(H3), 2 A(H1)pdm09 eta beste 2 B motakoa. 2025/40 astetik 9087 detekzio erregistratu dira, 9027 (% 99,3) A motakoak eta 60 (% 0,7) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4864 birusetatik, 2962 (% 60,9) A(H3) eta 1902 (% 39,1) A(H1)pdm09 izan dira.

Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Mikrobiologia Laborategiak egindako txostenaren arabera, SARS-CoV-2ren jardura nabarmen handitu da gure inguruan. 2026ko ekainetik irailera bitartean 1179 infekzio kasu detektatu dira Euskadi osoan, eta 298 andui sekuentziatu dira. Aztertutako anduietatik ia guztiak XFG aldaerari eta haren ondorengoei dagozkie, eta ST.1 leinua nabarmentzen da, 109 anduirekin (guztizkoaren % 37).

Munduko egoerak erakusten du SARS CoV-2ren jardura gero eta handiagoa dela maila globalean, bereziki uda amaieran, eta intereseko aldaera bat (BA.2.86) eta zaintzapeko hiru aldaera (NB.1.8, XFG, BA.3.2) identifikatzen dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko irailak 30

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza