

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2026-2027 denboraldia
(2026ko irailaren 28tik 2027ko urriaren 3ra)

40. astea (2026ko irailaren 28tik urriaren 4ra)

COVID-19aren tasak gora egiten jarraitzen du Lehen Mailako Arretan, baina behera egin du ospitaleetan. Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira.


- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 352,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (368,2/100.000 aurreko astean).
- COVID-19aren eta bronkiolitisaren tasek gora egin dute aste honetan LMAn, baina gripe-sindromearenak behera egin du.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 54 lagin jagoleen %74,1 baieztatu da. 11 SARS-CoV-2 detektatu dira, baina ez gripe-birusik ala ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,4/100.000 aurreko astean).
- LMAko bronkiolitis-tasak (< 2 urte) eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira. AIAren LMAko tasak atalase-epidemikoa pasa den astean gurutatu zuen, gaur egun intentsitate maila baxuan kokatuz.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 279 SARS-CoV-2, 40 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira.

AIA Lehen mailako arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 352,4 kasukoa izan da (368,2/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 243,2/100.000 izan da Araban, 399,3/100.000 Bizkaian eta 376,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3983,2 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 79 urtetik gorakoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1821,4 eta 400,0 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 151,3 kasukoa izan da (156,0/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, aste honetan, tasek gora egin dute ESI batzuetan eta behera besteetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoa ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE

ESI	Tasa 40. astea	Tasa 39. astea
Arabako ESI	271,3	264,7
Barakaldo-Sestaoko ESI	334,6	373,8
Barrualde-Galdakaoko ESI	401,9	439,3
Bidasoako ESI	356,8	307,0
Bilbo-Basurtuko ESI	389,8	425,4
Debararrenako ESI	396,3	380,2
Debagoienako ESI	323,1	317,8
Donostialdeako ESI	351,2	360,8
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	371,0	402,4
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	409,3	448,6
Arabar Errioxako ESI	494,3	424,6
Tolosaldeako ESI	349,6	389,1
Uribeko ESI	291,0	285,0

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jaqolettaren metodologia](#)

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 4,0 kasuetara igo da (4,5/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 264,0 kasuetara igo da (191,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 20,3 kasuetara (17,6/100.000 aurreko astean).


**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE**



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 54 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 74,1 baieztatu dira. 11 SARS-CoV-2 atzeman dira, baina ez gripe-birus ala ABSik. 20 errinobirus, 5 urtaroko koronabirus, 4 parainfluenzae birus eta 3 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMA eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2026-2027, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 20,4koa izan da (% 31,7 aurreko astean); gripe-birusarena eta ABSrena, aldiz, % 0,0koa (% 3,2 eta % 0,0 aurreko astean, hurrenez hurren).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2026-2027, EAE


	40. astea		39. astea		2026-2027 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	11	20,4	20	31,7	11	20,4
Influenza	0	0	2	3,2	0	0
ABS	0	0	0	0,0	0	0
Metaneumobirus	0	0	0	0,0	0	0
Parainfluenza	4	7,4	0	0,0	4	7,4
Adenobirus	0	0	1	1,6	0	0
Errinobirus	20	37	23	36,5	20	37
Urtaroko CoV	5	9,3	1	1,6	5	9,3
Enterobirus	3	5,6	4	6,3	3	5,6

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik erarortzen direnak. AIAL tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,4/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 79 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 74,5 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 70-79 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 38,2 eta 27,1 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearek kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,1/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 1,4 kasukoa (1,8/100.000 aurreko astean).

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 16,2raino jaitsi da aste honetan (% 21,7 aurreko astean), gripe-birusarena % 4,9ra igo da (% 1,3 aurreko astean) eta ABSrena % 0,6an kokatu da (% 0,0 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE

	40. astea		39. astea		2026-2027 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	234	16,2	189	21,7	234	16,2
Influenza	206	4,9	158	1,3	206	4,9
ABS	176	0,6	145	0,0	176	0,6

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuoak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbateteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2026/39 astean gaingitu zen, gaur egun intentsitate baxuko mailan kokatzen delarik.

**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE**




Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da.

**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da, baina goranzko joera argia duelarik.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 279 SARS-CoV-2, 40 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira aste honetan.

Aste honetan detektatutako 40 gripe-birusetatik, 14 A motakoak izan dira, 14 A(H3), 8 A(H1)pdm09 eta 4 B motakoak. 2026/40 astetik 40 detekzio erregistratu dira, 36 (% 90,0) A motakoak eta 4 (% 10,0) B motakoak. Azpitipatutako A motako 22 birusetatik, 14 (% 63,6) A(H3) eta 8 (% 36,4) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2026-2027, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko urriak 7

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza