

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINТZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2026-2027 denboraldia
(2026ko irailaren 28tik 2027ko urriaren 3ra)

41. astea (2026ko urriaren 5etik 11ra)


COVID-19aren tasak eta SARS-CoV-2aren detekzioek behera egin dute aste honetan. Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 299,5 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (352,4/100.000 aurreko astean).
- COVID-19aren eta bronkiolitisaren tasek behera egin dute aste honetan LMA-n, baina gripe-sindromearenak gora egin du.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 47 lagin jagoleen % 72,3 baieztatu da. 10 SARS-CoV-2 eta 3 gripe-birus detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 11,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (12,9/100.000 aurreko astean).
- LMAko bronkiolitis-tasak (< 2 urte) eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira. AIAren LMAko tasa, zeinak atalase-epidemikoa gurutzatu zuen 2026/39 astean, atalasearen azpitik kokatu da berriro.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 233 SARS-CoV-2, 53 gripe-birus eta 3 ABS erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 299,5 kasukoa izan da (352,4/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 211,4/100.000 izan da Araban, 310,8/100.000 Bizkaian eta 322,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3235,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 79 urtetik gorakoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1690,5 eta 350,2 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 117,6 kasukoa izan da (151,3/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, aste honetan, tasek behera egin dute ia ESI guztietan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE

ESI	Tasa 41. astea	Tasa 40. astea
Arabako ESI	224,9	271,3
Barakaldo-Sestaoko ESI	278,4	334,6
Barrualde-Galdakaoko ESI	310,5	401,9
Bidasoako ESI	313,0	356,8
Bilbo-Basurtuko ESI	348,4	389,8
Debararrenako ESI	317,0	396,3
Debagioenako ESI	275,2	323,1
Donostialdeako ESI	307,3	351,2
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	324,1	371,0
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	349,5	409,3
Arabar Errioxako ESI	494,3	494,3
Tolosaldeako ESI	341,9	349,6
Uribeko ESI	237,9	291,0

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jaqolettaren metodologia](#)

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 4,7 kasuetara igo da (4,0/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 218,7 kasukoa izan da (264,0/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 16,4 kasuetara jaitsi da (20,3/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 47 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 72,3 baieztatu dira. 10 SARS-CoV-2 eta 3 gripe-birus atzeman dira, baina ez ABSik. 12 errinobirus, 5 urtaroko koronabirus eta 4 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMA eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2026-2027, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 21,3koa izan da (% 20,4 aurreko astean), gripe-birusarena % 6,4koa (% 0,0 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantentzen da.

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2026-2027, EAE


	41. astea		40. astea		2026-2027 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	10	21,3	11	20,4	21	20,8
Influenza	3	6,4	0	0	3	3,0
ABS	0	0	0	0	0	0
Metaneumobirus	0	0	0	0	0	0
Parainfluenza	0	0	4	7,4	4	4,0
Adenobirus	0	0	0	0	0	0
Errinobirus	12	25,5	20	37,0	32	31,7
Urtaroko CoV	5	10,6	5	9,3	10	9,9
Enterobirus	4	8,5	3	5,6	7	6,9

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik erarortzen direnak. AIAL tasa 11,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (12,9/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 79 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 66,7 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 70-79 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 30,5 eta 28,0 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearek kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,4/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 1,2 kasukoa (1,4/100.000 aurreko astean).

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 10,2raino jaitsi da aste honetan (% 16,2 aurreko astean), gripe-birusarena % 5,1ean kokatu da (% 1,3 aurreko astean) eta ABSrena % 1,3an (% 0,6 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE

	41. astea		40. astea		2026-2027 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	226	10,2	234	16,2	460	13,3
Influenza	176	5,1	206	4,9	382	5,0
ABS	157	1,3	176	0,6	333	0,9

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2026/39 astean gaingitu zen, gaur egun tasa berriro ere atalase epidemiokoaren azpitik kokatu delarik.

**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE**




Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da.

**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da, baina goranzko joera argia duelarik.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 233 SARS-CoV-2, 53 gripe-birus eta 3 ABS erregistratu dira aste honetan.

Aste honetan detektatutako 53 gripe-birusetatik, 38 A motakoak izan dira, 4 A(H3), 7 A(H1)pdm09 eta 4 B motakoak. 2026/40 astetik 93 detekzio erregistratu dira, 85 (% 91,4) A motakoak eta 8 (% 8,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 33 birusetatik, 18 (% 54,5) A(H3) eta 15 (% 45,5) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2026-2027, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko urriak 14

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza