ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINTZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2026-2027 denboraldia

(2026ko irailaren 28tik 2027ko urriaren 3ra)

42. astea (2026ko urriaren 12tik 18ra)

SARS-CoV-2aren detekzioek behera egin dute aste honetan. Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarrizko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira.


- ***Aste honek jaiegun bat dauka, eta honek eragin zuzena du datuen baliozkotasunean, bereziki Lehen Mailako Arretatik jasotako datuetan.***
- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 238,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (299,5/100.000 aurreko astean).
- COVID-19aren eta gripe-sindromearen tasek behera egin dute aste honetan LMAn, baina bronkiolitisaren gora egin du.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 24 lagin jagoleen % 66,7 baieztatu da. 4 SARS-CoV-2 eta gripe-birus bat detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 12,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,9/100.000 aurreko astean).
- LMAko bronkiolitis-tasak (< 2 urte) eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarrizko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira. AIAren LMAko tasa, zeinak atalase-epidemikoa gurutzatu zuen 2026/39 astean, atalasearen azpitik kokatu da berriro.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 203 SARS-CoV-2, 54 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira.

AIA Lehen mailako arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAren intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 238,2 kasukoa izan da (299,5/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 181,5/100.000 izan da Araban, 241,1/100.000 Bizkaian eta 259,9/100.000 Gipuzkoan.

AIAren intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arreta-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAren tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3143,8 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 79 urtetik gorakoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1423,6 eta 287,1 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



AIAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AIAren sintomaren bat duen *Sukarra*[1]) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 87,2 kasukoa izan da (117,6/100.000 aurreko astean).

AIArekin erlazionaturik irekitako PAAen tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, aste honetan, tasek behera egin dute ESI guztietan.


AIAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE

ESI	Tasa 42. astea	Tasa 41. astea
Arabako ESI	196,8	224,9
Barakaldo-Sestaoko ESI	217,6	278,4
Barrualde-Galdakaoko ESI	246,0	310,5
Bidasoako ESI	242,2	313,0
Bilbo-Basurtuko ESI	272,6	348,4
Debabarrenako ESI	239,2	317,0
Debagoienako ESI	224,2	275,2
Donostialdeako ESI	259,3	307,3
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	237,9	324,1
Goierri-Urola Garaiako ESI	256,7	349,5
Arabar Errioxako ESI	335,1	494,3
Tolosaldeako ESI	275,7	341,9
Uribeko ESI	182,5	237,9

[1] Informazio gehiagorako kontsultatu *AIAaren jagoletzaren metodologia*

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 3,8 kasuetara jaitsi da (4,7/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 241,3 kasukoa izan da (218,7/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 9,2 kasuetara jaitsi da (16,4 /100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 24 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 66,7 baieztatu dira. 4 SARS-CoV-2 eta gripe-birus bat atzeman dira, baina ez ABSik. 5 errinobirus, 2 parainfluenza birus eta 2 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2026-2027, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 16,7koa izan da (% 21,3 aurreko astean), gripe-birusarena % 4,2koa (% 6,4 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantentzen da.

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2026-2027, EAE


	42. astea		41. astea		2026-2027 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	4	16,7	10	21,3	25	20,0
Influenza	1	4,2	3	6,4	4	3,2
ABS	0	0	0	0	0	0
Metaneumobirus	0	0	0	0	0	0
Parainfluenza	2	8,3	0	0	6	4,8
Adenobirus	1	4,2	0	0	1	0,8
Errinobirus	5	20,8	12	25,5	37	29,6
Urtaroko CoV	1	4,2	5	10,6	11	8,8
Enterobirus	2	8,3	4	8,5	9	7,2

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIAren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 12,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,9/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 79 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 71,5 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 70-79 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 38,2 eta 27,1 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearen kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 1,4 kasukoa (1,2/100.000 aurreko astean).

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 12,4raino igo da aste honetan (% 10,2 aurreko astean), gripe-birusarena % 5,3an kokatu da (% 5,1 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an (% 1,3 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE

	42. astea		41. astea		2026-2027 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	225	12,4	226	10,2	685	13,0
Influenza	190	5,3	176	5,1	572	5,1
ABS	174	0,0	157	1,3	507	0,6

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2026/39 astean gainditu zen, gaur egun tasa berriro ere atalase epidemiokoaren azpitik kokatu delarik.

AIAren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Gripe-sindromean, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da.

Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da, baina goranzko joera argia duelarik.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 203 SARS-CoV-2, 54 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira aste honetan.

Aste honetan detektatutako 54 gripe-birusetatik, 36 A motakoak izan dira, 2 A(H3) eta 16 A(H1)pdm09. 2026/40 astetik 147 detekzio erregistratu dira, 139 (% 94,6) A motakoak eta 8 (% 5,4) B motakoak. Azpitipatutako A motako 64 birusetatik, 25 (% 35,9) A(H3) eta 41 (% 64,1) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2026-2027, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago *Osasun Saileko webgunean* eta ondorengo esteka hauetan: *SiVIRA* (estatukoa), *Flu News* (Europa, gripea), *FluNet*, (Mundua, gripe), *OPS* (Amerika, gripea), *CDC* (AEB).

2026ko urriak 21

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza