ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINTZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2026-2027 denboraldia

(2026ko irailaren 28tik 2027ko urriaren 3ra)

44. astea (2026ko urriaren 26tik azaroaren 1era)

COVD-19aren tasek behera egiten jarraitzen dute aste honetan. Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarrizko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira.


- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 280,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (299,7/100.000 aurreko astean).
- LMAn, gripe-sindromearen, COVID-19aren eta bronkiolitisaren tasak aurreko asteko balioen antzekoetan mantendu dira.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 48 lagin jagoleen % 58,3 baieztatu da. 6 SARS-CoV-2 eta 4 gripe-birus detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 11,8 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (10,7/100.000 aurreko astean).
- LMAko bronkiolitis-tasak (< 2 urte) eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarrizko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira. AIAren LMAko tasa, zeinak atalase-epidemikoa gurutzatu zuen 2026/39 astean, justu atalasearen azpian dago.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 95 SARS-CoV-2 eta 75 gripe-birus erregistratu dira, baina ez ABSik.

AIA Lehen mailako arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAren intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 280,4 kasukoa izan da (299,7/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 202,3/100.000 izan da Araban, 298,1/100.000 Bizkaian eta 288,5/100.000 Gipuzkoan.

AIAren intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arreta-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAren tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3334,6 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 79 urtetik gorakoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1697,5 eta 296,1 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



AIAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AIAren sintomaren bat duen *Sukarra*[1]) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 102,7 kasukoa izan da (111,9/100.000 aurreko astean).

AIArekin erlazionaturik irekitako PAAen tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, aste honetan, tasek behera egin dute ESI gehienetan.


AIAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE

ESI	Tasa 44. astea	Tasa 43. astea
Arabako ESI	212,9	245,5
Barakaldo-Sestaoko ESI	275,3	278,4
Barrualde-Galdakaoko ESI	310,8	332,8
Bidasoako ESI	215,1	264,1
Bilbo-Basurtuko ESI	328,7	365,5
Debabarrenako ESI	287,8	303,1
Debagoienako ESI	230,4	259,8
Donostialdeako ESI	283,9	283,6
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	289,6	339,6
Goierri-Urola Garaiako ESI	347,4	321,6
Arabar Errioxako ESI	527,9	418,9
Tolosaldeako ESI	292,6	332,7
Uribeko ESI	229,3	228,0

[1] Informazio gehiagorako kontsultatu *AIAaren jagoletzaren metodologia*

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 5,0 kasuetan mantendu da (5,2/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 241,3 kasukoa izan da (256,4/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 8,1 kasukoa (8,3/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 48 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 58,3 baieztatu dira. 6 SARS-CoV-2 eta 4 gripe-birus atzeman dira, baina ez ABSik. 11 errinobirus, 4 parainfluenza birus, 3 urtaroko koronabirus eta 3 enterobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2026-2027, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 12,5ekoa izan da (% 11,8 aurreko astean), gripe-birusarena % 8,3koa (% 5,9 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantentzen da.

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2026-2027, EAE


	44. astea		43. astea		2026-2027 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	6	12,5	4	11,8	35	16,9
Influenza	4	8,3	2	5,9	10	4,8
ABS	0	0	0	0	0	0
Metaneumobirus	1	2,1	0	0	1	0,5
Parainfluenza	4	8,3	3	8,8	13	6,3
Adenobirus	0	0	3	8,8	4	1,9
Errinobirus	11	22,9	7	20,6	55	26,6
Urtaroko CoV	3	6,2	1	2,9	15	7,2
Enterobirus	3	6,2	1	2,9	13	6,3

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIAren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 11,8 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (10,7/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 79 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 63,1 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 70-79 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 45,8 eta 26,2 kasurekin, hurrenez hurren.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearen kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 0,5 kasukoa (1,1/100.000 aurreko astean).

Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 4,7raino jaitsi da aste honetan (% 14,1 aurreko astean), gripe-birusarena % 12,7ra igo da (% 4,4 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0koa izan da (% 0,7 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, EAE

	44. astea		43. astea		2026-2027 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	215	4,7	191	14,1	1091	11,5
Influenza	189	12,7	158	4,4	919	6,5
ABS	165	0,0	144	0,7	817	0,5

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2026-2027, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2026/39 astean gainditu zen, gaur egun tasa atalase epidemiokoaren azpian kokatzen delarik.

AIAren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Gripe-sindromean, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da.

Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, tasa oinarrizko intentsitate mailan (inter epidemikoa) mantentzen da, baina goranzko joera argia duelarik.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2026-2027, EAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 95 SARS-CoV-2 eta 75 gripe-birus erregistratu dira aste honetan, baina ez ABSik.

Aste honetan detektatutako 75 gripe-birusetatik, 48 A motakoak izan dira, 5 A(H3) eta 22 A(H1)pdm09. 2026/40 astetik 276 detekzio erregistratu dira, 266 (% 96,4) A motakoak eta 10 (% 3,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 149 birusetatik, 40 (% 26,8) A(H3) eta 109 (% 73,2) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2026-2027, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago *Osasun Saileko webgunean* eta ondorengo esteka hauetan: *SiVIRA* (estatukoa), *Flu News* (Europa, gripea), *FluNet*, (Mundua, gripe), *OPS* (Amerika, gripea), *CDC* (AEB).

2026ko azaroak 4

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza