

# CALENDARIO VACUNAL POBLACIÓN ADULTA 2020. CAPV

VACUNAS	Nacido/as a partir de 1981 Sin vacunación en la infancia	Nacido/as entre 1980 y 1970 Sin vacunación en la infancia	Nacido/as antes de 1970 Menores de 65 años	≥ 65 años
Tétanos-Difteria (Td)	No vacunado/as completar 5 dosis / 1 dosis de recuerdo a los 65 años con calendario infantil completo 0-1-12 meses-10 años-10 años			
Tosferina (dTpa)	1 dosis en mujeres embarazadas, en cada embarazo		Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos	
Sarampión-Rubéola-Parotiditis	2 dosis (valorar contraindicaciones)			
Varicela	2 dosis (susceptibles seronegativos con alto riesgo de contagio)			
Hepatitis B	3 dosis	3 dosis Tto hepatotóxico, Insuf. renal estadio 4 y 5, Enf.hepática crónica, Alcoholismo crónico, Trasplante de órgano sólido, Trasplante de progenitores hematopoyéticos, Receptores de hemoderivados, Contactos de un caso, UDVP, VIH, Múltiples contactos sexuales, Hombres sexo con hombres, Viaje a país de alta endemia.		
Hepatitis A	2 dosis Tratamiento hepatotóxico, Insuficiencia renal estadio 4 y 5, Enfermedad hepática crónica, Alcoholismo crónico, Receptores de hemoderivados, Contactos de un caso, VIH, UDVP, Hombres Sexo con Hombres, Viaje a país de alta endemia.			
Papiloma humano	3 dosis mujeres nacidas desde 1995	Mujeres menores de 45 años en tratamiento con azatioprina. Hombres y mujeres menores de 45 años en VIH, en prostitución, HSH, algunas inmunodeficiencias. Mujeres con zidovudina		
Meningococo ACWY	1 dosis (menores de 26 años)	2 dosis en inmunodeficiencias, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab, asplenia, trasplante de progenitores hematopoyéticos. 1 dosis en antecedente de EMI		
Meningococo B	2 dosis Asplenia, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab, enfermedad meningocócica invasiva previa.			
Haemophilus influenzae b (Hib)	1 dosis Asplenia, tratamiento con eculizumab, trasplante de progenitores hematopoyéticos.			
Neumococo 23v	1 dosis en enfermedad hepática, implantes cocleares, fístula LCR, enfermedad cardiovascular, EPOC, diabetes, VIH, tratamientos..), trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, asplenia, enfermedad renal estadio 4 y 5.		2 dosis en inmunosupresión (primarias, VIH, tratamientos..), trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, asplenia, enfermedad renal estadio 4 y 5.	
Neumococo 13v	1 dosis Inmunodeficiencias, asplenia, insuficiencia renal estadio 4 y 5, cirrosis hepática, implantes cocleares, fístula LCR, trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, Down.			
Gripe	1 dosis anual Embarazo, inmunodepresión, asplenia, enfermedad renal, cardiovascular, respiratoria, inflamatorias, enfermedad hepática, diabetes mellitus, implantes cocleares, fístulas LCR, convivientes y cuidadores de inmunodeprimidos, obesidad mórbida, Down, celiacía, alcoholismo..			1 dosis anual

Para toda la población

Para población que presenta algún factor de riesgo

## VACUNACIÓN EN PERSONAS VIAJERAS A PAISES DE ALTA ENDEMIAS

Td	Triple Vírica	Polio	Rabia	Hepatitis A	Hepatitis B	Fiebre Tifoidea	Cólera	Encefalitis Japonesa	Fiebre Amarilla	Encefalitis centroeuropea	Meningococo ACWY
Financiadas. Vacunación en el centro de salud						No financiadas			En el centro de vacunación Internacional		

### PAUTA SECUENCIAL FRENTE A NEUMOCOCO: VNC13 + VNP23

<b>No vacunados previamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empezar con VNC13: 1 dosis</li> <li>Dejar un intervalo óptimo 12 meses (mínimo 8 semanas)</li> <li>Administrar 1 dosis de VNP23 (2 dosis en asplenia e inmunosupresión intervalo mínimo 5 años)</li> <li>Administrar otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23)</li> <li>No superar un máximo de 3 dosis de VNP23</li> </ul>	<b>vacunados previamente con VNC13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 dosis VNP23 intervalo óptimo 12 meses (mínimo 8 semanas)</li> <li>En asplenia e inmunosupresión administrar otra dosis VNP23 intervalo mínimo 5 años</li> <li>Otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23)</li> <li>No superar un máximo de 3 dosis de VNP23</li> </ul>
<b>vacunados previamente con VNP23</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 dosis VNC13 intervalo mínimo 12 meses</li> <li>En asplenia e inmunosupresión administrar otra dosis VNP23 intervalo óptimo 12 meses (mínimo 8 semanas) y 5 años con VNP23 anterior</li> <li>Administrar otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23)</li> <li>No superar un máximo de 3 dosis de VNP23</li> </ul>	<b>vacunados previamente con VNC13 y VNP23</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En asplenia e inmunosupresión administrar otra dosis VNP23 intervalo mínimo 5 años</li> <li>Otra dosis VNP23 cuando cumplan 65 años (intervalo mínimo 5 años con VNP23)</li> <li>No superar un máximo de 3 dosis de VNP23</li> </ul>

## INACTIVADAS

**Sarampión-Rubéola-Parotiditis (TV)**  
Priorix® / MMRVaxPro  
jeringa con disolvente precargado + 1 vial liofilizado  
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja

Contraindicada en: embarazo y situaciones de inmunosupresión




**Varicela**  
VARILRIX® / VARIVAX®  
jeringa con disolvente precargado + 1 vial liofilizado  
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja


Contraindicada en: embarazo y situaciones de inmunosupresión



**Hepatitis A**  
HAVRIX 1440®/ VAQTA 50®  
Jeringa precargada. Vial




**Hepatitis B adyuvada (hemodializados)**  
FENDRIX®  
Jeringa precargada. No reconstituir




**Meningococo B**  
BEXSERO®/ TRUMENBA®  
Jeringa precargada. No reconstituir



**Hepatitis B**  
HBVaxPro 10®/ Engerix B 20®  
Jeringa precargada. No reconstituir



**Neumococo conjugada 13v**  
PREVENAR 13®  
Jeringa precargada. No reconstituir




**Difteria-Tétanos (Td)**  
DIFTAVAX® / diTeBooster®  
Jeringa precargada. No reconstituir



**Hepatitis A-B**  
TWINRIX®  
Jeringa precargada



**Haemophilus influenzae b**  
HIBERIX®  
Jeringa precargada. No reconstituir



**Meningococo ACWY**  
NIMENRIX® / MENVEO®  
Jeringa/ vial con disolvente + 1 vial liofilizado.  
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja




**Difteria-Tétanos- Tosferina (dTpa)**  
BOOSTRIX®  
Jeringa precargada. No reconstituir



**Papiloma**  
GARDASIL 9®  
Jeringa precargada. No reconstituir



IG	Vacuna inactivada	Ninguno
Vacuna inactivada	IG	Ninguno
IG	Vacuna atenuada	3-11 mes según IG
Vacuna atenuada	IG	2 semanas



Vacuna inactivada	Vacuna inactivada	Ninguno
Vacuna inactivada	Vacuna atenuada	Ninguno
Vacuna atenuada	Vacuna atenuada	4 semanas



Osakidetza

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD