



11.11.1 ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN NO VACUNADA O SIN VACUNACIÓN DOCUMENTADA

2025	DOSIS A ADMINISTRAR DESDE LA CAPTACIÓN							
	6 meses	7-11 meses	1-2 años	3-5 años	6-7 años	8-9 años	10-14 años	
DTPa-VHB-VPI-Hib	Calendario	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹			
DTPa-VPI/Td					1 dosis ²	4 dosis ²	4 dosis ²	
VPI							3 dosis ³	
Men C		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis		
Men B		3 dosis	3 dosis	2 dosis Nac desde 2023				
VNC		3 dosis	2 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis Nac desde 2015	
Hepatitis B						3 dosis	3 dosis	
TV				1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	
Varicela				1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	
Gripe			1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual			
Papiloma								1 dosis
Men ACWY								1 dosis ⁴
CONTINUAR CALENDARIO								

¹ Utilizar presentación Hexavalente hasta 7 años; ² vacuna tetravalente hasta 13 años. A partir de 14 años usar Td /incluir una dosis dTpa; ³ En los casos que tengan que utilizar Td (> 13 a); ⁴ equivale a dosis de 12 años;

	INTERVALOS MÍNIMOS		
	Entre 1ª y 2ª dosis	Entre 2ª y 3ª dosis	Entre dosis recuerdo
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 semanas	6 meses	6 meses
Td	4 semanas	6 meses	12 meses
dTpa			6 meses de una dosis previa de vacuna que contenga tétanos
VPI	4 semanas	6 meses	
Hib	4 semanas	4 semanas	
Men C	8 semanas		
Men B (4cMenB)	8 semanas (< 2 años) 4 semanas (≥ 2 años)		2-12 meses (según edad)
VNC	4 semanas (pauta 3+1) 8 semanas (12-24 m)	8 semanas en > 1 año 6 meses en ≤ 1 año	
VHB	4 semanas	8 semanas*	
TV	4 semanas		

** Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas