



11.11.2. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN DE 7-10 meses CON VACUNACIÓN DOCUMENTADA

Vacuna	No dosis previas	Actuación
Vacuna que contiene tétanos	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente(intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
Polio autóctonos	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente(intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
Polio extranjeros	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI (Hexavalente/Tetavalente/monovalente) intervalo mínimo intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	≥ 5 (al menos 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ninguna
	≥ 2 (VPOb ó 1 VPI+1 VPO)	Administrar 2 dosis vacuna que contenga VPI intervalo mínimo de 4 meses (Hexavalente/Tetavalente/monovalente)
Vacuna que contiene Hib	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	1	Administrar 2 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente(intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
Men C	0	1 dosis
	1 ó 2	Ninguna
Vacuna que contiene Hepatitis B	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
VNC	0	Administrar 3 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
Men B	0	Administrar 3 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas entre 1ª y 2ª; 2 meses entre 2ª y 3ª y a partir de 12 meses de edad)
	2	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 2 meses de la 2ª y a partir de 12 meses de edad)

Después seguirá el Calendario de Vacunación

Vacunas: hexavalente DTPa-VPI-VHB-Hib [hasta 7 años](#) Tetavalente DTPa-VPI [hasta 13 años](#) Monovalentes VPI, VHB
 VPOb vacuna de polio oral bivalente VPI vacuna de polio inactivada trivalente