



11.11.4. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN DE 16-23 meses CON VACUNACIÓN DOCUMENTADA

Vacuna	No dosis previas	Actuación
Vacuna que contiene tétanos	0	Administrar 3 dosis vacuna dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Polio autóctonos	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetravalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Polio extranjeros	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI (Hexavalente/Tetravalente/monovalente) intervalo mínimo intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	≥ 5 (al menos 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ninguna
	≥ 2 (VPOb ó 1 VPI+1 VPO)	Administrar 2 dosis vacuna que contenga VPI intervalo mínimo de 4 meses (Hexavalente/Tetravalente/monovalente)
Vacuna que contiene Hib	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	1	Administrar 2 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	2	Administrar 1 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna que contenga Hib (Hexavalente/monovalente) intervalo mínimo 6 meses de la 3ª
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Men C/ Men ACWY	0	1 dosis Men C
	1 ó 2 (última con < 12 meses edad)	1 dosis Men C
	1 ó 2 (última con ≥ 12 meses edad)	Ninguna
Vacuna que contiene Hepatitis B	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
VNC	0	Administrar 3 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna VNC15 (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Men B Nacidos desde 2023	0	Administrar 3 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas entre 1ª y 2ª y 12 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas entre 1ª y 2ª y 12 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 12 meses de la 2ª y a partir de 12 meses de edad)
Triple Vírica	0	Administrar 1 dosis
	1	2ª dosis según calendario
	2	Ninguna
Varicela	0	Administrar 1 dosis
	1	2ª dosis según calendario
	2	Ninguna

Después seguirá el Calendario de Vacunación

Vacunas: hexavalente DTPa-VPI-VHB-Hib **hasta 7 años**
VPOb vacuna de polio oral bivalente

Tetravalente DTPa-VPI **hasta 13 años**
VPI vacuna de polio inactivada trivalente

Monovalentes VPI, VHB