



11.11.5. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN DE 2-3 años CON VACUNACIÓN DOCUMENTADA

Vacuna	No dosis previas	Actuación
Vacuna que contiene tétanos	0	Administrar 3 dosis vacuna hexavalente/ tetavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna hexavalente/ tetavalente (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetavalente (intervalo mínimo de 6 meses entre 2ª y 3ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna hexavalente/ tetavalente (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Polio autóctonos	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Polio extranjeros	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	≥ 5 (al menos 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ninguna
	≥ 2 (VPOb ó 1 VPI+1 VPO)	Completar 2 dosis vacuna que contenga VPI intervalo mínimo de 4 meses
Vacuna que contiene Hib	0	Administrar 1 dosis vacuna que contenga Hib .
	≥1 si última dosis con < 11 meses de edad	Administrar 1 dosis vacuna que contenga Hib
	≥1 si última dosis con > 11 meses de edad	Ninguna
Men C/ Men ACWY	0	1 dosis Men C
	1 ó 2 (última con < 12 meses edad)	1 dosis Men C
	1 ó 2 (última con ≥ 12 meses edad)	Ninguna
Vacuna que contiene Hepatitis B	0	Administrar 3 dosis Vacuna que contenga Hepatitis B (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis Vacuna que contenga Hepatitis B (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 2 dosis Vacuna que contenga Hepatitis B (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
VNC	0	Administrar 1 dosis
	≥ 1 (última con < 12 meses)	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 2 meses de la última)
	≥ 1 (última con ≥ 12 meses edad)	Ninguna
Men B Nacidos desde 2023	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2 (con < 2 años edad)	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 12 meses de la 2ª)
Triple Vírica	0	Administrar 1 dosis
	1	2ª dosis según calendario (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
Varicela	0	Administrar 1 dosis
	1	2ª dosis según calendario (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna

Después seguirá el Calendario de Vacunación

Vacunas: hexavalente DTPa-VPI-VHB-Hib [hasta 7 años](#) Tetavalente DTPa-VPI [hasta 13 años](#) Monovalentes VPI, VHB
VPOb vacuna de polio oral bivalente VPI vacuna de polio inactivada trivalente