



## 11.12.2. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL EN POBLACIÓN DE 15-18 años CON VACUNACIÓN DOCUMENTADA

Vacuna	No dosis previas	Actuación
<b>Vacuna que contiene tétanos<sup>1</sup></b>	0	Administrar 5 dosis vacuna Td (primovacunación intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª y dos dosis de recuerdo con intervalos de 10 años)
	1	Administrar 4 dosis vacuna Td (primovacunación intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª) y 1 dosis de recuerdo con intervalo de 10 años
	2	Administrar 3 dosis vacuna Td (intervalo mínimo de 6 meses entre 2ª y 3ª y 2 dosis de recuerdo con intervalos de 10 años)
	3	Administrar 2 dosis vacuna Td (intervalo mínimo de 12 meses entre 3ª y 4ª) e intervalo de 10 años entre 4ª y 5ª
	4	Administrar 1 dosis Td con intervalo de 10 años entre 4ª y 5ª dosis
	5	Ninguna
<b>Polio autóctonos o extranjeros nacidos antes de 2016</b>	0	Administrar 3 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
<b>Polio oral extranjeros nacidos desde 2016</b>	0	Administrar 3 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	≥ 5 (al menos 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ninguna
	≥ 2 (VPOb ó 1 VPI+1 VPO)	Administrar 2 dosis vacuna VPI con intervalo mínimo de 4 meses
<b>Men ACWY</b>	0	1 dosis Men ACWY
	≥ 1 (última con < 10 años)	1 dosis Men ACWY
	≥ 1 (última con > 10 años)	Ninguna
<b>Vacuna que contiene Hepatitis B</b>	0	Administrar 3 dosis vacuna VHB (intervalo 4 semanas entre 1ª y 2ª y 5 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna VHB (intervalo 4 semanas entre 1ª y 2ª y 5 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna VHB (intervalo 5 meses entre 2ª y 3ª)
	3	Ninguna
<b>Triple Vírica</b>	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
<b>Varicela</b>	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
<b>PAPILOMA</b>	0	1 dosis
	≥ 1	Ninguna

Después seguirá el Calendario de Vacunación de población adulta

<sup>1</sup> incluida dosis 16 años

VPOb vacuna de polio oral bivalente VPI vacuna de polio inactivada trivalente