



11.12.3. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL EN POBLACIÓN DE >18 años CON HISTORIAL DE VACUNACIÓN

Vacuna	No dosis previas	Actuación
Vacuna que contiene tétanos	0	Administrar 5 dosis vacuna Td (primovacunación intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª) y dos dosis de recuerdo con intervalos de 10 años
	1	Administrar 4 dosis vacuna Td (primovacunación intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª) y 2 dosis de recuerdo con intervalo de 10 años
	2	Administrar 3 dosis vacuna Td (intervalo mínimo de 6 meses entre 2ª y 3ª y 2 dosis de recuerdo con intervalos de 10 años)
	3	Administrar 2 dosis vacuna Td (intervalo mínimo de 12 meses entre 3ª y 4ª) e intervalo de 10 años entre 4ª y 5ª
	4	Administrar 1 dosis Td con intervalo de 10 años entre 4ª y 5ª dosis
	5	Ninguna
Polio ¹ Solo extranjeros CON circulación de virus salvaje o derivado de la vacuna	0	Administrar 3 dosis vacuna VPI (intervalo mínimo intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	≥ 3	1 dosis VPI si no recibió ninguna 12 meses antes de llegar, intervalo mínimo de 6 meses de la última dosis de polio (VPI o VPO)
	< 3	Completar hasta conseguir 3 dosis contabilizando las VPO (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
Men ACWY Nacidos desde 2001	0	1 dosis Men ACWY
Hepatitis B Nacidos desde 1981	0	Administrar 3 dosis vacuna VHB (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª) *
	1	Administrar 2 dosis vacuna VHB (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª) *
	2	Administrar 1 dosis vacuna VHB (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª) *
	3	Ninguna
Triple Vírica ² Nacidos desde 1970	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
Varicela ³	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
PAPILOMA Mujeres nacidas desde 1995 y hombres desde 2007	0	1 dosis ≤ 25 años; 2 dosis ≥ 26 años
	1 (administrada ≤ 25 años)	Ninguna
	1 administrada > 25 años	1 dosis con intervalo mínimo 6 meses
	2 ó 3 si la 1ª con ≤ 25 años	Ninguna
	2 si la 1ª con > 25 años e intervalo mínimo entre 1ª y 2ª ≥ 6 meses	Ninguna
	2 si la 1ª con > 25 años e intervalo mínimo entre 1ª y 2ª < 6 meses	1 dosis con intervalo mínimo 6 meses de la última
	3	Ninguna
Herpes Zóster Desde 65 años	0	2 dosis (intervalo 2 meses)
	1	1 dosis (intervalo 2 meses)
	2	Ninguna
Neumococo Desde 75 años	0	1 dosis VNC20
	≥ 1	Ninguna

* Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas 1 Países con circulación de poliovirus <https://polioeradication.org/about-polio/polio-this-week/> <https://www.who.int/news/item/10-04-2025-statement-of-the-forty-first-meeting-of-the-polio-ihc-emergency-committee> 2 Valorar antecedente de haber pasado sarampión en nacidos entre 1970 y 1980. 3 Personas sin evidencia de inmunidad (ver capítulo 3.2)