

VACUNAS	Año de nacimiento a partir de 1981	Año de nacimiento entre 1980 y 1970	Año de nacimiento antes de 1970 y menores de 65 años	65 años o más
Tétanos-difteria (Td)	No vacunación o vacunación incompleta: completar 5 dosis / Calendario infantil completo: 1 dosis de recuerdo a los 65 años 0-1-6/12 meses-10 años-10 años (intervalo entre dosis)			
difteria-Tétanos-tosferina (dTpa)	1 dosis En embarazadas, en cada embarazo			
	1 dosis Trasplante de progenitores hematopoyéticos, CAR-T, trasplante órgano sólido, tratamiento oncológico			
Sarampión-Rubéola-Parotiditis (TV)	2 dosis: 0-1 mes Valorar contraindicaciones			
Varicela (VVZ)	2 dosis: 0-1 mes Susceptibles seronegativos con alto riesgo de contagio. Valorar contraindicaciones			
Hepatitis B (VHB)	3 dosis: 0-1-6 meses			
	3 dosis: 0-1-6 meses Tratamiento hepatotóxico, insuf. renal estadío 4 y 5, enf. hepática crónica, alcoholismo crónico, trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hemato- poyéticos, residentes en centros de disminuidos psíquicos, receptores de hemoderivados, contactos de un caso, UDVP, VIH, múltiples contactos sexuales, hombres sexo con hombres, viaje a país de alta endemia			
Hepatitis A (VHA)	2 dosis: 0-6/12 meses Tratamiento hepatotóxico, insuficiencia renal estadío 4 y 5, enfermedad hepática crónica, alcoholismo crónico, receptores de hemoderivados, contactos de un caso, UDVP, hombres sexo con hombres, viaje a país de alta endemia, VIH, trasplante hepático			
Papilomavirus Humano (VPH)	1 o 2 dosis según edad Mujeres nacidas desde 1995 y hombres nacidos desde 2007			
	3 dosis: 0-2-6 meses Mujeres menores de 45 años en tratamiento con azatioprina, o anti TNF, mujeres en tratamiento lesión epite- lial alto grado, hombres y mujeres menores de 45 años: VIH, prostitución, hombres sexo con hombres, trasplante de progenitores he- matopoyéticos, CAR-T			
Meningococo ACWY	1 dosis menores de 26 años			
	2 dosis: 0-1 mes Asplenia, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab/ravulizumab/pegcetaloplan, antecedente de EMI, trasplante de progenitores he- matopoyéticos, CAR-T, VIH, algunas inmunodeficiencias*			
Meningococo B	2 dosis: 0-1 mes Asplenia, déficit de complemento y properdina, tratamiento con eculizumab/ravulizumab/pegcetaloplan, antecedente de EMI, trasplante de progenitores he- matopoyéticos, CAR-T			
Haemophilus influenzae b (Hib)	1 dosis Asplenia, déficit de complemento y properdina, trasplante de progenitores hematopoyéticos, tratamiento con eculizumab/ravulizumab/pegcetaloplan, CAR-T			
Neumococo				1 dosis
	1 dosis ≥ 18 años: Inmunodeficiencias, asplenia, insuficiencia renal estadío 4 y 5, cirrosis hepática, implantes cocleares, fístula LCR, trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, EPOC			
Gripe				1 dosis anual
	1 dosis anual Embarazo, inmunodeficiencias, asplenia, enfermedad renal, cardiovascular, respiratoria, enfermedad hepática, diabetes mellitus, implantes cocleares, fístulas LCR, convivientes y cuidadores de inmunodeprimidos, obesidad mórbida, enfermedades inflamatorias crónicas			
Herpes Zóster (VHZ)**				2 dosis: 0-2 meses
	2 dosis: 0-2 meses ≥ 18 años: Trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y personas en espera del mismo, hemopatías malignas, tto. anti JAK, tumores sólidos en quimioterapia, VIH, antecedentes de 2 o más episodios de HZ; > 50 años en tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores			

*Para algunas inmunodeficiencias consúltese el Manual de Vacunación de la CAE pág. 262 tabla 3.

**Se priorizarán los grupos de riesgo.


Población adulta sana

Población adulta con factores de riesgo


(SC)
Subcutánea
en deltoides
ángulo de 45°




AGUJA 25x0,6




AGUJA 16x0,6



AGUJA 25x0,6



AGUJA 25x0,5



(IM)
Intramuscular
en deltoides
ángulo de 90°



ATENUADAS

Sarampión-Rubéola-Parotiditis
PRIORIX®
Jeringa con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja



Varicela
VARIVAX®
Jeringa con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja




Sarampión-Rubéola-Parotiditis-Varicela
PROQUAD®
Jeringa con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja



Hepatitis A
AVAXIM®
Jeringa precargada



Hepatitis B
ENGERIX B 20®
Jeringa precargada



Hepatitis A-B
TWINRIX® adulto
Jeringa precargada



Hepatitis B 40 mcg
HBVaxPro 40®
Jeringa precargada



Meningococo B
BEXSERO®
Jeringa precargada



Meningococo ACWY
NIMENRIX®
Jeringa con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja




Haemophilus influenzae b
HIBERIX®
Jeringa con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja




Papilomavirus
GARDASIL 9®
Jeringa precargada



Neumococo polisacarida 23v
PNEUMOVAX 23®
Jeringa precargada



Neumococo conjugada 20v
PREVENAR 20®
Jeringa precargada



Tétanos-Difteria
DIFTAVAX®
Jeringa precargada



difteria-Tétanos-tosferina (dTpa)
BOOSTRIX®
Jeringa precargada



Herpes Zóster
SHINGRIX®
1 vial con disolvente + 1 vial liofilizado
Mezclar en la misma jeringa y cambiar aguja



INACTIVADAS

INTERVALOS ENTRE

IG	Vacuna inactivada	Ninguno				Vacuna inactivada	Vacuna inactivada	Ninguno
Vacuna inactivada	IG	Ninguno				Vacuna inactivada	Vacuna Atenuada	Ninguno
IG	Vacuna Atenuada	3-11 meses según IG				Vacuna inactivada	Vacuna Atenuada	Ninguno
Vacuna Atenuada	IG	2 semanas				Vacuna Atenuada	Vacuna Atenuada	4 semanas
			Triple Vírica /Varicela	Mantoux	4 - 6 semanas			
			Mantoux	Triple Vírica /Varicela	Simultánea o 72 horas			

Edición: 3ª, noviembre 2024 · Edita: Eusko Jaurlaritza Argitalpen Zerbitzu Nagusia/Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco · Tirada: 1.960 ejemplares · Impresión: IRUDI GRÁFICAS · D.L.: LG G 655-2024

Eusko Jaurlaritza Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco