



11.11.1 ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN NO VACUNADA O SIN VACUNACIÓN DOCUMENTADA

2026	DOSIS A ADMINISTRAR DESDE LA CAPTACIÓN						
	6 meses	7-11 meses	1-2 años	3-5 años	6-7 años	8-9 años	10-14 años
DTPa-VHB-VPI-Hib	Calendario	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹		
DTPa-VPI/Td					1 dosis ²	4 dosis ²	4 dosis ²
VPI							3 dosis ³
Men ACWY		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis ⁴
Men B		3 dosis	3 dosis	2 dosis Nac desde 2023			
VNC		3 dosis	2 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis Nac desde 2015
Hepatitis B						3 dosis	3 dosis
TV			1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Varicela			1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Gripe		1 dosis anual	1 dosis anual	1 dosis anual			
Papiloma							1 dosis
CONTINUAR CALENDARIO							

1 Utilizar presentación Hexavalente hasta 7 años; 2 vacuna tetravalente hasta 13 años. A partir de 14 años usar Td /incluir una dosis dTpa; 3 En los casos que tengan que utilizar Td (> 13 a); 4 equivale a dosis de 12 años;

	INTERVALOS MÍNIMOS		
	Entre 1ª y 2ª dosis	Entre 2ª y 3ª dosis	Entre dosis recuerdo
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 semanas	6 meses	6 meses
Td	4 semanas	6 meses	12 meses
dTpa			6 meses de una dosis previa de vacuna que contenga tétanos
VPI	4 semanas	6 meses	
Hib	4 semanas	4 semanas	
Men ACWY	8 semanas		
Men B (4cMenB)	8 semanas (< 2 años) 4 semanas (≥ 2 años)		2-12 meses (según edad)
VNC	4 semanas (pauta 3+1) 8 semanas (12-24 m)	8 semanas	2 meses (a partir 11 meses edad)
VHB	4 semanas	8 semanas*	
TV	4 semanas		

* Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas