



11.11.9. ADAPTACIÓN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN POBLACIÓN DE 10-14 años CON VACUNACIÓN DOCUMENTADA

Vacuna	No dosis previas	Actuación
Vacuna que contiene tétanos ¹	0	Administrar 4 dosis vacuna tetravalente/dTpa/Td según requiera (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª y 3ª y 4ª)
	1	Administrar 3 dosis vacuna tetravalente/dTpa/Td según requiera (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 2 dosis vacuna tetravalente/dTpa/Td según requiera (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3	Administrar 1 dosis vacuna tetravalente/dTpa/Td según requiera (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª y entre 3ª y 4ª)
	4	Administrar 1 dosis vacuna tetravalente/dTpa/Td según requiera (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª y entre 3ª y 4ª) Si la 4ª dosis < 4 años. Si 4ª dosis > 4 años no requiere.
Polio autóctonos o extranjeros vacunados antes de 2016	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 2ª)
	3 (pauta 3+1)	Administrar 1 dosis vacuna que contenga VPI (intervalo mínimo de 6 meses de la 3ª)
	3 (pauta 2+1)	Ninguna
Polio extranjeros vacunados desde 2016	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VPI(intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 6 meses entre 2ª y 3ª)
	≥ 5 (al menos 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ninguna
	≥ 2 (VPOb ó 1 VPI+1 VPO)	Completar 2 dosis vacuna que contenga VPI intervalo mínimo de 4 meses
Men ACWY ²	0	1 dosis Men ACWY ²
	≥ 1 (última con < 10 años)	1 dosis Men ACWY ²
Vacuna que contiene Hepatitis B	0	Administrar 3 dosis vacuna que contenga VHB (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª)
	1	Administrar 2 dosis vacuna que contenga VHB (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª y 2 meses entre 2ª y 3ª)
	2	Administrar 1 dosis vacuna que contenga VHB (intervalo mínimo de 2 meses entre 2ª y 3ª)
	3	Ninguna
VNC Nacidos desde 2015	0	Administrar 1 dosis
	≥ 1 (última con < 11 meses)	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 2 meses de la última)
	≥ 1 (última con ≥ 11 meses)	Ninguna
Triple Vírica	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
Varicela	0	Administrar 2 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas)
	1	Administrar 1 dosis (intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª y 2ª)
	2	Ninguna
PAPILOMA ³	0	1 dosis
	≥ 1	Ninguna

**** Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas**

Después seguirá el Calendario de Vacunación

1 vacuna tetravalente hasta 13 años. A partir de 14 años usar Td /incluir una dosis dTpa; En los casos que tengan que utilizar Td (> 13 a); **2** equivale a dosis de 12 años;

3 Si tiene más de 12 años en el momento de la captación

Vacunas: Tetravalente DTPa-VPI Monovalentes VPI, VHB

VPOb vacuna de polio oral bivalente VPI vacuna de polio inactivada trivalente