



11.12.1 ADAPTACIÓN CALENDARIO EN PERSONAS ADULTAS SIN HISTORIAL DE VACUNACIÓN

2026	DOSIS A COMPLETAR DESDE LA CAPTACIÓN			
	Antes de 1978	1978 1980	1981 1994	Desde 1995
Td	5 dosis	5 dosis	5 dosis	5 dosis
VPI ¹ En extranjeros ¹	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis
Men ACWY				1 dosis Nac desde 2001
Hepatitis B			3 dosis	3 dosis
TV		2 dosis	2 dosis	2 dosis
Varicela**	2 dosis ²	2 dosis ²	2 dosis ²	2 dosis
Papiloma				1 dosis ³ ≤ 25 años 2 dosis ³ ≥ 26 años
Herpes Zoster *	2 dosis Nacidos en 1960, 1961, 1951			
VNC ⁴	1 dosis desde 65 años de edad			
Gripe	1 dosis desde 60 años de edad anualmente			
COVID-19	1 dosis desde 70 años de edad estacional			

* No se pueden administrar conjuntamente. 1 sólo en procedentes de países con circulación de poliovirus <https://polioeradication.org/about-polio/polio-this-week/> 2 Personas sin evidencia de inmunidad (ver capítulo 3.2) 3 Mujeres nacidas desde 1995 y hombres nacidos desde 2007 4 en personas que no recibieron ninguna vacuna antineumocócica

	PAUTA	INTERVALOS MÍNIMOS		
		Entre 1ª y 2ª dosis	Entre 2ª y 3ª dosis	Entre dosis recuerdo
Td	0-1-12m-10 a-10 a	1 mes	6 mes	12 meses*
VPI	0-1-7 m	1 meses	6 meses	
Triple Vírica	0-1 m	1 mes		
Hepatitis B	0-1-6 m	1 mes	2 meses**	
Papiloma	1 dosis ≤ 25 años 2 dosis ≥ 26 años	6 meses		
	3 dosis en GR/inmunosupresión	1 mes	3 meses	
Varicela	0-1 m	1 mes	No se pueden administrar conjuntamente. Sin evidencia de inmunidad a varicela administrar primero varicela y tras completar pauta, administrar vacuna zóster con intervalo de 8 semanas.	
Herpes Zoster	0-2 m	1 mes		

*Entre 4ª y 5ª dosis 10 años. ** Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas