



A la edad de **18 meses** se administrará **una vacuna** que le protegerá frente a **5 enfermedades**:

- una vacuna combinada contra Difteria, Tétanos, Tos ferina, Poliomiéлитis y Haemophilus influenzae b (Hib).



Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Difteria	Problemas para respirar. Puede afectar al sistema nervioso, al corazón o a los riñones, parálisis. Muerte (6-10% de los casos).	99,8%	Dolor, induración, enrojecimiento en la zona de inyección. Fiebre, llanto, irritabilidad, pérdida de apetito (10%).
Tétanos	Espasmos musculares dolorosos, rigidez muscular, dificultad respiratoria, dificultad para tragar. Muerte (10% de los casos).	100%	
Tos ferina	Golpes de tos paroxística con dificultad para respirar. Congestión y vómitos. Neumonías, convulsiones, encefalopatías (1 caso/11.000). Muerte (0,4% en lactantes).	100%	
Poliomiéлитis	Fiebre, náuseas, vómitos, parálisis progresiva (1%). Parálisis permanente (50% de los casos hospitalizados). Muerte (5% de los casos hospitalizados).	99,3%	
Haemophilus influenzae b	Epiglotitis, osteomielitis, neumonía, meningitis. Muerte (5% de los casos de meningitis).	96,6%	

* Con 3 dosis, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis



UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2016.



Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomiéлитisa

Haemophilus influenzae b