



## 11.11.2. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 7-10 HILABETEKO BIZTANLEENTZAT

| Txertoa                         | Aurretiazko dosien kopurua       | Jarduera                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tetanosa duen txertoa</b>    | 0                                | Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 1                                | Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 2                                | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
|                                 | 3 (3+1 pauta)                    | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
| <b>Polioa autoktonoetan</b>     | 0                                | Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 1                                | Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 2                                | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
|                                 | 3 (3+1 pauta)                    | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
| <b>Polioa atzerritarretan</b>   | 0                                | VPI duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. hilabeteen artean |
|                                 | ≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb) | ez dago jarduketarik                                                                                                                                              |
|                                 | ≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)       | Gutxienez 4 hilabeteko tarte VPI duen 2 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea)                                                              |
| <b>Hib duen txertoa</b>         | 0                                | Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 1                                | Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 2                                | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
|                                 | 3 (3+1 pauta)                    | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
| <b>Men C</b>                    | 0                                | dosi 1                                                                                                                                                            |
|                                 | 1 ó 2                            | ez dago jarduketarik                                                                                                                                              |
| <b>B hepatitis duen txertoa</b> | 0                                | Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 1                                | Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                               |
|                                 | 2                                | Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                      |
| <b>VNC</b>                      | 0                                | Txerto VNC15 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                                         |
|                                 | 1                                | Txerto VNC15 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                                         |
|                                 | 2                                | Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                            |
|                                 | 3 (3+1 pauta)                    | Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)                                                                                            |
| <b>Men B</b>                    | 0                                | 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                                                      |
|                                 | 1                                | 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).                                                      |
|                                 | 2                                | Dosi 1 ematea (gutxienez 2 hilabeteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 12 hilabeteko adinetik aurrera )                                                         |

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib [7 urtera arte](#)  
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI [13 urtera arte](#) Monobalenteak VPI, VHB  
VPI Ahoko polio tribalentearen aurkako txertoa