



11.11.4. HAUREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 16-23 HILABETEKO BIZTANLEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa autoktonoetan	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa atzerritarretan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. hilabeteen artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tarte VPI duen 2 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea)
Hib duen txertoa	0	Hib duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. hilabeteen artean
	1	Hib duen 2 txerto-dosi ematea (hexabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. hilabeteen artean
	2	Hib duen txerto-dosi 1 ematea (hexabalentea/monobalentea), 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. hilabeteen artean
	3 (3+1 pauta)	Hib duen txerto-dosi 1 ematea (hexabalentea/monobalentea) 3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte
	3 (2+1 pauta)	Ez dago jarduketarik
Men C/ACWY	0	Men C dosi 1
	1 edo 2 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	Men C dosi 1
	1 edo 2 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Txerto hexabalentearen dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
VNC	0	Txerto VNC15 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txerto VNC15 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (pauta 3+1)	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (pauta 2+1)	Ez dago jarduketarik
Men B	0	3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Dosi 1 ematea (gutxienez 2 hilabeteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 12 hilabeteko adinetik aurrera)
Hirukoitz birikoa	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera
	2	Ez dago jarduketarik
Baricela	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera
	2	Ez dago jarduketarik

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 [urtera arte](#)
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 [urtera arte](#) Monobalenteak VPI, VHB
VPI Ahoko polio tribalentearen aurkako txertoa