



11.11.6. HAUREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 4-5 URTEKO BIZTALEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txertoaren 3 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txertoaren 2 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. mailen artean)
	3 (3+1 pauta)	Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa autoktonoetan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea ematea, behar (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	VPI duen 2 txerto-dosi ematea , behar (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	VPI duen txerto-dosi 1 ematea, behar (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3.. mailen artean)
	3 (3+1 pauta)	VPI duen txerto-dosi 1 ematea , behar (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa atzerritarretan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. eta 3. eta 4. hilabeteen artean)
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tarte VPI duen 2 txerto-dosi osatzea
Hib duen txertoa	0	Hib duen txerto-dosi 1 ematea .
	≥1 azken dosia < 11 hilabeterekin bada	Hib duen txerto-dosi 1 ematea
	≥1 azken dosia > 11 hilabeterekin bada	ez dago jarduketarik
Men C/ACWY	0	Men C dosi 1
	1 edo 2 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	Men C dosi 1
	1 edo 2 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea ematea , (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
VNC	0	dosi 1 ematea
	≥ 1 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	2 dosi ematea (azken dositik gutxienez 2 hilabetera)
	≥ 1 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik
Baricela	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib [7 urtera arte](#)
 VPOb Ahoko polio bivalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI [13 urtera arte](#) Monovalenteak VPI, VHB
 VPI Ahoko polio trivalentearen aurkako txertoa