



11.12.3. TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN >18 URTEKO BIZTANLEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa¹	0	Txertoaren 5 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera ((lehen txertaketa, gutxienez 4 asteko tarte, 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. mailen artean eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin).
	1	Txertoaren 4 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera ((lehen txertaketa, gutxienez 4 asteko tarte, 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. mailen artean eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin).
	2	Txertoaren 3 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabete tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. mailen artean eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin)
	3	Txertoaren 2 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabete tarte 2. eta 3. Mailen artean eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin)
	4	Txertoaren dosi 1 dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (10 urteko tarte 4. Eta 5. mailen artean)
	5	ez dago jarduketarik
Polioa¹ Birus basatia edo txertotik eratorritako birusa duten atzerritarrek bakarrik	0	VPI txertoaren 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabete tarte 2. eta 3. mailen artean).
	≥ 3	VPI dosi 1, iritsi baino 12 hilabete lehenago jaso ez bazenuen, azken polio-dosiaren (VPI edo BOE) 6 hilabete gutxienezko tarte
	< 3	Osatu 3 dosi lortu arte BOEak zenbatuta (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabete tarte 2. eta 3. mailen artean)
Men ACWY	0	Men ACWY dosi 1
B hepatitis duen txertoa 1981etik aurrera jaiotakoak	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabete tarte 2. eta 3. mailen artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabete tarte 2. eta 3. mailen artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabete tarte 2. eta 3. mailen artean).
	3	ez dago jarduketarik
Hirukoitz Birikoa² 1970tik aurrera jaiotakoak	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik
Baricela³	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik
PAPILOMA 1995az geroztik jaiotako emakumeak eta 2007az geroztik gizonak	0	dosi 1
	1 (administratua ≤ 25 urte)	ez dago jarduketarik
	2 edo 3 lehenengoak badu ≤ 25 urterekin	ez dago jarduketarik
	2 lehenengoak badu > 25 urtetik gorakoa bada eta 1 eta 2 arteko gutxienezko tarte ≥ 6 hilabete bada	ez dago jarduketarik
	2 lehenengoak badu > 25 urtetik, eta 1 eta 2 arteko gutxienezko tarte < 6 hilabete	azken dositik gutxienez 6 hilabete tarte duen dosi bat
	3	ez dago jarduketarik
Herpes Zóster 65 urtetik aurrera	0	2 dosi (2 hilabete tarte)
	1	Dosi 1 (2 hilabete tarte)
	2	ez dago jarduketarik
Neumococo 75 urtetik aurrera	0	VNC20 Dosi 1
	≥ 1	ez dago jarduketarik

1 Poliobirusen zirkulazioa duten herrialdeetatik datozenetan bakarrik <https://polioeradication.org/about-polio/polio-this-week/> 2 1970 eta 1980 artean jaiotakoetan elgorria igaro izanaren aurrekaria baloratzea 3 mmunitate-ebidentziarik ez duten pertsonak (ikus 3.2 kapitulua