



11.11.1 HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTATU GABEKO EDO TXERTAKETA DOKUMENTATURIK GABEKO BIZTANLEENTZAT

2026	KAPTAZIOTIK EMAN BEHARREKO DOSIAK							
	6 hilabete	7-11 hilabete	1-2 urte	3-5 urte	6-7 urte	8-9 urte	10-14 urte	
DTPa-VHB-VPI-Hib	Egutegia	3 dosi ¹	3 dosi ¹	3 dosi ¹	3 dosi ¹			
DTPa-VPI/Td					1 dosi ²	4 dosi ²	4 dosi ²	
VPI							3 dosi ³	
Men ACWY		dosi 1	dosi 1	dosi 1	1 dosi	1 dosi	dosi 1 ⁴	
Men B		3 dosi	3 dosi	2 dosi 2023 tik aurrera jaitoak				
VNC		3 dosi	2 dosi	1 dosis	1 dosi	1 dosi	dosi 1 2015etik aurrera jaitotakoak	
B Hepatitis						3 dosi	3 dosi	
Hirukoitz birikoa				dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi	2 dosi
Barizela				dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi	2 dosi
Gripe			dosi 1 urtean	dosi 1 urtean	dosi 1 urtean			
Papiloma		↓	↓	↓	↓	↓	dosi 1 ⁴ ↓	
EGUTEGIA JARRAITU								

¹ Hexabalente aurkezpena 7 urtera arte erabili daiteke; ² 13 urtera arteko txerto tetrabalentea. ³ 14 urtetik aurrera, erabili Td/sartu dTpa dosi bat; ⁴ 12 (> 13 a) erabili behar duten kasuetan; ⁵ 12 urteko dosien baliokidea da.

	GUTXIENEO TARTEAK		
	1. eta 2. dosien artean	2. eta 3. dosien artean	Oroitzapen-dosien artean
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 aste	6 hilabete	6 hilabete
Td	4 aste	6 hilabete	12 hilabete
dTpa			Tetanosak dituen txertoaren aldez aurreko dosia: 6 hilabete
VPI	4 aste	6 hilabete	
Hib	4 aste	4 aste	
Men ACWY	8 aste		
Men B (4cMenB)	8 aste (< 2 urte) 4 aste (≥ 2 urte)		2-12 hilabete (adinaren arabera)
VNC	4 aste (3+1 jarraibidea) 8 aste (12-24 h)	8 aste > urte batean 6 hilabete ≤ urte batean	2 hilabete (11 hilabeteko adinetik aurrera)
VHB	4 aste	8 aste *	
TV	4 aste		

* Gutxienez 16 asteko 1. eta 3. dosien arteko gutxieneko tartearekin