



11.11.2. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 7-10 HILABETEKOKO BIZTANLEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
Polioa autoktonoetan	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
Polioa atzerritarretan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete, 2. eta 3. dosien artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	Ez dago jarduerarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Osatu txertaketa 2 dosi VPI izan ditzan; gutxienez 4 hilabete (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea)
Hib duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
Men C/Men ACWY	0	dosi 1 Men ACWY
	1 ó 2	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
VNC	0	Txerto VNC15 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto VNC15 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
Men B	0	3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Dosi 1 ematea (gutxienez 2 hilabeteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 12 hilabeteko adinetik aurrera)

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 urtera arte
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 urtera arte Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa