



11.11.3. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 11-15 HILABETEKO BIZTANLEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa autoktonoetan	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexabalente 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa atzeritarretan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean.
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Osatu VPI 2 dosiko pauta gutxienerako tarte 4 hilabete izanik (hexabalentea/tetrabalentea/monobalentea).
Hib duen txertoa	0	Hib duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete, 2. eta 3. dosien artean
	1	Hib duen 3 txerto-dosi ematea (hexabalentea/monobalentea), gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete, 2. eta 3. dosien artean
	2	Hib duen txerto-dosi 1 ematea (hexabalentea/monobalentea), 6. hilabete, 2. eta 3. dosien artean
	3 (3+1 pauta)	Hib duen txerto-dosi 1 ematea (hexabalentea/monobalentea) 3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte
	3 (2+1 pauta)	Ez dago jarduketarik
C Men/ACWY Men	0	Men ACWY dosi 1 (12 hilabetetik berako haurretan 12 hilabeterako dosia 2 hilabeteko gutxienerako tartearekin jasoko dute)
	1 edo 2	Ez dago jarduketarik. Azken dosia ≥ 12 hilabeterekin jaso badu. Azken dosia < 12 hilabeterekin jaso badu dosi 1
B hepatitis duen txertoa	0	Txerto hexabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto hexabalentearen dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	3	Ez dago jarduketarik
VNC	0	Txerto VNC15 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto VNC15 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (2. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi VNC15 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	Ez dago jarduketarik
Men B	0	3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Dosi 1 ematea (gutxienez 12 hilabeteko tarte 2. dositik eta haurren adina 12 hilabetetik aurrera denena)
	3	Ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera
	2	Ez dago jarduketarik
Barizela	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera



Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib [7 urtera arte](#)
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI [13 urtera arte](#) Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa