



11.11.5. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 2-3 URTEKO BIZTALEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txerto hexavalente/tetrabalentearen 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	Txerto hexavalente/tetrabalentearen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Txerto hexavalente/tetrabalentearen 1 dosi ematea (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. dosien artean)
	3 (3+1 pauta)	Txerto-dosi hexavalente/tetrabalentearen 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa autoktonoetan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VPI duen 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VPI duen 1 dosi ematea (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. dosien artean)
	3 (3+1 pauta)	VPI duen dosi 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa atzeritarretan	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea, gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	VPI duen 2 txerto-dosi osatu gutxienez 4 hilabeteko tartearekin
Hib duen txertoa	0	Hib duen dosi 1 ematea
	≥1 azken dosia < 11 hilabeterekin bada	Hib duen dosi 1 ematea
	≥1 azken dosia > 11 hilabeterekin bada	ez dago jarduketarik
Men C/ACWY	0	Men ACWY dosi 1
	1 edo 2 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	Men ACWY dosi 1
	1 edo 2 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa	0	B hepatitis duen txerto 3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	B hepatitis duen txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	B hepatitis duen txerto dosi 1 ematea (gutxienez 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	3	ez dago jarduketarik
VNC	0	dosi 1 ematea
	≥ 1 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	dosi 1 ematea (azken dositik gutxienez 2 hilabetera)
	≥ 1 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
Men B 2023tik aurrera jaiotakoak	0	3 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	Dosi 1 ematea (gutxienez 2 hilabeteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 12 hilabeteko adinetik aurrera)
	3	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean
	2	Ez dago jarduketarik
Barizela	0	Txerto dosi 1 ematea
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean
	2	Ez dago jarduketarik

*6 hilabete 2. eta 3. dosien artean hexabalentea erabiltzen bada.

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 urtera arte
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 urtera arte Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa